

尿管相关性感染与护理



| CATALOGUE |

目录

- 尿管相关性感染概述
- 尿管相关性感染的预防措施
- 尿管相关性感染的护理方法
- 尿管相关性感染的案例分析
- 总结与展望

01


尿管相关性感染概述

定义与分类



尿管相关性感染 (Catheter-associated urinary tract infection, CAUTI) 是指在留置尿管期间或拔除尿管后48小时内发生的泌尿系统感染。

CAUTI可分为两种类型：导管伴随的尿路感染和细菌定植。



感染途径与风险因素



感染途径

细菌通过尿管侵入泌尿系统，导致尿路感染。



风险因素

留置尿管时间过长、操作不当、不规范的护理、患者自身免疫力低下等。



感染的后果与影响

短期后果

尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状，严重时可出现高热、寒战等全身症状。

长期影响

反复发作的尿路感染可能导致肾功能损害、膀胱纤维化等，影响患者的生活质量。





预防措施

严格遵守无菌操作规程，减少不必要的留置时间。




对患者进行充分的评估和教育，提高自我护理意识和能力。



定期更换尿管和尿袋，保持尿管通畅，避免逆行感染。



治疗措施



01

一旦发生尿路感染，应立即进行尿液检查，根据药敏试验结果选择敏感抗生素进行治疗。



02


对于严重感染或反复发作的病例，需考虑拔除尿管或更换其他类型的尿管。



护理效果评估

定期监测患者的体温、尿常规等指标，
评估护理效果。

对护理前后护理效果各指标对应的评
价量表进行评价，分数越高，护理效
果越好。



02

尿管相关性感染的 预防措施

严格遵守无菌操作原则


在插尿管、更换尿管、尿袋等操作时，必须严格遵守无菌操作原则，确保操作过程中使用的物品和环境清洁无菌。

医护人员应接受专业的培训，确保掌握正确的无菌操作技术，并定期进行考核。





选择适当的尿管材料与型号



根据患者的具体情况，选择适当的尿管材料与型号，以保证尿道的舒适度和减少感染的风险。

避免使用过粗或过细的尿管，以及不适合患者尿道的尿管材料，以降低感染的风险。





定期更换尿管与尿袋




根据患者的病情和医生的建议，定期更换尿管和尿袋，以减少感染的风险。

在更换尿管和尿袋时，应遵循无菌操作原则，确保操作过程清洁卫生。



保持尿道口清洁与干燥



定期清洁尿道口，保持其清洁卫生，以减少细菌滋生的机会。



在清洁尿道口时，应使用温和的清洁剂，避免使用刺激性强的清洁剂。



保持尿道口的干燥，避免潮湿环境滋生细菌。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/477012113034006061>