

2024 年浙江省德清县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2017 年真题）正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是（）

- A: C 级
- B: X 级
- C: A 级
- D: D 级

答案：C

2. 容易引起体重增加的抗焦虑药物是

- A: 米氮平
- B: 曲唑酮
- C: 氟西汀
- D: 文拉法辛

答案：A

3. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括（）

- A: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6，减慢美托洛尔的代谢，应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平
平等 CCB 降压药

C: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

D: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

答案: B

4. 每日分泌量相近,清晨始升高,午后达高峰,凌晨跌低谷,是

A: 胃酸的分泌

B: 糖皮质激素的分泌

C: 肝脏合成胆固醇

D: 胰岛 B 细胞

答案: D

5. 同时使用 2 种药物,药物不良事件的发生率为

A: 0.68

B: 0.13

C: 0.38

D: 0.5

答案: B

6. 下列疾病中,WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

A: 结核病

B: 肺炎

C: 腹泻

D: 卡氏肉瘤

答案: A

7. 下列抗感冒药中，归属于处方药的是

- A: 含伪麻黄碱的复方制剂
- B: 含金刚烷胺的复方制剂
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 奥司他韦片

答案：D

8. 抗结核联合治疗方案中，可引起球后视神经炎不良反应的药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 左氧氟沙星

答案：A

9. 无症状菌尿

- A: 宜选用毒性小的抗菌药物
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5$ cfu / ml

答案：D

10. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素
- C: 格列本脲

D: 西咪替丁

答案：C

11. 患者，男，72 岁，因病毒性感冒而致发热，体温 39.2℃，伴轻咳、痰多且黏稠。今日“支气管哮喘”宿疾复发。家人前来药店购买对乙酰氨基酚片、右美沙芬片、氨溴索片、沙丁胺醇气雾剂。药师提供的用药指导中，错误的是

A: 服药期间禁止饮酒

B: 沙丁胺醇气雾剂每次 1~2 喷，第 1 小时内每 20 分钟给药一次，随后调整为每 3~4h 一次

C: 右美沙芬宜睡前服用

D: 右美沙芬和氨溴索同时服用

答案：D

12. 下列药物中，可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是()

A: 银杏叶片

B: 口服避孕药

C: 叶酸

D: 阿司匹林

答案：B

13. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 588.1 $\mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

B: 美托洛尔和赖诺普利

C: 美托洛尔和辛伐他汀

D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

答案: D

14. 非糜烂性胃食管反流病的抑酸治疗疗程是

A: 3 周

B: 4 周

C: 2 周

D: 6 周

答案: B

15. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 复合消化酶胶囊

B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 胰酶片

答案: C

16. (2017 年真题) 患者，女，24 岁。一周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不适，来药店购药，药师可推荐的药物是 ()

A: 玻璃酸钠滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案: D

17. 治疗真菌性阴道炎的首选非处方药是

- A: 益康唑栓
- B: 咪康唑栓
- C: 甲硝唑栓
- D: 克霉唑栓或片

答案：B

18. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

- A: 甘油果糖注射液 500mlbidivgtt
- B: 呋塞米片 20mgqdpo
- C: 甘露醇注射液 250mlq6hivgtt
- D: 尼莫地平注射液 200mgqdivgtt

答案：C

19. （2015 年真题）非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是（ ）。

- A: 肝病
- B: 胃肠类疾病
- C: 神经系统疾病
- D: 血液系统疾病

答案：B

20. 重症抑郁症的首选治疗方法是

- A: 电休克疗法

B: 食物疗法

C: 重复经颅磁刺激疗法

D: 光线疗法

答案：A

21. 归属专业学术机构网站的是

A: [www.google](http://www.google.com)

B: www.cmt.com.cn

C: www.ashp.org

D: www.merck.com

答案：C

22. 属于公众用药咨询的是

A: 抗菌药物的合理应用

B: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 注射剂溶媒的正确选择

答案：C

23. 不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

A: 高警示药品

B: 麻醉药品和第一类精神药品

C: 贵重药品

D: 第二类精神药品

答案：D

24. 荨麻疹患者常出现

- A: 血小板增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

25. 普通胰岛素的作用峰时为()。

- A: 6~12 小时
- B: 1.5~4 小时
- C: 0.6~1.5 小时
- D: 0.25~0.5 小时

答案：B

26. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三脂血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为()

- A: 0.1g, tid
- B: 0.5g, tid
- C: 0.5g, qd
- D: 0.2g, qd

答案：A

27. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 4 日
- B: 3 日
- C: 5 日

D: 2 日

答案：A

28. 药学服务的具体工作不包括

A: 处方审核

B: 关注特殊人群

C: 参与临床药物治疗

D: 治疗药物监测

答案：B

29. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

A: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量

B: 查处方，对临床诊断

C: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

D: 查临床诊断，对用药合理性

答案：C

30. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100pgpm 吸入，氨氯地平片 5mgqd 口服及硝酸甘油片 0.5mgpm 舌下含服。

A: 非洛地平

B: 普萘洛尔

C: 缬沙坦

D: 维拉帕米

答案：C

31. 关于左甲状腺素（L-T₄）的用药注意事项，错误的是

A: 需终生服药

B: 一般从 250~500 $\mu\text{g}/\text{d}$ 开始，每 1~2 周增加 250 μg ，直至达到治疗目标

C: 每天早餐前 60 分钟服药 1 次

D: 不能与钙剂、胆酸螯合剂（消胆胺）合用

答案：B

32. 中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 地高辛

C: 复方利血平

D: 氯苯那敏

答案：D

33. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 塞来昔布

B: 替加色罗

C: 培高利特

D: 钆贝葡胺

答案：D

34. 患者女，64 岁，10 天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服右美沙芬时应加用的药品是

A: 可待因

B: 氨茶碱

C: 氨溴索

D: 洛贝林

答案: C

35. 患者，男，50 岁，血压 170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: 利尿剂+CCB

B: 利尿剂+ARB

C: α 受体阻滞剂+ACEI

D: β 受体阻滞剂+ARB

答案: A

36. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查: 白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 感冒清热冲剂

B: 葡萄糖酸锌口服液

C: 头孢克洛干混悬剂

D: 维生素 C 片

答案: C

37. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

D: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案: B

38. 用于治疗前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂为

- A: 坦索罗辛
- B: 索利那新
- C: 特拉唑嗪
- D: 托特罗定

答案：A

39. 为解热或镇痛，有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

- A: 过敏反应
- B: 尿潴留和水肿
- C: 急性肾衰竭
- D: 重度肝损伤

答案：B

40. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

- A: 用药安全是药物治疗的前提
- B: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本
- C: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性
- D: 有效性是选择药物的首要标准

答案：B

41. 用 10% 的氯化钠注射液和注射用水配制 3% 的氯化钠注射液 100ml，所需的 10% 氯化钠注射液的毫升数是 ()

- A: 25
- B: 33.3
- C: 30
- D: 10

答案：C

42. 关于非甾体抗炎药的叙述正确是

- A: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全
- B: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素
- C: 发热时可首选非甾体抗炎药
- D: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药

答案：B

43. 1%硫酸镁溶液洗胃用于解救

- A: 铅中毒
- B: 磷化锌中毒
- C: 汞中毒
- D: 苯丙胺中毒

答案：A

44. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: β 受体阻断剂
- B: 钙通道阻断剂
- C: 精神刺激剂
- D: 利尿剂

答案：B

45. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是

- A: 依诺肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 血凝酶
- D: 阿司匹林

答案：A

46. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 阿替普酶
- B: 甘露醇
- C: 普通肝素
- D: 阿司匹林

答案：A

47. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 中国药学会的网址是

- A: www. cp
- B: org. cn
- C: www. cm
- D: org. cn

答案：D

48. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 双胍类降糖药
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 胰岛素
- D: 磺脲类降糖药

答案：A

49. 治疗时需长期口服维生素 D

- A: 老年性骨质疏松
- B: 抗癫痫药所致的骨质疏松
- C: 妇女绝经后骨质疏松
- D: 原发性骨质疏松

答案：B

50. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ()。

- A: 氟康唑
- B: 阿昔洛韦
- C: 硝苯地平
- D: 克林霉素

答案：C

51. 肾功能不全而肝功能正常者宜选用的药物是

- A: 经肝肾双途径消除的药物
- B: 肝毒性小、经肾排泄的药物
- C: 肾毒性小、经肝排泄的药物
- D: 经肝肠循环消除的药物

答案：A

52. 对由于胃肠、肝胆疾病引起的消化酶不足者可选用

- A: 甲氧氯普胺
- B: 莫沙必利
- C: 雷尼替丁
- D: 胰酶片

答案：D

53. 用于前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂是（）

- A: 索利那新
- B: 特拉唑嗪
- C: 托特罗定
- D: 坦索罗辛

答案：D

54. 高血压患者的降压目标一般患者高血压（）

- A: $<120 / 80\text{mmHg}$
- B: $<130 / 80\text{mmHg}$
- C: $<140 / 90\text{mmHg}$
- D: $<150 / 90\text{mmHg}$

答案：C

55. （2021 年真题）静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 万古霉素

答案：D

56. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 拉米夫定
- B: 依非韦伦
- C: 利巴韦林
- D: 阿昔洛韦

答案：B

57. 能提高运动员的呼吸功能，增加供氧能力，并能振奋精神的兴奋剂

- A: 利尿剂
- B: β -受体阻断剂
- C: 精神刺激剂
- D: 蛋白同化激素

答案：B

58. 去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药

- A: 氟伏沙明
- B: 吗氯贝胺
- C: 米氮平
- D: 氯米帕明

答案：C

59. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

- A: 复方氨基酸注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

60. 患者到药店购买鱼肝油，药师应给予()

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 维生素 AD
- D: 鱼油

答案：C

61. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 注意特殊人群用药
- B: 了解患者及家族的过敏史
- C: 注意定期监测器官功能
- D: 注意药物的迟发反应

答案：B

62. 从事药学服务的药师必须具备的能力要求是

- A: 扎实的外语专业知识
- B: 扎实的药学专业知识
- C: 扎实的人文知识
- D: 扎实的管理专业知识

答案：B

63. 儿童使用后可造成软骨病，18 岁以下儿童禁止使用的药物是

- A: 阿米卡星
- B: 阿奇霉素
- C: 莫西沙星
- D: 头孢哌酮

答案：C

64. 为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药，白三烯受体阻断剂

- A: 扎鲁司特
- B: 沙丁胺醇
- C: 茶碱
- D: 异丙托溴铵

答案：A

65. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

- A: 低浓度、快速滴注
- B: 高浓度、快速滴注，时间控制在 1 小时以内
- C: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 2 小时以上
- D: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 6 小时以上

答案：C

66. 处方中“合剂”的规范书写是

- A: Liq
- B: Dil
- C: Mist
- D: Dos

答案：C

67. 在流行期间多见于小儿及老年体弱者

- A: 肺炎型
- B: 胃肠型
- C: 病毒型
- D: 神经型

答案：A

68. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

- A: 处方点评
- B: 处方审核
- C: 参与健康教育
- D: 药物信息服务

答案：A

69. 以快速、准确地获得问题的答案是指

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对问题进行确定并归类

答案：A

70. 写明稀释比例和使用时间，是指

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 医嘱清楚准确
- D: 实现个体化治疗

答案：A

71. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙
- B: 福辛普利用于降压
- C: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- D: I 类手术切口应用第三代头孢菌素

答案：C

72. 避免用于儿童退热，可能引起 Reye's 综合征的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 布洛芬

C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

73. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 纳洛酮

C: 青霉胺

D: 氟马西尼

答案: D

74. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查 results，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

A: 应整片吞服

B: 长期服用可能会出现维生素 K 缺乏

C: 适宜餐前 30 分钟服用

D: 用药后可能出现头痛、便秘等不良反应

答案: B

75. (2016 年真题) 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

A: 阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用

B: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

C: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

D: 氨氯地平片可用于早上服用

答案: B

76. 对目标适应证患者(多中心试验)治疗作用的初步评价试验阶段，属于

- A: III期临床试验
- B: IV期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：D

77. 茶碱属于

- A: CYP1A2 底物药物
- B: CYP2C19 底物药物
- C: CYP3A4 诱导剂
- D: CYP3A4 抑制剂

答案：A

78. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

- A: 水溶性基质栓
- B: 滴眼剂
- C: 肝素等生物制品
- D: 胰岛素制剂

答案：A

79. 醛固酮受体拮抗剂

- A: 阿利吉仑
- B: 依普利酮
- C: 雷米普利
- D: 阿米洛利

答案：B

80. 中毒时宜用毛果芸香碱解毒，不能用毒扁豆碱解毒的药物是()。

- A: 乙酰胺
- B: 毒扁豆碱
- C: 卡马西平
- D: 阿托品

答案：D

81. 可以与多种金属离子结合发生沉淀，影响药物吸收的是

- A: 酒中的乙醇
- B: 茶叶中的鞣酸
- C: 食醋中的醋酸
- D: 食盐中的氯化钠

答案：B

82. (新生儿期的药动学特点)肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

- A: 药物中毒
- B: 药物代谢
- C: 药物吸收
- D: 药物排泄

答案：D

83. (常用的特殊解毒剂的适应证)，丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 纳洛酮
- B: 谷胱甘肽
- C: 二巯丁二钠

D: 乙酰半胱氨酸

答案：B

84. 射击运动员使用后,可减慢心率,减少心肌耗氧量,消除比赛前紧张心理,因此被列入兴奋剂管理的药物是()

A: 硝苯地平

B: 缬沙坦

C: 呋塞米

D: 普萘洛尔

答案：D

85. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

A: 齐多夫定

B: 利托那韦

C: 依非韦伦

D: 利巴韦林

答案：B

86. 可降低性传播疾病感染风险的个体避孕措施是

A: 宫内节育器

B: 使用避孕套

C: 口服复方短效避孕药

D: 外用杀精剂

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/477130154144010024>