
2022 年主管护师考试试题及答案

2022 年主管护师考试试题及答案

在平平淡淡的日常中，我们需要用到试题的状况特别的多，试题是命题者根据肯定的考核目的编写出来的。大家知道什么样的试题才是好试题吗？下面是我细心整理的 2022 年主管护师考试试题及答案，欢迎大家共享。

1、高渗性脱水时，病人首先表现为

- A. 黏膜干燥
- B. 皮肤弹性降低
- C. 口渴
- D. 尿量削减
- E. 高热

正确答案：C

2、关于小脑幕切迹疝的临床表现说法错误的是

- A. 消失进行性意识障碍
- B. 患侧上睑下垂及眼球外斜
- C. 病变同侧肢体瘫痪
- D. 对光反射消逝

E. 四肢全瘫，去大脑强直

正确答案：C

小脑幕切迹疝典型的临床表现是在颅内压增高的基础上，消失进行性意识障碍，患侧瞳孔最初有短暂的缩小，但多不易被发觉，以后渐渐散大、直接或间接对光反射消逝，并伴有患侧上睑下垂及眼球外斜。病变对侧肢体瘫痪、肌张力增加、腱反射亢进、病理征阳性。如脑疝连续进展，则消失深度昏迷，双侧眼球固定及瞳孔散大、对光反射消逝，四肢全瘫，去大脑强直，生命体征严峻紊乱，最终呼吸、心跳停止而死亡。

3、颅前窝骨折患者临床表现描述正确的是：

A. 熊猫眼征

B. 面神经损伤

C. 听神经损伤

D. 消失脑脊液鼻漏

E. 第9~12对脑神经损伤

正确答案：A

4、张力性气胸最突出的表现是

A. 反常呼吸

B. 缺氧

C. 痛苦

D. 伤侧胸膜腔高压呼吸极困难

E. 纵隔摇摆

正确答案：D

由于张力性气胸形成活瓣，空气只能进入胸腔，而不能排出，所以伤侧胸腔压力会越来越高，压缩伤侧肺，造成呼吸困难。

5、关于颅盖凹陷性骨折的表述，正确的是

A. 不会损伤神经

B. 不会损伤脑组织

C. 不会发生脑脊液漏

D. 不会发生颅内血肿

E. 骨折凹陷范围超过 3cm 须手术治疗

正确答案：E

6、门脉高压症合并食管胃底静脉曲张出血时，如三腔管压迫无效时，应采纳

A. 垂体后叶素

B. 加大输血量

C. 加大三腔管压力

D. 应用维生素 K

E. 马上行断流术

正确答案： E

对于因门脉高压食管胃底静脉曲张引起的上消化道出血，当非手术治疗效果不佳时，首选手术断流以阻断交通支反常血流达到止血效果。故选 E.

7、血栓闭塞性脉管炎局部缺血期的表现

A. 间歇性跛行

B. 静息痛

C. 屈膝抱足状

D. 趾端发烫

E. 浅静脉曲张

正确答案： A

8、关于腹膜炎的转归正确的是

A. 年轻体壮、抗病力量强者易发生粘连性肠梗阻

B. 腹膜炎治愈后，腹腔内多有不同程度粘连，均会发生粘连性肠梗阻

C. 趋于恶化者，腹膜严峻充血水肿但一般无渗出

D. 可形成麻痹性肠梗阻

E.预后不良，均加重休克，膈肌下降，影响呼吸循环功能

正确答案：D

9、关于腹部损伤治疗正确的是

A.肯定卧床休息

B.马上应用止痛药物

C.大量快速输液输血

D.流质饮食

E.早期宜加强功能熬炼

正确答案：A

腹部损伤患者宜肯定卧床休息，不宜过早活动故 A 正确而 E 错误；禁食至肠功能恢复后才能进流质故 D 不对；在未明确诊断前禁止应用止痛药物以免延误病情推断，故 B 不对；腹部损伤患者适当补液以维持循环稳定，大量快速输液会导致循环负荷过重故 C 不准确。因此选 A.

10、肠梗阻患者立位腹部平片的特征性转变为

A.肠腔内实性转变

B.可见各种肠型

C.有假肿瘤阴影

D.膈下有游离气体

E. 多个阶梯状排列的气液平面

正确答案：E

11、输入贮存过久的库存血时，易引起

A. 高钠血症

B. 低钙血症

C. 低钾血症

D. 高钾血症

E. 低钠血症

正确答案：D

12、属于休克代偿期的表现

A. 尿量正常

B. 表浅静脉塌陷

C. 血压正常或偏高

D. 表情淡漠

E. 谵妄

正确答案：C

休克代偿期的表现，血压正常或稍高，反映小动脉收缩状况的舒张压上升，故脉压缩小，以及心跳加快、四肢冷、出冷汗。尿量

正常或削减。尿比重上升，尿 pH 值下降，尿钾转变不明显，尿钠不高。若处理准时、得当，休克可得到订正。

13、胸外心脏按压有效的标志不包括

- A. 摸到颈动脉和股动脉搏动
- B. 口唇发绀渐渐减轻
- C. 收缩压在 80mmHg 以上
- D. 散大的瞳孔开始缩小
- E. 间或消失自主呼吸

正确答案：C

心脏按压时应能摸到颈动脉和股动脉的搏动，收缩压在 60mmHg 以上，口唇变红，瞳孔渐渐缩小，甚至消失自主呼吸时，才可认为是有效的。因此答案为 C。

14、肠梗阻明确诊断后，极为重要的是了解

- A. 梗阻的缘由
- B. 梗阻的部位
- C. 梗阻的程度
- D. 梗阻的发生速度
- E. 梗阻是否绞窄

正确答案：E

绞窄性肠梗阻，肠腔内因气体和液体的积储而膨胀，导致肠壁变薄，肠腔压力不断上升，到肯定程度时可使肠壁血循障碍。最终，肠管可缺血坏死而破溃穿孔。所以极为重要的是了解的是梗阻是否绞窄。

15、不属于老年人急性阑尾炎临床特点的是

- A. 白细胞上升不明显
- B. 病情通常较简单
- C. 易导致阑尾缺血坏死或穿孔
- D. 临床表现轻而病理转变重
- E. 体征不典型，主诉剧烈

正确答案：E

老年急性阑尾炎的临床特点：老年人低抗力低，阑尾壁薄，血管硬化，约 30% 病人就诊时阑尾已穿孔。另外，老年人大网膜已萎缩，穿孔后炎症不易局限，合并化脓性腹膜炎的机会较多。临床表现不典型，老年人反应力量低，腹痛不明显，常无转移性特点。由于腹肌已萎缩，即使阑尾已穿孔，腹膜刺激征也不明显。有时阑尾四周脓肿形成后，右下腹已消失包块，但不伴有急性炎症表现，临床上很似回盲部恶性肿瘤。老年人常并存有心血管疾病，慢性肺疾病，胃肠道疾病及代谢性疾病如糖尿病，这些疾病的症状可能与急性阑尾炎的临床表现相混淆，增加了诊断上的难度。

16、应用破伤风抗毒素的目的是

- A. 杀死破伤风杆菌

-
- B. 中和血液中游离毒素
 - C. 抑制破伤风杆菌生长
 - D. 中和与神经结合的毒素
 - E. 清除毒素来源

正确答案：B

破伤风抗毒素只能中和血液中游离的毒素，若毒素已与组织细胞结合，尽管尚未进展到消失临床症状，也不能被抗毒素中和。故无论预防或治疗时必需尽早给药。

17、服用碘剂的正确方法是

- A. 空腹直接口服
- B. 用温开水冲服
- C. 滴在固体食物上服用
- D. 用热开水冲服
- E. 不宜与食物同时服用

正确答案：C

碘剂口服时，一般以滴为剂量单位，采纳逐日递增或递减的方式，而且碘剂可刺激口腔和胃粘膜引起恶心、呕吐、食欲不振等副作用，经常于饭后用冷开水稀释服用，或将碘剂滴入食物中服用。

18、应首先处理的胸部损伤是

-
- A. 单纯肋骨骨折
 - B. 闭合性气胸
 - C. 开放性软组织损伤
 - D. 中等量血胸
 - E. 张力性气胸

正确答案：E

临床上，病人极度呼吸困难，端坐呼吸。缺氧严峻者，发绀、烦躁担心、昏迷，甚至窒息。张力性气胸征象消失迅猛，须疑有支气管断裂，应快速抢救，乃至剖胸探查。

19、在肺癌的治疗过程中，对手术、化疗、放疗等各种治疗方法进行合理选择和恰当应用时，首先应考虑的是

- A. 医院的技术条件
- B. 就诊时所选医师
- C. 患者的经济状况
- D. 患者的身体状况和肺癌分型及分期
- E. 患者主观最愿意接受的方法

正确答案：D

在肺癌的治疗过程中，对手术、化疗、放疗等各种治疗方法进行合理选择和恰当应用时，首先应考虑的是患者的身体状况和肺癌分型及分期。

20、女性患者，45 岁，腹股沟内下突然消失包块，痛苦不能回纳。患者可能诊断可能是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

正确答案： C

21、膀胱癌最常见的临床表现

- A. 尿频
- B. 血尿
- C. 尿痛
- D. 排尿困难
- E. 尿潴留

正确答案： B

22、骨折和脱位共有的特别体征是

- A. 特别活动

-
- B. 弹性固定
 - C. 骨擦音
 - D. 畸形
 - E. 正常关节部位空虚感

正确答案：D

骨折和关节脱位患者的特别体征是畸形：脱位后关节处明显畸形，在特别位置摸到移位的骨端短缩或延长。

23、关节脱位特征性表现描述正确的是

- A. 畸形、关节孟空虚
- B. 弹性固定、肿胀
- C. 关节孟空虚、关节痛苦
- D. 关节痛苦、畸形
- E. 肿胀、关节痛苦

正确答案：A

24、心绞痛患者半夜胸闷、胸痛发作，起床活动后好转，属于

- A. 早期左心衰竭
- B. 变异型心绞痛

C. 急性心肌梗死

D. 卧位型心绞痛

E. 混合型心绞痛

正确答案：D

卧位型心绞痛属重度自发性心绞痛。心绞痛发作于平卧位时，且必需坐起或须站立才能缓解。有的患者仅在夜间平卧睡眠时发作。经冠状动脉造影显示这类患者常有多支冠状动脉严峻病变或主干病变。其发生机制尚无统一看法。认为和心肌耗氧的增加超过了原有狭窄的冠状动脉储备力量和左心功能不全有关。

25、患者 CT 示高密度阴影，可初步拟诊为

A. 脑出血

B. 脑栓塞

C. 脑血栓

D. 急性颅内压增高

E. 短暂性脑缺血发作

正确答案：A

CT 示高密度影是脑出血的特点。

26、肢体能在床上移动，但不能反抗自身重力

A. 肌力 1 级

B. 肌力 2 级

C. 肌力 3 级

D. 肌力 4 级

E. 肌力 5 级

正确答案： B

27、异烟肼的主要不良反应是

A. 肝损害

B. 听力障碍

C. 胃肠道不适

D. 末梢神经炎

E. 球后视神经炎

正确答案： D

28、糖尿病患者掌握饮食的目的是

A. 削减胰液分泌

B. 减轻体重、防止肥胖

C. 削减胃液分泌

D. 减慢肠蠕动、防止腹泻

E. 掌握血糖减轻胰岛 β 细胞的负担

正确答案：E

饮食治疗是糖尿病最基本的治疗措施。其目的在于维持标准体重，保证未成年人的正常生长发育，减轻胰岛负担，降低血糖。

29、一般型流行性脑脊髓膜炎败血症期患者消失的皮疹是

A. 大量出血性皮疹

B. 瘀点和瘀斑

C. 脓疱疹

D. 丘型皮疹

E. 玫瑰色斑丘疹

正确答案：B

流行性脑脊髓膜炎 70% ~90% 患者皮肤或黏膜有瘀点或瘀斑，直径 1~2mm，开头为鲜红色，后为紫红色，严峻者瘀斑快速扩大。其中心因血栓形成而坏死。

30、有机磷农药中毒引起的毒蕈碱样症状是

A. 呼吸肌麻痹

B. 肌束抖动

C. 血压上升

D. 轻度意识障碍

E.瞳孔缩小

正确答案：E

毒蕈碱样症状消失最早，主要是副交感神经末梢兴奋所致。其表现为腺体分泌增加及平滑肌痉挛。表现为头晕、头痛、多汗、流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小、视物模糊、支气管分泌物增多、呼吸困难，严峻者消失肺水肿。

31、给肺炎球菌肺炎绘制体温曲线，热型最可能是

A.弛张热

B.间歇热

C.稽留热

D.反复热

E.不规章热

正确答案：C

32、下列哪项不是推断肺心病氧疗有效的表现

A.皮肤转暖

B.发绀减轻

C.呼吸过缓或间停呼吸

D.呼吸频率减慢、节律正常

E. 心率减慢，节律正常

正确答案：C

呼吸过缓或间停呼吸是呼吸抑制的表现，提示病情危重。

33、类风湿关节炎特征性症状是

A. 关节发红

B. 痛苦明显

C. 肿胀明显

D. 局部发热

E. 晨起僵硬

正确答案：E

晨僵是类风湿关节炎的常见临床表现，是观看类风湿活动的指标之一。

34、洋地黄中毒引起的心律失常中，最常见的是

A. 心房抖动

B. 房性期前收缩

C. 室性期前收缩

D. 房室传导阻滞

E. 非阵发性交界性心动过速

正确答案：C

35、急性腹痛 8 小时，怀疑胰腺炎，具有诊断价值的检查为

- A. 血清淀粉酶
- B. 血清脂肪酶
- C. 空腹血糖
- D. 腹部 X 线平片
- E. 白细胞计数及分类

正确答案：A

血清（胰）淀粉酶起病后 6~12h 开始上升，48h 下降，持续 3~5d.血清脂肪酶常在病后 24~72h 上升，持续 7~10d.

36、可用于低血糖反应的急救有效措施是

- A. 氧气吸入
- B. 就地休息
- C. 大量饮水
- D. 马上静滴氯化钠
- E. 马上食糖果或含糖饮料

正确答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477145122026006133>