

2024 年山东省汶上县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题通关秘籍题库附答案 【培优 B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 地塞米松
- D: 右美沙芬

答案：B

2. （2017 年真题）患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 硝酸甘油+美托洛尔
- B: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪
- C: 利血平+氨苯蝶啶
- D: 氨氯地平+氢氯噻嗪

答案：D

3. 可同时作用于胰岛 α 、 β 细胞的是

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍

C: 西格列汀

D: 胰岛素

答案: C

4. 下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

A: 其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关

B: 对肝硬化者无效

C: 利尿作用强，药效持久

D: 具有抑制心肌纤维化的功能

答案: D

5. 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

A: 低镁血症

B: 高钙血症

C: 低钾血症

D: 低钙血症

答案: C

6. 下述药物中属于鼻腔减充血剂的是

A: 布地奈德气雾剂

B: 色甘酸钠溶液

C: 盐酸麻黄碱溶液

D: 链霉素溶液

答案: C

7. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

A: 利多卡因

B: 美托洛尔

C: 硝酸甘油

D: 索他洛尔

答案：A

8. 碳酸氢钠可用于

A: 代谢性碱中毒

B: 呼吸性碱中毒

C: 呼吸性酸中毒

D: 代谢性酸中毒

答案：D

9. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 阿糖胞苷

C: 环磷酰胺

D: 甲氨蝶呤

答案：D

10. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺蛋白水解酶

B: 抑制 Na^+-K^+ 泵

C: 抑制甲状腺过氧化酶

D: 抑制碘泵

答案：C

11. 可能导致牙龈出血的药物是

A: 依诺肝素

B: 拉西地平

C: 普萘洛尔

D: 普伐他汀

答案: A

12. 戒断症状是 5-HT 再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

A: 长期服用致 5-HT、NE、DA 分解增加

B: 长期服用使脑内 5-HT 受体敏感性下调

C: 长期服用药物对 5-HT 受体无亲和力

D: 长期服用脑内 5-HT 受体数目减少

答案: B

13. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 来曲唑

C: 紫杉醇

D: 顺铂

答案: B

14. 下列关于 5 α -还原酶抑制剂的描述，错误的是()

A: 可引起前列腺上皮细胞萎缩

B: 对膀胱颈和平滑肌没有作用

C: 与 $\alpha 1$ 受体阻断药相比，更易引起性功能障碍

D: 作用是不可逆的

答案: D

15. 体内缺乏维生素 E 会导致

A: 佝偻病

B: 夜盲症

C: 孕育异常

D: 脚气病

答案: C

16. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ()

A: 螺内酯

B: 美司钠

C: 二甲双胍

D: 氯化钾

答案: B

17. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

A: 雷尼替丁

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 甘草酸二铵

D: 甲氧氯普胺

答案: C

18. (2016 年真题) 属于长效 β_2 受体激动剂的平喘

A: 布地奈德

B: 沙美特罗

C: 多索茶碱

D: 沙丁胺醇

答案: B

19. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 氯化钾、葡萄糖注射液
- B: 利尿剂
- C: 阿托品
- D: 苯妥英钠

答案：A

20. 属于抗炎类保肝药的是

- A: 异甘草酸镁
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 双环醇

答案：A

21. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 氨苄西林
- B: 哌拉西林
- C: 青霉素 V
- D: 苯唑西林

答案：D

22. 关于艾塞那肽的描述，不正确的是

- A: 适用于糖尿病酮症酸中毒
- B: 应注意是否有过敏性症状
- C: 可造成消化不良
- D: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状

答案：A

23. 利福平联用伏立康唑使

- A: 吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 疗效减弱
- D: 月经不规则

答案：C

24. 与氯霉素特点不符的是()

- A: 易透过血脑屏障
- B: 口服难吸收
- C: 适用于伤寒的治疗
- D: 骨髓毒性明显

答案：B

25. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

- A: 华法林+低分子量肝素
- B: 低分子量肝素
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：A

26. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 环氧酶抑制剂
- B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂
- C: 整合素受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

27. (2016 年真题) 可使血小板内环磷腺苷 (cAMP) 浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 双嘧达莫

答案: D

28. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

- A: 可吸附肠内细菌及有毒气体
- B: 用于急、慢功能性腹泻
- C: 能提高肠张力，减少肠蠕动
- D: 长期应用可产生依赖性

答案: A

29. 长期大量服用维生素 A 会出现 ()

- A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案: C

30. 具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 维拉帕米
- C: 硝酸甘油
- D: 哌唑嗪

答案：B

31. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 孟鲁司特
- B: 多索茶碱
- C: 布地奈德
- D: 沙美特罗

答案：A

32. 需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 红霉素

答案：C

33. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定可用于治疗重度高血压
- B: 可乐定可用于治疗中度高血压
- C: 可乐定是中枢性降压药
- D: 可乐定可用于治疗高血压危象

答案：A

34. 因改变肠道内寄生菌群的生长，使迟缓真杆菌的转化作用受到抑制，导致地高辛的生物利用度和血药浓度增加的是

- A: 克拉霉素
- B: 呋塞米
- C: 硫酸镁

D: 胺碘酮

答案：A

35. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

A: 拉米夫定

B: 乙胺嘧啶

C: 奥司他韦

D: 吡喹酮

答案：C

36. (2020 年真题) 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

A: 依他尼酸

B: 托拉塞米

C: 布美他尼

D: 呋塞米

答案：A

37. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A: 丝裂霉素

B: 阿霉素

C: 放线菌素 D

D: 环磷酰胺

答案：C

38. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

A: 局部止血作用

B: 可以中和胃酸

C: 抑制胃酸分泌作用

D: 主要是抑制 H^+ , K^+ -ATP 酶

答案: B

39. 治疗慢性失血（如内痔出血）所致的贫血应选用

A: 硫酸亚铁

B: 维生素 B

C: 叶酸

D: 谷维素

答案: A

40. （2017 年真题）具有留钾作用的利尿药是（）

A: 甘露醇

B: 甘油果糖

C: 螺内酯

D: 去氨加压素

答案: C

41. 可用于降低眼压的药物是（）

A: 利福平

B: 阿托品

C: 左氧氟沙星

D: 卡替洛尔

答案: D

42. 阿斯综合征患者禁用

A: 丙戊酸钠

B: 苯妥英钠

C: 氨己烯酸

D: 卡马西平

答案: B

43. 选择性沉积在牙齿和骨骼中,不可用于 8 岁以下患儿的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 四环素类

C: 氨基糖苷类

D: 大环内酯类

答案: B

44. 与多柔比星合用或配伍可增加肝毒性的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 利福平

C: 阿糖胞苷

D: β 受体阻断剂

答案: B

45. 应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时,可应用的急救药物是()

A: 维生素 K

B: 维生素 B

C: 维生素 K

D: 维生素 K

答案: D

46. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

A: 地屈孕酮

B: 环磷酰胺

C: 聚甲酚磺醛

D: 阿霉素

答案: C

47. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

A: 依那普利

B: 硝酸甘油

C: 氨氯地平

D: 哌唑嗪

答案: D

48. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A: 甲硝唑

B: 多黏菌素

C: 呋喃妥因

D: 克林霉素

答案: A

49. 阿托品引起便秘的原因是()

A: 抑制胃肠道腺体分泌

B: 使括约肌兴奋

C: 松弛肠道平滑肌

D: 抑制排便反射

答案: C

50. 患儿，女，10 岁，体重 35kg，因发热、咳嗽 10 日而入院。体温波动于 38.5℃~39.5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共 6 日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X 线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

- A: 12 日
- B: 5 日
- C: 10 日
- D: 7 日

答案：D

51. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

- A: 不孕症
- B: 脚气病
- C: 佝偻病
- D: 夜盲症

答案：A

52. 目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

- A: 氨茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 特布他林
- D: 沙美特罗

答案：D

53. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次 / 分，R21 次 / 分，BP110 / 70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度
- B: 该万古霉素浓度偏低
- C: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物
- D: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

答案：C

54. 扁平疣可选用

- A: 酮康唑
- B: 维 A 酸
- C: 林旦霜
- D: 阿达帕林

答案：B

55. 所有诊断为冠心病的患者均应长期服用阿司匹林，剂量为每日

- A: 10~25mg
- B: 150~300mg
- C: 75~150mg
- D: 25~50mg

答案：C

56. 达那唑的适应证不包括

- A: 纤维性乳腺炎
- B: 子宫内膜异位症
- C: 男性乳房发育
- D: 白细胞减少症

答案：D

57. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 胺碘酮
- B: 葡萄糖
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 利多卡因

答案：C

58. 对肾功能影响较小的抗高血压药是()

- A: 利血平
- B: 卡托普利
- C: 肼屈嗪
- D: 胍乙啶

答案：C

59. 从植物中提取，具有促进白细胞增生、抗炎、降血压、抗肿瘤、抗心肌缺氧缺血、抗心律失常等作用的是

- A: 丙酸诺龙
- B: 小檗胺
- C: 鲨肝醇
- D: 维生素 B4

答案：B

60. 与长春新碱合用可增强神经毒性

- A: 非格司亭
- B: 异烟肼
- C: 替尼泊苷

D: 铂类

答案：C

61. (2019 年真题) 患者首次使用西妥昔单抗，为减轻其不良反应，常规预处理使用的药物是 ()

A: 质子泵抑制剂

B: 化疗止吐类药物

C: 维生素类药物

D: 抗组胺类药物

答案：D

62. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

A: 心源性哮喘禁用吗啡

B: 多痰患者禁用可待因

C: 室上性心动过速禁用哌替啶

D: 颅脑损伤患者禁用羟考酮

答案：A

63. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

A: 诱发甲亢

B: 口中金属味

C: 粒细胞减少

D: 肝炎

答案：A

64. 使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是 ()

A: 肌酐清除率低于 40% 的患者

B: 肌酐清除率低于 50% 的患者

C: 肌酐清除率低于 60%的患者

D: 肌酐清除率低于 30%的患者

答案：B

65. 螺内酯临床常用于

A: 尿崩症

B: 急性肾功能衰竭

C: 醛固酮升高引起的水肿

D: 脑水肿

答案：C

66. 下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是()

A: 对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗

B: 全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

C: 细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物

D: 对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗

答案：B

67. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

A: 丙戊酸钠

B: 地西泮

C: 左乙拉西坦

D: 乙琥胺

答案：A

68. (2015 年真题) 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是 ()。

- A: 多柔比星
- B: 氟尿嘧啶
- C: 多西他赛
- D: 伊立替康

答案: A

69. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

- A: 氟西汀
- B: 佐匹克隆
- C: 卡马西平
- D: 地西泮

答案: B

70. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 在血中以游离状态存在
- B: 口服吸收缓慢
- C: 不与血浆蛋白结合
- D: 在体内维持时间短，不代谢

答案: B

71. 服用伊马替尼的时间是

- A: 睡前
- B: 餐前 1 小时
- C: 进餐时
- D: 餐后 2 小时

答案: C

72. 下列哪项不能提高镇静催眠药用药安全性

- A: 镇静催眠药可交替使用
- B: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- C: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- D: 服用后应避免高速高空作业

答案：B

73. 选择性抑制 COX-2 的是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

74. (2016 年真题) 不属于口服避孕药所致不良反应的是

- A: 低钙血症
- B: 突破性出血
- C: 增加血栓栓塞性疾病风险
- D: 月经失调

答案：A

75. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 在避光输液瓶中使用
- B: 可使用微量输液泵

C: 使用 5%葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过 24 小时

D: 紧急时可静脉注射

答案: D

76. 关于口服硫酸亚铁的注意事项，不正确的是

A: 宜在餐后或餐时服用

B: 治疗剂量不得长期使用

C: 颗粒剂应热开水冲服

D: 老年人可适当增加剂量

答案: C

77. 治疗可能引起中枢神经系统毒性，包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作，故不应用于治疗脑膜炎的是

A: 厄他培南

B: 美罗培南

C: 亚胺培南

D: 西司他丁

答案: C

78. 多柔比星

A: 直接破坏 DNA 结构和功能

B: 干扰核酸生物合成

C: 影响蛋白质合成和功能

D: 干扰 RNA 转录

答案: D

79. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

A: 肝素

- B: 华法林
- C: 磺达肝癸钠
- D: 尿激酶

答案：D

80. 属于抗反转录病毒药物的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 司他夫定
- C: 奥司他韦
- D: 恩替卡韦

答案：B

81. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

- A: 坦洛新
- B: 西地那非
- C: 他达拉非
- D: 度他雄胺

答案：A

82. 氨基糖苷类

- A: 禁用于 8 岁以下儿童
- B: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于胆道阻塞患者

答案：A

83. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钙

- B: 果糖
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钾

答案：A

84. 容易发生双硫仑样反应的药物包括()

- A: 青霉素
- B: 链霉素
- C: 头孢唑林
- D: 阿莫西林

答案：C

85. 可引起心率加快，瞳孔散大、视物模糊及中枢镇静作用的药物是

- A: 后马托品
- B: 阿托品
- C: 东莨菪碱
- D: 山莨菪碱

答案：C

86. 属于芳基乙酸类的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 吲哚美辛

答案：D

87. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/477155111150010024>