2024年安徽省青阳县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题王牌题库完整

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

A：维生素

B：果糖

C：葡萄糖

D：氨基酸

答案：C

2.（2019年真题）可用于预防风湿热复发的药物是（）

A：甲硝唑

B：呋喃妥因

C：庆大霉素

D：苄星青霉素

答案：D

3.（2021年真题）作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是（）

A：丙氨酰谷氨酰胺注射液

B：复方氨基酸注射液（9AA）

C：赖氨酸注射液

D：复方氨基酸注射液（18AA）

答案：B

4.对肝素的正确描述是

A：直接抑制凝血因子的活化

B：可抑制血小板聚集

C：仅在体内有抗凝作用

D：可以口服给药

答案：A

5.（2021年真题）属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是（）

A：环磷酰胺

B：来曲唑

C：厄洛替尼

D：长春新碱

答案：D

6.利福平与口服避孕药合用

A：不良反应叠加

B：后者血药浓度升高，不良反应增加

C：药理作用拮抗

D：后者血药浓度下降，药效降低

答案：D

7.四环素类的主要作用靶点是

A：细胞内膜PBP

B：细胞壁丙氨酰丙氨酸

C：核糖体的30S亚基

D：核糖体的50S亚基

答案：C

8.下列不属于肽类抗生素的是

A：万古霉素

B：去甲万古霉素

C：利奈唑胺

D：多黏菌素B

答案：C

9.关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

A：对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

B：乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

C：乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

D：乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

答案：A

10.长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

A：利福平

B：氨苄西林

C：四环素

D：复方磺胺甲噁唑

答案：A

11.留钾利尿药若每日服用1次，最宜的服用时间是

A：早餐前1小时

B：早餐时

C：午餐前1小时

D: 午餐时

答案：B

12.以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者,宜使用的药物是

A: 多烯磷脂酸胆碱

B: 甘草酸二铵

C: 葡醛内酯

D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

13.患者，男，55岁。1小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B型超声波检查：肾结石。

A: 增加镇痛作用

B: 增加解痉作用

C: 防止成瘾

D: 镇痛和解痉作用

答案：D

14.弱效(使LDL-ch水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

A: 小剂量阿托伐他汀

B: 大剂量阿托伐他汀

C: 小剂量氟伐他汀

D: 依折麦布

答案：C

15.（2021年真题）渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是（）

A：米卡芬净

B：环吡酮胺

C：克霉唑

D：特比萘芬

答案：B

16.下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

A：叶酸+维生素B

B：亚叶酸钙

C：维生素B

D：叶酸

答案：B

17.需要嚼碎服用的药品是

A：胰酶肠溶片

B：乳酸菌素片

C：泮托拉唑肠溶片

D：胶体果胶铋胶囊

答案：B

18.激动α

A：肼屈嗪

B：可乐定

C：硝普钠

D：哌唑嗪

答案：B

19.用于抗结核杆菌的药物是

A: 新霉素
B: 异烟肼
C: 妥布霉素
D: 庆大霉素
答案：B

20.作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是
A: 甲氧氯普胺
B: 西沙必利
C: 多潘立酮
D: 莫沙必利
答案：C

21.常引起外周神经炎的抗肿瘤药是
A: 甲氨蝶呤
B: 巯嘌呤
C: 长春新碱
D: 氟尿嘧啶
答案：C

22.患者女，59岁，既往高脂血症病史5年，心功能Ⅱ级。因发现血压升高7天入院。入院查体血压172/95mmHg，心率62次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。
A: 氢氯噻嗪
B: 双氯芬酸
C: 特拉唑嗪
D: 美托洛尔
答案：A

23.又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

A：维生素B4

B：小檗胺

C：鲨肝醇

D：丙酸诺龙

答案：A

24.属于糖皮质激素禁忌症的是

A：类风湿性关节炎

B：严重高血压

C：过敏性皮炎

D：再生障碍性贫血

答案：B

25.不易透过血一脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性M受体阻断药是

A：奥昔布宁

B：托特罗定

C：黄酮哌酯

D：索利那新

答案：B

26.为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

A：聚维酮碘

B：过氧乙酸

C：依沙吖啶

D：氯己定

答案：C

27.应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

A：B淋巴细胞表面的CD20抗原

B：血管内皮生长因子

C：人表皮生长因子受体-2

D：表皮生长因子受体

答案：C

28.老年人对苯二氮䓬类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

A：老年期痴呆

B：“宿醉”现象

C：震颤麻痹综合征

D：戒断综合征

答案：B

29.头孢克洛不宜用于

A：呼吸道感染

B：脑膜炎

C：泌尿系统感染

D：中耳炎

答案：B

30.广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：B

31.作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 人血白蛋白

C: rhGM-CSF

D: 维生素B12

答案：C

32.金刚烷胺与多潘立酮合用

A: 可增加抗胆碱不良反应的危险

B: 增加锥体外系不良反应的风险

C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D: 增加肾毒性

答案：B

33.对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

A: 表柔比星

B: 多柔比星

C: 柔红霉素

D: 吡柔比星

答案：B

34.仅对蛔虫、蛲虫混合感染有效的是()

A: 甲苯咪唑

B: 噻嘧啶

C: 哌嗪

D: 氯硝柳胺

答案：C

35.阿糖胞苷属于

A: DNA多聚酶抑制剂

B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: 胸苷酸合成酶抑制剂

D: 二氢叶酸还原酶抑制剂

答案：A

36.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 尿道刺激

B: 肾结石

C: 胃肠道反应

D: 促进血栓形成

答案：A

37.关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

A: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的2～4倍

B: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的2倍

C: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的2倍

D: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的2～4倍

答案：D

38.患者,男,64岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院,血压203/110mmHg,该患者宜首选（如果疗程超过72小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是

A: 美托洛尔

B: 氨氯地平

C: 硝普钠

D: 贝那普利

答案：C

39.静脉注射速度不宜超过50mg/min的是

A: 氯化钠

B: 氯化钙

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钾

答案：B

40.以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 洋葱

B: 菠菜叶

C: 红叶苋菜

D: 脱皮黄瓜

答案：D

41.属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

A：头孢拉定

B：头孢吡肟

C：头孢克肟

D：头孢克洛

答案：A

42.属于5-HT

A：甲氧氯普胺

B：甲地孕酮

C：格雷司琼

D：阿瑞吡坦

答案：C

43.通过抑制HMG-CoA还原酶调血脂的药物是

A：洛伐他汀

B：阿昔莫司

C：烟酸

D：依折麦布

答案：A

44.低精蛋白锌胰岛素是

A：磺酰脲类

B：长效类胰岛素

C：α-葡萄糖苷酶抑制剂

D：中效类胰岛素

答案：D

45.不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

A：二甲双胍
B：阿卡波糖
C：甲苯磺丁脲
D：苯乙双胍
答案：A

46.氯霉素属于
A：酰胺醇类
B：β-内酰胺类
C：氨基糖苷类
D：四环素类
答案：A

47.关于奥司他韦作用特点的说法,错误的是()
A：应严格掌握奥司他韦适应证,不能用于流感的预防
B：奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗
C：1岁以上儿童可以使用奥司他韦
D：治疗流感时,首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的48小时以内
答案：A

48.氨基糖苷类作用机制
A：干扰细菌核酸代谢
B：抑制细菌蛋白质合成
C：抑制细菌糖代谢
D：抑制细菌细胞壁合成
答案：B

49.毒性低，但胃肠刺激症状较常见的药物是()

A：对氨基水杨酸

B：吡嗪酰胺

C：利福平

D：异烟肼

答案：A

50.磺酰脲类降糖药的作用机制是

A：刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B：加速胰岛素合成

C：提高胰岛 β 细胞功能

D：抑制胰岛素降解

答案：A

51.（2021年真题）患者，女，67岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前12小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第7天出院。

A：利伐沙班

B：替格瑞洛

C：双嘧达莫

D：氯吡格雷

答案：A

52.患者，女，45岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A：吡达帕胺

B：普萘洛尔

C：赖诺普利

D: 氨氛地平

答案：B

53.服用后可能导致口中有氨味、舌、大便变黑，牙齿变色的药物是

A: 胶体果胶铋

B: 雷尼替丁

C: 硫糖铝

D: 兰索拉唑

答案：A

54.下述哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗

A: 未根治的体股癣

B: 钱币状湿疹

C: 固定性药疹

D: 异位性皮炎

答案：A

55.双香豆素与维生素K

A: 产生协同作用

B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C: 竞争性对抗

D: 与其竞争结合血浆蛋白

答案：C

56.糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

A: 大剂量冲击疗法

B: 小剂量替代疗法

C: 一般剂量长期疗法

D: 隔日一次给药法

答案：A

57.（2016年真题）属于贝丁酸类调节血脂药的是

A: 阿昔莫司

B: 阿托伐他汀

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：C

58.巴比妥类急性中毒时，导致死亡的主要原因是

A: 肝损害

B: 心搏骤停

C: 肾损害

D: 呼吸循环衰竭

答案：D

59.洋地黄毒苷的半衰期是()

A: 5天

B: 7天以上

C: 72小时

D: 48小时

答案：B

60.服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是（）

A: 不推荐65岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

B: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

C：应长期合用质子泵抑制剂

D：用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

答案：D

61.治疗青光眼宜选用

A：毛果芸香碱滴眼液

B：碘苷滴眼液

C：复方托吡卡胺滴眼液

D：左氧氟沙星滴眼液

答案：A

62.前列腺素类似物的降眼压机制是

A：减少房水生成

B：浓缩玻璃体

C：开放小梁网

D：增加巩膜葡萄膜通路房水外流

答案：D

63.氨基酸的主要作用不包括

A：调节体内酸碱平衡

B：维持氮平衡

C：转变为糖或脂肪

D：合成蛋白质

答案：A

64.服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

A：维生素B12

B：维生素B2

C：对乙酰氨基酚

D：维生素B1

答案：A

65.阿托品引起便秘的原因是()

A：松弛肠道平滑肌

B：抑制排便反射

C：抑制胃肠道腺体分泌

D：使括约肌兴奋

答案：A

66.糖皮质激素的药理作用不包括

A：抗炎

B：免疫抑制

C：抗病毒

D：抗休克

答案：C

67.急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

A：鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用2%酚甘油滴耳序贯治疗

B：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染

D：鼓膜穿孔前可使用3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：B

68.关于艾塞那肽的注意事项描述，不正确的是()

A：肾移植患者慎用

B：本品可肌内注射

C：应注意是否有过敏性症状

D：服药期间应警惕急性胰腺炎症状

答案：B

69.使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

A：7日

B：3日

C：5日

D：1日

答案：B

70.对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A：利尿剂

B：阿托品

C：氯化钾、葡萄糖注射液

D：苯妥英钠

答案：D

71.舒张支气管作用比β2受体激动剂弱且慢，但不易产生耐受性，适用于有吸烟史的老年哮喘患者的药物是

A：沙丁胺醇

B：吸入性糖皮质激素

C：噻托溴铵

D：孟鲁司特

答案：C

72.抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

A：子宫不规则出血

B：多毛、痤疮

C：增加哺乳期妇女的乳汁分泌

D：肾功能损害

答案：A

73.（2020年真题）适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者,但不宜长期使用,用药7日症状未缓解应停药的恶心性祛痰药物是

A：溴己新

B：氯化铵

C：乙酰半胱氨酸

D：氨溴索

答案：B

74.常用治疗胃肠道癌，是结直肠癌的首选药之一的药物是()

A：塞替派

B：环磷酰胺

C：奥沙利铂

D：丝裂霉素

答案：C

75.放射性碘

A：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

B：使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

C：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：A

76.广谱调血脂药物是

A: 考来烯胺

B: 吉非罗齐

C: 烟酸

D: 氯贝丁酯

答案：C

77.与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

A: 放线菌素

B: 肝素

C: 氧烯洛尔

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

78.患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 阿奇霉素

B: 依替米星

C: 左氧氟沙星

D: 克林霉素

答案：D

79.（2017年真题）可用于吗啡中毒解救的药物是（）

A: 苯甲酸钠咖啡因

B: 氟马西尼

C: 阿托品

D: 纳洛酮

答案：D

80.属于胸苷酸合成酶抑制剂

A: 紫杉醇

B: 氟尿嘧啶

C: 顺铂

D: 放线菌素

答案：B

81.阿托品2mg时，出现的症状为()

A: 语言不清

B: 瞳孔轻度散大

C: 略有口干

D: 瞳孔扩大

答案：D

82.苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

A: 20μg/ml

B: 25μg/ml

C: 10μg/ml

D: 15μg/ml

答案：A

83.下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

A: 林旦霜

B：过氧苯甲酰

C：苯甲酸苄醇

D：硫黄软膏

答案：B

84.我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗癌药

A：青蒿素

B：伯氨喹

C：氯喹

D：奎宁

答案：A

85.不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

A：ACEI对肾脏有保护作用

B：ACEI类禁用于双侧肾动脉狭窄者

C：ACEI可引起反射性心率加快

D：ACEI可改善左心室功能

答案：C

86.（2015年真题）治疗侵袭性曲霉菌病首选（）。

A：灰黄霉素

B：伏立康唑

C：氟康唑

D：氟胞嘧啶

答案：B

87.患者，男，42岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/477156200052010024