

五月中旬主治医师考试内科训练试卷（附答案）

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、不符合霍奇金病诊断论述的是

- A、对诊断具有重要依据的是淋巴结、肝、脾等活体组织的检查
- B、细胞免疫功能低下
- C、多数病例可通过血循环播散变为白血病
- D、无痛性进行性淋巴结肿大
- E、X 线检查提示肺、骨、胃肠等器官病变

【参考答案】：C

2、合并糖尿病视网膜病变的结核患者，禁用下列哪种抗结核药物

- A、RFP
- B、EMB
- C、PAS
- D、PEA
- E、INH

【参考答案】：B

3、我国门脉性肝硬化最常见的原因是

- A、慢性酒精中毒
- B、营养不良
- C、胆道阻塞
- D、血吸虫病
- E、病毒性肝炎

【参考答案】：E

4、调整血脂药物，主要降低血甘油三酯的是

- A、多烯康
- B、考来替泊
- C、非诺贝特
- D、阿西莫司
- E、洛伐他汀

【参考答案】：C

5、下述哪项不属器官特异性自身免疫病

- A、青年型糖尿病
- B、自身免疫性肝病
- C、系统性红斑狼疮
- D、自身免疫性溶血性贫血
- E、重症肌无力

【参考答案】：C

6、为及时治疗急性中毒，作为中毒诊断的主要依据是

- A、毒物接触史
- B、临床表现
- C、毒物分析
- D、毒物接触史+临床分析
- E、毒物接触史+毒物分析

【参考答案】：D

7、下面哪项不属于不良睡眠卫生习惯

- A、噪音过大

- B、卧室光线太暗
- C、室温过高或过低
- D、睡眠时间无规律
- E、睡前从事易兴奋活动

【参考答案】：B

8、神经系统遗传病可分为 4 大类，下面应排除哪项

- A、多基因遗传病
- B、线粒体遗传病
- C、单基因遗传病
- D、染色体病
- E、先天性共济失调

【参考答案】：E

9、有关免疫学检查，哪项是错误的

- A、大多数用以检测抗体的方法都可用于检测抗原
- B、特异性抗体检测可以反映人群的感染率
- C、恢复期特异性抗体滴度比急性期上升 4 倍有助于确诊
- D、皮肤试验不属于免疫学检查
- E、T 细胞亚群检测常用于艾滋病的诊断

【参考答案】：D

10、单纯性甲状腺肿最常见的病因是

- A、缺碘
- B、桥本甲状腺炎后
- C、碘过多

D、药物性甲状腺功能减退

E、先天性缺陷

【参考答案】：A

11、遗传性球形红细胞增多症成年发病比例为

A、1 / 3

B、1 / 4

C、2 / 3

D、1 / 5

E、2 / 5

【参考答案】：C

12、多器官功能障碍综合征是下列哪项疾病的严重阶段

A、SIRS

B、CARS

C、ALI/ARDS

D、肾功能衰竭

E、心力衰竭

【参考答案】：B

13、女性，58岁，夜间从噩梦中醒来，感胸骨后压榨性闷痛，伴呼吸困难，胸痛及呼吸困难持续不能缓解，患者出现面色苍白，冷汗淋漓，血压明显下降，皮肤发绀，此发绀属于

A、缺血性发绀

B、淤血性发绀

C、混合性发绀

D、心性混血性发绀

E、肺性发绀

【参考答案】：A

14、PAN 的 ACR 分类标准关于肌痛、无力或下肢触痛的定义不包括

A、弥漫性肌痛

B、肌无力

C、以上都不是

D、肩部肌痛和骨盆带肌痛

E、小腿肌肉压痛

【参考答案】：D

15、周围型肺癌常见的组织分型为

A、类癌

B、腺癌

C、鳞癌

D、未分化癌

E、大细胞癌

【参考答案】：B

16、男性，35 岁。阵发性右上腹痛 2 天，疼痛时大汗淋漓，向右肩放射，昨日大便呈黑色来诊。体检：巩膜轻度黄染，右上腹压痛，Mushy 征(+)，肝压叩痛(+)，脾未扪及。最可能的诊断是

A、胃溃疡并出血

B、十二指肠溃疡并出血

C、胃癌并出血

D、胆道出血

E、急性胃黏膜病变

【参考答案】：D

17、有关消化性溃疡的病理描述，最正确的是

- A、对吻性溃疡仅发生于十二指肠
- B、1 个以上的溃疡称为复合性溃疡
- C、胃溃疡的直径多数 2.5cm
- D、溃疡的愈合多在 2~4 周
- E、胃溃疡多发生于泌酸最强的区域内

【参考答案】：C

18、关于 IgA 肾病，下列说法错误的是

- A、10%~15%患者可呈现急性肾炎综合征的表现
- B、可隐匿起病，表现为无症状性尿异常
- C、诊断确立后每年约有 1%~2%患者发展为 CRF
- D、少数 IgA 肾病患者可合并急性肾衰竭
- E、IgA 肾病早期高血压常见

【参考答案】：E

19、男性患者，20 岁，14 天前始出现发热，体温 38~39℃，无寒战，伴右侧胸痛，轻度胸闷，查体右侧第 4 前肋以下叩诊呈浊音，B 超提示右侧胸腔积液，最有可能的诊断是

- A、脓胸
- B、结核性胸膜炎
- C、细菌性肺炎
- D、恶性胸腔积液
- E、肺化脓

【参考答案】：B

20、血栓性血小板减少性紫癜的五大临床表现不包括下列哪一项

- A、发热
- B、血小板减少
- C、微血管病性溶血性贫血
- D、神经系统异常
- E、肝功能异常

【参考答案】：E

21、诊断隐孢子虫病最常用、最可靠的检查是

- A、血清学检查
- B、血常规
- C、十二指肠引流物中查找隐孢子虫卵囊
- D、粪便查找隐孢子虫卵囊
- E、大便常规

【参考答案】：D

22、与 IPF 的病理改变有关的因素是

- A、肺功能的情况
- B、病变的严重程度
- C、病变的性质
- D、病前有无诱因
- E、病变的部位

【参考答案】：B

23、患者，女性，28 岁，诊断急性黄疸性肝炎，其血清胆红素改变的特点为

- A、血清游离胆红素增加，结合胆红素减少
- B、血清游离胆红素增加，结合胆红素增加
- C、血清游离胆红素减少，结合胆红素增加
- D、血清游离胆红素减少，结合胆红素减少
- E、以上都不是

【参考答案】： B

24、西方老年人最常见的血管炎病是

- A、风湿性多肌痛
- B、结节性多动脉炎
- C、大动脉炎
- D、颞动脉炎
- E、显微镜下多血管炎

【参考答案】： A

25、生物反应调节剂是哪型肺癌治疗的新手段

- A、大细胞癌
- B、腺癌
- C、小细胞癌
- D、类癌
- E、鳞癌

【参考答案】： C

26、急性白血病 M2 型特异性分子生物学改变是

- A、AML1 / ETO
- B、PML / RARa

C、P210

D、IgH 重排

E、TCR 重排

【参考答案】：A

27、狂犬病病人具有特征性的病理变化是

A、脑组织有炎细胞浸润

B、神经细胞变性

C、急性弥漫性脑脊髓炎

D、脑组织有内格里小体

E、可见 Purkinje 细胞

【参考答案】：D

28、我国恶性肿瘤病死率排名第二的是

A、直肠癌

B、胰腺癌

C、大肠癌

D、食管癌

E、胃癌

【参考答案】：E

29、特发性面神经麻痹下列描述中错误的是

A、任何年龄均可发病

B、男性多于女性

C、可继发眼部合并症

D、本病大多预后差

E、急性期可用皮质类固醇治疗

【参考答案】：D

30、哪一种不是下丘脑小细胞性神经分泌系统分泌的激素

A、生长激素释放激素 (GRH) 和催乳激素释放激素 (PRF)

B、促甲状腺激素释放激素 (TRH)

C、催产素

D、促肾上腺皮质激素释放激素 (CRF)

E、促性腺激素释放激素 (GnRH) 和黑色素细胞刺激素释放激素 (MRF)

【参考答案】：C

31、下述哪项符合二度 I 型窦房阻滞的心电图特征

A、窦性 P-P 间期逐渐延长，最后发生房搏脱漏

B、P 波脱漏后出现长 P-P 间期，其长度等于其前连续 2 个 P-P 间期之和

C、P 波脱漏后出现长 P-P 间期，其长度等于任何两个短的 P-P 间期之和

D、窦性 P-P 间期逐渐缩短，最后发生房搏脱漏

E、P 波脱漏后出现长 P-P 间期，其长度等于任何两个 P-P 间期之和

【参考答案】：D

32、女 40 岁，面色苍白，乏力 1 年余，月经周期延长，临床疑有内分泌腺体功能低下，此时不需做的检查

A、动态功能抑制试验

B、动态功能兴奋试验

C、靶腺激素测定

D、影像学检查

E、自身抗体测定

【参考答案】：A

33、人类甲状旁腺腺体，一般有几个

A、1 个

B、2 个

C、4 个

D、6 个

E、8 个

【参考答案】：C

34、男，68 岁，持续性上腹部隐痛 3 个月，多次大便隐血阳性，消瘦，查体：上腹部压痛，未触及包块。下列哪项检查对确诊有帮助

A、胃镜伴活检

B、肝放射性核素扫描

C、胃酸测定

D、B 型超声检查

E、血清促胃液素测定

【参考答案】：A

35、Bell 现象常见于如下哪种疾病

A、特发性面神经麻痹

B、急性脊髓炎

C、病毒性脑炎

D、三叉神经痛

E、周期性瘫痪

【参考答案】：A

36、女性，25岁，3年来多次昏倒，数分钟后恢复。体查：坐位时，心尖区有舒张期隆隆样杂音，卧位时该杂音消失。最可能的诊断是

A、风心病二尖瓣狭窄

B、主动脉瓣狭窄

C、肺动脉瓣狭窄

D、癫痫发作

E、左房粘液瘤

【参考答案】：E

37、AS最早累及的部位是

A、胸椎小关节

B、腰椎小关节

C、骶髂关节

D、以上都不是

E、膝关节

【参考答案】：C

38、世界慢性阻塞性肺疾病日是每年的

A、10月8日

B、10月10日

C、12月1日

D、11月17日

E、11月14日

【参考答案】：D

39、男，12岁，反复关节肿痛。查：凝血时间31分钟，凝血酶原时间12秒(对照13秒)，激活的部分凝血活酶时间80秒(对照45秒)。以上结果符合的诊断是

- A、凝血酶，生成障碍
- B、凝血活酶生成障碍
- C、血小板异常
- D、纤维蛋白原减少
- E、血管壁异常

【参考答案】：B

40、下列哪项不引起肾病综合征

- A、急性肾小球肾炎
- B、急慢性肾盂肾炎
- C、骨髓瘤性肾病
- D、糖尿病肾病
- E、过敏性紫癜肾炎

【参考答案】：B

41、低颅压性头痛患者常在直立后多长时间内出现头痛或头痛明显加剧，卧位后头痛缓解或消失

- A、20分钟内
- B、25分钟内
- C、5分钟内
- D、10分钟内
- E、15分钟内

【参考答案】： E

42、利福平是肝微粒体酶的诱导剂，可加速下列药物的灭活

- A、糖皮质激素
- B、 β -内酰胺类抗生素
- C、氟喹诺酮类药物
- D、胰岛素
- E、氨基糖苷类抗生素

【参考答案】： A

43、乙脑的主要传染源是

- A、猪
- B、狗
- C、病原携带者
- D、患者
- E、马

【参考答案】： A

44、糖尿病肾病具有特异性的肾脏病理变化为

- A、渗出性肾小球病变
- B、结节性肾小球硬化
- C、弥漫性肾小球硬化
- D、系膜细胞增生
- E、基膜增厚呈钉突样改变

【参考答案】： B

45、下列有关胃食管反流病的说法哪项不对

- A、是指胃十二指肠内容物反流入食道
- B、可引起烧心反酸等症状
- C、导致反流性食管炎
- D、可导致慢性咽炎、哮喘
- E、根除 Hp 是治疗的根本手段

【参考答案】：E

46、男性，68岁，有慢性咳嗽、喘息病史15年，近日感冒后症状加重，查体：神志清，口唇轻度发绀，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音减低，动脉血气分析示： $PaO_2 55\text{mmHg}$ $PaCO_2 45\text{mmHg}$ ，经治疗后病情缓解。此病人出院，不适宜的治疗是

- A、长期家庭氧疗
- B、长期口服中等量激素
- C、间断应用止咳、化痰药物
- D、长期吸入支气管扩张剂
- E、作腹式呼吸，加强膈肌运动

【参考答案】：B

47、感觉平面有助于判断病损部位，可据体表判定受损节段，上腹壁反射对应的脊髓反射中枢位于哪个节段

- A、T6-7
- B、T7-8
- C、T4-5
- D、T5-6
- E、T9-10

【参考答案】：B

48、女性，15岁，甲状腺肿大，甲状腺功能检查正常，应如何治疗

- A、甲状腺次全切除
- B、放射性碘治疗
- C、服用甲状腺素片
- D、抗甲状腺药物
- E、无需治疗

【参考答案】：E

49、下列哪项是监测碘营养水平的公认指标

- A、唾液中碘含量
- B、尿碘
- C、血碘
- D、脑脊液中碘含量
- E、呼气中碘含量

【参考答案】：B

50、人体每天需从食物中摄入叶酸的量是

- A、100 μg
- B、150 μg
- C、300 μg
- D、200 μg
- E、250 μg

【参考答案】：D

51、干燥综合征合并双下肢皮肤紫癜，最可能原因是

- A、血小板降低
- B、过敏
- C、雌激素代谢异常
- D、血管脆性改变
- E、血管炎

【参考答案】：E

52、患者，男，45岁，因慢性肾衰竭行维持性血液透析治疗已有3个月，尿毒症症状明显减轻，但血红蛋白70g/L。本例贫血的主要原因是

- A、透析失血及缺铁
- B、尿毒症毒素抑制骨髓
- C、叶酸及维生素B12缺乏
- D、红细胞寿命缩短
- E、促红细胞生成素减少

【参考答案】：E

53、白血病完全缓解后复发的时间为

- A、2年内
- B、1年内
- C、5年内
- D、4年内
- E、3年内

【参考答案】：A

54、女性，36岁，平素体健，3月前感冒后出现低热，心悸，气促，出汗，食欲不振，关节痛。查体：面色苍白，肺清，心尖部Ⅲ级收缩期吹风样杂音及舒张期隆隆样杂音，肝脾未及，杵状指。应首先作何处理

- A、洋地黄
- B、休息
- C、血培养
- D、大剂量青霉素
- E、观察体温

【参考答案】：C

55、女性，45岁。慢性哮喘近10年，症状加重伴神志恍惚1d入院。体检两肺广泛哮鸣音和肺底湿啰音。动脉血气(吸氧1.5L/min)：pH7.26，PaCO₂10.6kPa(80mmHg)，PaO₂28.6kPa(65mmHg)。下列治疗措施中哪项是比较合理的

- A、尼可刹米静脉滴注以改善通气
- B、静脉滴注5%碳酸氢钠，纠正酸中毒
- C、积极应用支气管舒张剂入，必要时加用激素
- D、气管插管机械通气
- E、A+B+c 联合使用

【参考答案】：C

56、对甲型肝炎患者，其粪便基本停止排毒的标志是

- A、ALT开始下降
- B、肝功能正常
- C、抗HAV出现
- D、血ALT正常
- E、血胆红素开始下降

【参考答案】：C

57、对于传染病诊断的流行病学资料，下列哪项是不正确的

- A、是否在流行地区、流行季节表明有无感染该病的可能
- B、是否患过该病表明有无发病的可能
- C、流行病学资料在诊断中占有重要地位
- D、考虑传染病诊断时必须取得有关流行病学资料作参考
- E、某些传染病在发病年龄和职业方面有选择性

【参考答案】：B

58、下列是心力衰竭早期代偿机制，除了

- A、Frank-Starling 机制
- B、心肌肥厚
- C、心脏扩大
- D、神经内分泌激活
- E、血色素增高

【参考答案】：E

59、下列哪一项不是肾小球肾炎的临床特点

- A、贫血
- B、均一型红细胞尿
- C、白细胞管型
- D、大量蛋白尿
- E、高血压

【参考答案】：B

60、结核杆菌侵犯中枢神经系统所致最常见的疾病是

- A、结核性脑炎
- B、结核性脑膜脑炎
- C、结核性脑脊髓炎
- D、结核性脑膜炎
- E、结核性脊髓炎

【参考答案】：D

61、下列何种属于深感觉检查

- A、痛觉
- B、温度觉
- C、触觉
- D、振动觉
- E、两点辨别觉

【参考答案】：D

62、下列哪项不是霍乱、副霍乱病人的临床表现

- A、发热腹痛
- B、腹泻呕吐
- C、眼球下陷
- D、肌肉痉挛
- E、血压下降

【参考答案】：A

63、阵发性睡眠性血红蛋白尿患者，以血红蛋白尿为首发症状的占

- A、1 / 6
- B、1 / 3

C、1 / 5

D、1 / 2

E、1 / 4

【参考答案】：E

64、男，15岁，浮肿、少尿1周，半月前有感冒史，BP：140 / 90mmHg，Hb120g / L，尿蛋白(+++)，尿潜血(+++)，尿 RBC15~20 / HP，血肌酐 $180 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，血C3下降，最先考虑的诊断是

A、系膜增生性肾炎

B、毛细血管内增生性肾炎

C、新月体性肾炎

D、局灶节段性肾小球硬化

E、膜增殖性肾小球肾炎

【参考答案】：B

65、关于肢端肥大症的内分泌检查，错误的是

A、用L-多巴后，血浆GH反而升高

B、葡萄糖抑制实验后，GH不被抑制到5mg / L以下

C、IGF-1可作为筛选和疾病活动性指标，也可作为治疗是否有效的指标

D、TRH兴奋实验可使GH绝对值增加

E、GH水平值较常人高10~15倍

【参考答案】：A

66、利多卡因首次静推用量常为

A、100~150mg

B、20~50mg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478000005020006134>