

主管护师-儿科护理学（中级）专业知识考前特训 4

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 早期诊断先天性甲状腺功能减低症，下列新生儿期筛查项目是

- A. T
- B. T₄
- C. TSH
- D. 碱性磷酸酶
- E. 胆固醇

正确答案： C

参考解析：新生儿筛查检测 TSH 浓度 15~20mU/L 时，再检测血清 T₄、TSH 以确诊。

(2.) 小儿出现定向反应的时间是

- A. 第 1 个月
- B. 第 2 个月
- C. 第 3 个月
- D. 第 3~4 周
- E. 第 4~5 个月

正确答案： C

参考解析：听感知的发育：出生 3~7 天后听力已相当好，声音可引起呼吸节律改变；1 个月时能分辨“吧”“啪”的声音；3~4 个月时头可转向声源（定向反应），听到悦耳声时会微笑。【该题针对“基础知识-小儿体格生长及评价”知识点进行考核】

(3.) 患儿男，9 岁，患先天性心脏病，以前无发绀，近 1 年出现发绀，并呈持续性青紫，X 线检查左右心室增大，以右心室增大为主。主动脉影增宽。下述哪一种诊断可能性大

- A. 室间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 艾森曼格综合征
- E. 房间隔缺损

正确答案： D

参考解析：室间隔缺损当肺动脉高压显著，产生自右向左分流时，临床出现持久性青紫，即称艾森曼格综合征。X 线检查：大型缺损者，肺纹理明显增粗增多，左室、右室均增大。重度肺动脉高压时，右心室大为主，肺动脉段明显凸出，肺门血管呈“残根”状。【该题针对“专业知识-常见先天性心脏病临床表现”知识点进行考核】

(4.)患儿男，10岁，8岁起发作性意识丧失，伴四肢抽搐，服药后已2年未发，近来自行停药，今晨开始又有频繁抽动，在2次发作之间意识不清，来院急诊时有频繁发作伴昏迷。患儿此时的状态属于

- A. 癫痫大发作
- B. 癫痫持续状态
- C. 精神运动性发作
- D. 精神运动性持续状态
- E. 肌阵挛性癫痫状态

正确答案： B

参考解析：惊厥持续状态：惊厥发作持续超过30分钟或2次发作间歇期意识不能恢复者称惊厥持续状态。此时因抽搐时间长，机体氧消耗过多，脑组织缺氧可导致脑水肿及脑损伤，出现颅内压增高及脑损伤的表现。【该题针对“专业知识-小儿惊厥临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(5.)患儿男，6岁。眼睑水肿7天，血尿、少尿5天，近来出现气促、咳嗽、胸闷。查体：血压120/85mmHg，双肺底闻少许湿啰音，心率155次/分，肝肋下3cm。该患儿首选的药物是

- A. 氯霉素
- B. 硝苯地平
- C. 呋塞米
- D. 泼尼松
- E. 地高辛

正确答案： C

参考解析：患儿的情况疑是急性肾炎发生急性循环充血综合征，因此应该马上快速利尿。【该题针对“专业知识-急性肾小球肾炎临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(6.)正常小儿白细胞分类出现两次交叉的年龄是

- A. 1~3月及1~3岁
- B. 4~6天及4~6岁
- C. 7~9天及7~9岁
- D. 4~6月及4~6岁
- E. 2~3月及2~3岁

正确答案： B

参考解析：白细胞计数及分类：白细胞分类主要占粒细胞与淋巴细胞的比例变化较大，出生时中性粒细胞约占65%，淋巴细胞约占30%，随着白细胞总数的减少，中性粒细胞比例也逐渐下降，淋巴细胞比例逐渐增高，生后4~6天时两者比例相等（第一次交叉），以后整个婴幼儿期均以淋巴细胞占优势，以后又出现相反变化，至4~6岁时两者再次相等（第二次交叉），6岁后逐渐与成人相似。【该题针对“专业知识-小儿贫血临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(7.)治疗新生儿肺透明病最重要的原则是

A. 暖箱保暖

- B. 预防感染
- C. 持续正压给氧
- D. 均衡营养
- E. 气管滴入表面活性物质

正确答案： C

参考解析：本病最重要的是持续正压给氧，以防止肺泡的进一步萎陷，应同时气管滴入表面活性物质。【该题针对“专业知识-新生儿肺透明膜病临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

(8.) 典型麻疹皮疹的特点是

- A. 小斑丘疹，疹退后无色素沉着
- B. 红色出血性斑丘疹，无正常皮肤
- C. 大小不等的斑丘疹，无正常皮肤
- D. 皮肤普遍充血，上有鲜红色粟粒疹
- E. 红色斑丘疹，疹退后有色素沉着及脱屑

正确答案： E

参考解析：麻疹皮疹为淡红色充血性斑丘疹，大小不等，压之褪色，可融合呈暗红色，疹间皮肤正常。皮疹按出疹的先后顺序消退，可有麦麸样脱屑及浅褐色素斑，7~10天消退。【该题针对“专业知识-麻疹临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(9.) 风湿热的临床主要表现不包括

- A. 关节炎
- B. 舞蹈病
- C. 心脏炎
- D. 皮下小结、环形红斑
- E. 发热

正确答案： E

参考解析：风湿热主要表现：1. 心脏炎 2. 关节炎 3. 舞蹈病 4. 皮下结节 5. 环形红斑、结节性或多形性红斑。一般表现：发热，热型不规则，有面色苍白、食欲差、多汗、疲倦、腹痛等症状。【该题针对“专业知识-风湿热临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(10.) 男孩，9岁，来自农村。今晨起感双下肢无力，疼痛不能行走，6小时后双上肢也出现无力，无明显二便障碍。查体：四肢肌力1级，肌张力低，腱反射消失，巴氏征阴性，深、浅感觉无异常。该患儿最可能的诊断是

- A. 急性脊髓灰质炎
- B. 吉兰-巴雷综合征
- C. 急性脊髓炎
- D. 良性肌炎
- E. 进行性肌营养不良

正确答案： B

参考解析：吉兰-巴雷综合征临床表现：年长儿可诉手足麻木、疼痛，早期可出现手套或袜套状感觉减退。病情进展迅速者，24 小时内即可出现包括肢体、呼吸肌及部分脑神经的完全瘫痪，少数病例可先有脑神经受累，从上往下进展。

【该题针对“专业知识-急性感染性多发性神经根神经炎临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(11.) 苯丙酮尿症患儿通常出现临床症状的时间为

- A. 出生时
- B. 生后 1~3 月
- C. 生后 3~6 月
- D. 生后 6~9 月
- E. 生后 9~12 月

正确答案： C

参考解析：典型的 PKU 患儿在新生儿时期发育基本正常，生后 3~6 个月可出现呕吐、喂养困难、生长缓慢等症状，逐渐加重，1 岁左右症状明显。

(12.) 急性坏死性小肠结肠炎的首发症状是

- A. 休克
- B. 脱水
- C. 腹痛
- D. 高热
- E. 烦渴

正确答案： C

参考解析：急性坏死性小肠结肠炎患儿常以急性腹痛起病。

(13.) 新生儿期应给予接种或口服

- A. 卡介苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 流脑疫苗
- D. 乙脑疫苗
- E. 麻疹疫苗

正确答案： A

参考解析：卡介苗：接种 1 剂次，儿童出生时接种。

(14.) 胆道梗阻患儿的粪便特点为

- A. 大便于结
- B. 大便呈黑色
- C. 大便带血丝
- D. 大便呈黄绿色
- E. 大便呈陶土色

正确答案： E

参考解析：该题是专业知识记忆题。备选答案均为各种大便性状的描述。大便干结多因进食蛋白质偏多、淀粉或糖过少或肠蠕动弱、水分吸收过多所致；大便呈黑色系肠上部及胃出血或服用铁剂或大量进食含铁食物所致；大便带血丝，多系肛裂、直肠息肉所致；大便呈陶土色，则表示胆道梗阻。考生应注意鉴别。该题正确的答案是 E。

(15.) 新生儿食管下端贲门肌发育不成熟，常发生胃食管反流，一般在小儿多大时症状可消失

- A. 2~4 个月
- B. 4~6 个月
- C. 6~8 个月
- D. 8~10 个月
- E. 10~12 个月

正确答案： D

参考解析：该题是专业知识记忆题。主要考查小儿胃食管反流症状消失的时间。新生儿食管下端贲门肌发育不成熟，常发生胃食管反流，一般在小儿 8~10 个月时胃食管反流症状消失。该题正确的答案是 D。

(16.) 对法洛四联症病理生理影响最大的是

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉骑跨
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉狭窄
- E. 房间隔缺损

正确答案： D

参考解析：①肺动脉狭窄：以漏斗部狭窄多见，其次为漏斗部和瓣膜合并狭窄，狭窄程度可随年龄而加重；②室间隔缺损：多属高位膜部缺损；③主动脉骑跨：主动脉骑跨于左、右两心室之上，随着主动脉发育，右跨现象可逐渐加重，约 25% 病人为右位主动脉弓；④右心室肥厚：为肺动脉狭窄后右心室负荷增加的结果。以上 4 种畸形中以肺动脉狭窄最重要，对患儿的病理生理和临床表现有重要影响。

(17.) 化脓性脑膜炎治疗疗程不少于

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 3~4 周
- D. 4~5 周
- E. 5~6 周

正确答案： B

参考解析：

对肺炎链球菌和流感嗜血杆菌脑膜炎，其抗生素疗程应是静脉滴注有效抗生素 10~14 天，脑膜炎双球菌 7 天，金黄色葡萄球菌和革兰阴性杆菌脑膜炎应 21 天以上。若有并发症，疗程还应适当延长。

(18.)引起病毒性心肌炎最常见病毒是

- A. 流感病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 埃可病毒
- D. EB 病毒
- E. 腺病毒

正确答案： B

参考解析：肠道病毒中柯萨奇组病毒型(Coxsackie virusB, CVB3)最为常见。

(19.)手足搐搦症惊厥发作的紧急处理，哪项错误

- A. 首先止惊
- B. 惊止后补钙
- C. 立即肌注维生素
- D. 做好喉痉挛的抢救准备
- E. 补钙后用维生素 D

正确答案： C

参考解析：维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥发作时的紧急处理是首先立即使用止惊剂，应用镇静剂，同时补钙。保持呼吸道通畅，做好抢救准备。病情稳定后补充维生素 D，适量补钙，以预防维生素 D 缺乏性手足抽搐症复发及使佝偻病或痊愈。

(20.)2 个月以内小儿，化脓性脑膜炎最常见的病原菌是

- A. 脑膜炎奈瑟菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎双球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 葡萄球菌

正确答案： D

参考解析：化脓性脑膜炎的病原菌随发病年龄而异。新生儿和<2 个月婴儿以及免疫缺陷病患者的常见致病菌为：肠道革兰阴性杆菌（大肠杆菌最多见，其次为变形杆菌、铜绿假单胞菌或产气杆菌等）、金黄色葡萄球菌；2 个月婴儿~12 岁儿童以脑膜炎球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌为主。>12 岁小儿的常见致病菌则以肺炎链球菌和脑膜炎球菌多见。主要经呼吸道分泌物或飞沫传播。由脑膜炎球菌引起的脑膜炎呈流行性。

(21.)重症肺炎患儿发生严重腹胀的原因是

- A. 低钾血症
- B. 低钠血症

- C. 低钙血症
- D. 消化功能紊乱

E. 中毒性肠麻痹

正确答案： E

参考解析：症肺炎时消化系统可表现为食欲减退、呕吐或腹泻。发生中毒性肠麻痹时出现明显的腹胀，呼吸困难加重，肠鸣音消失；发生消化道出血时出现呕吐咖啡样物，大便潜血试验阳性或柏油样便。

(22.)处理新生儿生理性乳腺肿大的护理措施，哪项正确

- A. 手术切除
- B. 用手挤出液体
- C. 应用抗生素
- D. 不需处理
- E. 加压包扎

正确答案： D

参考解析：新生儿生理性乳腺肿大一般不需要治疗，更不能用手去挤或搓揉以免挤伤乳腺组织和引起继发感染。

(23.)破伤风患儿抽搐时引起窒息，急救处理首先应是

- A. 口服水合氯醛
- B. 肌注苯巴比妥
- C. 立即行气管切开
- D. 静脉滴注 TAT
- E. 气管插管

正确答案： E

参考解析：破伤风患儿反复抽搐会引起窒息，故急救处理是保持呼吸道通畅，可行气管插管。

(24.)急性肾小球肾炎使用抗生素的目的是

- A. 控制细菌感染
- B. 控制体温上升
- C. 减轻感染引起的血尿
- D. 清除感染灶、消灭抗原
- E. 预防继发感染

正确答案： D

参考解析：肾小球肾炎有感染灶时用青霉素及敏感药物 7~10 天。

(25.)婴幼儿上感的临床特点是

- A. 以发热、纳差等全身症状为主
- B. 以咳嗽、咳痰为主
- C. 以鼻塞、流涕、打喷嚏为主
- D. 以腹痛腹泻为主
- E. 以咽痛、头痛为主

正确答案： A

参考解析：婴幼儿急性上呼吸道感染往往局部症状不明显，而以发热、全身症状为主。

(26.) 新生儿生理性体重下降的范围一般为体重的

- A. 1%~5%
- B. 3%~9%
- C. 4%~6%
- D. 15%~20%
- E. 20%~25%

正确答案： B

参考解析：新生儿生后由于体内水分丢失较多，导致体重下降，约生后 3~4 日降至最低点（小于出生体重的 10%），生后第 7~10 日恢复到出生体重，称生理性体重下降。

(27.) 新生儿化脓性脑膜炎患儿的表现应除外

- A. 败血症症状
- B. 嗜睡
- C. 脑膜刺激征
- D. 颈抵抗
- E. 惊厥

正确答案： C

参考解析：新生儿因颅缝和囟门可以缓解颅内压，所以脑膜刺激征可能不明显或出现较晚。

(28.) 10 个月婴儿，腹泻 1 天，大便呈水样，伴发热、轻咳及呕吐，11 月份发病。大便镜检见脂肪滴，白细胞 0~2 个/HP。该患儿腹泻的病因最可能是

- A. 轮状病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 埃可病毒
- D. 大肠埃希菌
- E. 腺病毒

正确答案： A

参考解析：轮状病毒秋冬季流行，起病较急，常伴有上呼吸道感染症状。大便镜检偶见少量白细胞。【该题针对“专业知识-几种常见感染性肠炎的临床特点、小儿腹泻治疗要点”知识点进行考核】

(29.) 患儿 1.5 岁，呕吐、腹泻 3 日，经补液，脱水基本纠正，现出现腹胀，心音低钝，腱反射减弱，考虑为

- A. 低钠血症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低镁血症

E. 低血糖症

正确答案： C

参考解析：一般血清钾低于 3.5mmol/L 时，即可出现下列症状：神经肌肉兴奋性降低、精神萎靡、肌肉无力、腱反射迟钝或消失、腹胀、肠鸣音减弱或消失，严重时出现肌肉弛缓性瘫痪。【该题针对“专业知识-液体疗法、特殊情况下的液体疗法”知识点进行考核】

(30.) 新生儿寒冷损伤综合征的治疗原则除外

- A. 合理用药
- B. 支持疗法
- C. 控制痉挛
- D. 复温
- E. 对症处理

正确答案： C

参考解析：新生儿寒冷损伤综合征复温的原则：新生儿寒冷损伤综合征简称新生儿冷伤主要由受寒引起其临床特征是低体温及多器官功能损害严重者出现皮肤和皮下脂肪变硬、水肿又称新生儿硬肿症多发在冬、春寒冷季节以出生 3 日内或早产儿多见发病初期表现体温降低、吮乳差或拒乳、哭声弱等症状；病情加重时发生硬肿和多器官功能损害体征。

(31.) 无症状新生儿低血糖进食葡萄糖无效时，应改为

- A. 加大口服葡萄糖的剂量
- B. 静脉输注葡萄糖
- C. 氢化可的松静脉点滴
- D. 胰高血糖素肌肉注射
- E. 泼尼松口服

正确答案： B

参考解析：无症状低血糖可给予进食葡萄糖，如无效改为静脉输注葡萄糖。对有症状患儿都应静脉输注葡萄糖。

(32.) 小儿脑脊液蛋白总量为

- A. $0.1\sim0.2\text{g/L}$
- B. $0.2\sim0.4\text{g/L}$
- C. $0.3\sim0.6\text{g/L}$
- D. $0.6\sim0.8\text{g/L}$
- E. $0.8\sim1.0\text{g/L}$

正确答案： B

参考解析：正常脑脊液外观清亮透明，糖含量为 $2.8\sim4.4\text{mmol/L}$ 氯化物为 $118\sim128\text{mmol/L}$ ，蛋白不超过 400mg/L

(33.) 出生时不存在以后逐渐出现且永不消失的反射是

- A. 觅食反射

- B. 吸吮反射
- C. 角膜反射
- D. 腹壁反射
- E. 瞳孔反射

正确答案： D

参考解析：出生时存在而以后逐渐消失的反射有觅食反射、握持反射、拥抱反射等。握持反射生后 3~4 个月消失，拥抱反射生后 3~6 个月消失，觅食、吸吮反射生后 4~7 个月左右完全消失。出生时存在以后永不消失的反射，如角膜反射，瞳孔对光反射、咽反射、吞咽反射等，如这些反射减弱或消失，表示神经系统出现异常。出生时并不存在以后渐出现且永不消失的反射有腹壁反射、提睾反射(4~6 个月后明显)、四肢膝腱反射，平衡反射(10~12 个月时出现)。(34.)病毒性脑炎显著的临床表现是

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 发热
- D. 意识障碍
- E. 嗜睡

正确答案： D

参考解析：病毒性脑炎：患儿开始时症状较轻，为不同程度的发热，后随体温增高出现不同程度的意识障碍，轻者出现表情淡漠、嗜睡，重者神志不清、谵妄、昏迷，或出现精神障碍。

【该题针对“专业知识-病毒性脑膜炎、脑炎临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(35.)患儿男，9 岁。因双下肢皮疹 1 周，腹痛 1 天来院就诊。查体：T36.9℃，P80 次/分，R19 次/分，神志清楚，双下肢可见散在紫红色斑丘疹，高出皮面，压之不褪色，双侧对称分布。腹平软，脐周及下腹部有轻度压痛，无肌紧张及反跳痛。辅助检查：血常规：WBC 18.6×10^9 /L，L18.8%，N72.1%，RBC 4.5×10^{12} /L，PLT 423×10^9 /L，HGB135g/L。出凝血时间正常。便潜血试验(+)。该患儿最可能的医疗诊断是

- A. 风湿热
- B. 儿童类风湿病
- C. 过敏性紫癜
- D. 皮肤黏膜淋巴结综合征
- E. 特发性血小板减少性紫癜

正确答案： C

参考解析：

过敏性紫癜主要见于学龄期儿童，男孩多于女孩，临床表现为非血小板减少性皮肤紫癜，伴关节肿痛、腹痛、便血和血尿、蛋白尿等。皮肤紫癜常为首发症状，几乎所有患儿均见典型皮肤紫癜，常见于下肢和臀部，以下肢伸面为多，对称分布。

(36.) 婴儿肠道相对较成人长，一般为身长的

- A. 1~2 倍
- B. 2~3 倍
- C. 3~4 倍
- D. 5~7 倍
- E. 7~10 倍

正确答案： D

参考解析：该题是专业知识记忆题。主要考查婴儿肠道的长度。婴儿肠道相对较成人长，一般为身长的 5~7 倍，或坐高的 10 倍。该题正确的答案是 D。

(37.) 世界重点防治的六类主要热带病中除麻风外其余 5 类都是寄生虫病，其中线虫病有

- A. 钩虫病，蛔虫病
- B. 钩虫病，蛲虫病
- C. 丝虫病，蛲虫病
- D. 钩虫病，丝虫病
- E. 蛔虫病，蛲虫病

正确答案： E

参考解析：寄生虫分类

(38.) 当血钙浓度低于何值时可引起低钙惊厥

- A. $1.5 \sim 1.63 \text{ mmol/L}$ ($6 \sim 6.5 \text{ mg/dl}$)
- B. $2.0 \sim 2.13 \text{ mmol/L}$ ($8 \sim 8.5 \text{ mg/dl}$)
- C. $1.63 \sim 1.75 \text{ mmol/L}$ ($6.5 \sim 7 \text{ mg/dl}$)
- D. $1.88 \sim 2.0 \text{ mmol/L}$ ($7.5 \sim 8 \text{ mg/dl}$)
- E. $1.75 \sim 1.88 \text{ mmol/L}$ ($7 \sim 7.5 \text{ mg/dl}$)

正确答案： E

参考解析：当血钙低于 $1.75 \sim 1.88 \text{ mmol/L}$ ($7.0 \sim 7.5 \text{ mg/dl}$) 或血清钙离子浓度 1 mmol/L (4 mg/dl) 以下时可发生惊厥。

(39.) 新生儿假月经多发生于生后

- A. 1 天内
- B. 7~8 天
- C. 9~11 天
- D. 3~5 天
- E. 8~9 天

正确答案： D

参考解析： 婴生后 5-7 天阴道可见带血性分泌物, 持续 2-3 天。称假月经
(40.) 属遗传性疾病的是

A. 垂体性侏儒症

- B. 21-三体综合征
- C. 脑积水
- D. 散发性呆小病
- E. 地方性呆小病

正确答案： B

参考解析：唐氏综合征即 21-三体综合征，是最早被确定的染色体病。

(41.) 轻度贫血的诊断标准是

- A. Hb30~60g/L
- B. Hb<120g/L
- C. Hb<110g/L
- D. Hb120~90g/L
- E. Hb 145g/L

正确答案： D

参考解析：血红蛋白低于 30g/L 为极重度贫血。血红蛋白在 30g/L~60g/L 为重度贫血。血红蛋白在 60 g/L~90g/L 为中度贫血。当血红蛋白在 90 g/L~110g/L 之间为轻度贫血。

(42.) 血友病的治疗原则中哪项不正确

- A. 输注凝血因子
- B. 尽量避免手术及创伤性操作
- C. 新鲜出血部位可用热敷
- D. 皮肤出血可加压包扎止血
- E. 关节出血停止后逐渐增加活动

正确答案： C

参考解析：热敷可加重出血。

(43.) 某患儿，34 周早产。生后 4 小时出现进行性呼吸困难，伴紫绀，时有呼吸暂停，两肺呼吸音低，未闻湿啰音。最可能的诊断是

- A. 肺部细菌感染
- B. 羊水吸入综合症
- C. 新生儿湿肺
- D. 持续肺动脉高压症
- E. 新生儿肺透明膜病

正确答案： E

参考解析：指出生后不久即出现进行性呼吸困难、青紫、呼气性呻吟、吸气性三凹征和呼吸衰竭。

(44.) 血友病甲患儿止血治疗时首选输注

- A. 浓缩红细胞
- B. 免疫球蛋白
- C. 凝血因子Ⅷ浓缩剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485040133030012131>