

小朋友保健學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中選擇一種最佳答案，並在答題卡上將對應題號的對應字母所屬的方框塗黑。

1. 下面哪種類型屬於早熟類型(B)

A.骨齡<時間年齡 **B.骨齡>時間年齡** C.骨齡=時間年齡 D.骨齡≠時間年齡 E.

以上都不是

2. 女性第二性徵發育出現最早的是(A)

A.乳房 B.陰毛 C.腋毛 D.月經初期 E.外陰色素從容

3. 能精確反應個體小朋友發育水平(E)

A.年增長百分位數 B.曲線圖法 C.指數法 D.原則差分法 **E.等級評價法**

4. 生長長期變化不對的表述為(C)

A.身材一代比一代長的高 B.性發育提前 **C.體重普遍增長** D.成年身高逐漸增長 E.以上都不是

5. 畢生中體重增長最快的階段發生於(E)

A.胎兒中期 B.胎兒初期 C.青春期中 D.幼兒期 **E.胎兒後期**

6. 與青春期中發育關係最親密的軸心體系是(C)

A. 中樞神經——下丘腦——性腺軸 B. 中樞神經——垂體——性腺軸

C. 下丘腦——垂體——性腺軸 D. 中樞神經——下丘腦——垂體軸 E.以上都不是

7. 在出生後頭拾年內迅速發育，12歲達高峰，後來逐漸萎縮是(D)

A.生殖系統型 B.一般型 C.神經系統型 **D.淋巴系統型** E.子宮型

8. 如下哪種疫苗是減毒疫苗(A)

A.卡介苗 B.乙肝疫苗 C.百日咳菌液 D.白喉类毒素 E.破伤风类毒素

9. 判断骨龄要运用 X 线摄片，最常用的摄片部位是(E)

A.肩胛部 B.肘部 C.足部 D.手部 **E.手腕部**

妇女保健學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种最佳答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。

1. 先天缺陷是指婴儿在出生前已形成了(E)

A.形态构造异常 B.功能发育不全 C.先天脑发育不全 D.低出生体重 **E.发育障碍**

2. 14 岁少女，下腹周期性疼痛一年有余，常伴尿贫及便秘。前来就诊。病史发现尚未来月經，检查下腹部可及儿頭大小包块。也許的诊断是(E)

A.卵巢肿瘤 B.膀胱肿瘤 C.卵巢巧克力囊肿 D.子宫肌瘤 **E.处女膜闭锁**

3. 更年期激素替代的适应证(E)

A.子宫不规则出血 B.更年期综合征伴肿瘤病史 C.更年期综合征伴肝功能异常 D.充血性心脏病 **E.骨质疏松症**

4. 哪一项不是青春期第二性征发育特点(C)

A.乳房发育增大 B.乳晕增大、色素加深 **C.月經来潮** D.腋毛发育 E.阴毛发育

5. 妇女保健重點范围是(D)

A.妇科恶性肿瘤的防治 B.生殖道感染和性传播疾病的防治 C.孕产期保健及其疾病的防治 **D.妇女從青春到更年期生殖器官与功能的保健及疾病的防治**

E.青春期、围产期、更年期保健

6. 婚前醫學检查患严重遗传性疾病是(D)

A.多基因遗传病 B.常染色体显性遗传 C.常染色体隐性遗传 **D.因遗传病而生活不能自理，再发風險高者** E.以上均是

7. 妇女普查普治的重點對象(B)

A.老年妇女 **B.更年期妇女** C.已婚妇女 D.所有妇女 E.根据普查重點选择危险人群

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(8~10 題共用备选答案)

A.孕 12 周 B.孕 16 周 C.孕 20 周 D.孕 28 周 E.孕 36 周

8. 感覺胎動明显的時間：**(C) 孕 20 周**

9. 计算围产期開始的時間：**(D) 孕 28 周**

10. 胎儿体重约 1000g 左右的時間：**(D) 孕 28 周**

环境卫生學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种最佳答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。

1. *我国采用空气污染指数向公众公布大气污染状况，它分為 5 個级别，當易感人群症状轻度加剧，健康人群出現刺激症状時，空气质量状况应当是(C)

A.优 B.良 **C.轻度污染** D.中度污染 E.重污染

2. 原则中规定每克或每毫升化妆品中不得检出下列哪些细菌(E)

A.霉菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌 B.霉菌、粪大肠菌群、溶血性链球菌 C.溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、破伤風杆菌

D.厌氧菌、金黄色葡萄球菌、粪大肠菌群 **E.粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌**

3. 环境卫生學的研究對象是人群及其周围的(D)

A.生态环境 B.自然环境 C.生活环境 **D.自然环境和生活环境** E.社會环境

4. 粒径 $\leq 10\mu\text{m}$ 的大气颗粒物称为(C)

A.降尘 B.總悬浮颗粒物 **C.可吸入颗粒物** D.烟尘 E.细颗粒物

5. 某一封闭式办公大楼，终日采用集中式空调系统，近日工作人员诉说呼吸道干燥、鼻塞、頭痛、注意力不集中、易疲劳等，但下班後返回家中，上述症状自行消失。此病症最也許是(B)

A.与建筑物有关的疾病(BRI) **B.不良建筑综合征(SBS)** C.電腦综合症 D.CO₂中毒 E.流行性感冒

6. 全球气候变暖的重要原因是(B)

A.地面大气中臭氧浓度增長 **B.地面大气中温室效应气体增長** C.地面太阳紫外线辐射增長 D.雨雪水減少 E.绿地減少

7. 居住面积定额直接影响人們生活居住的卫生条件，与每人居住面积定额关系较亲密的指標是(B)

A.人口毛密度 **B.人口净密度** C.居住区用地面积 D.居住建筑用地面积 E.居住区人口数

8. 有一工廠它的烟囱有效高度為 100m，當風向為東北風時，其有害气体的著落點，大概在该工廠的(D)

A.東北方位 500~1000 米处 B.東北方位 1000~米处 C.西南方位 500~1000 米处 **D.西南方位 1000~米处** E 西南方位 100~500 米处

9. 介水传染病的流行特點不包括(B)

A. 多為爆发流行 **B.**病人的病情复杂，临床体现多种多样

C.病例分布与供水范围一致 D.发病多在同一潜伏期内 E.對水源采用净化消毒处理後，流行迅速得到控制

10. 水体污染物吸附于悬浮物和颗粒物後，逐渐下沉進入水体底质，在微生物的作用下可转变成毒性更大的理化性质完全不一样的新的化學物质，這種状况最常見于水体(E)

A.镉污染 B.有机氯农药污染 C.有机磷污染 D.酚污染 **E.汞污染**

11. 地方性克汀病是由于(D)

A.婴儿期摄入氟過多所致 B.母体妊娠期间摄入過多非必需微量元素所致 C.胚胎期和婴儿期碘摄入過多所致 **D.胚胎发育期和婴儿期严重缺碘所致** E.胚胎期和婴儿期多种微量元素严重缺乏所致

12. 目前在建筑材料与装饰材料中最引起人們关注的物质是(B)

A.甲醇和氡 **B.甲醛和氡** C.甲醇和氨 D.甲醛和氨 E.氨和氡

13. 有的污染物在水环境中浓度极低且極為稳定，该污染物通過水生物摄取進入食物链系统，使生物体内污染物浓度大大增長，這種現象被稱為(B)

A.生物放大作用 **B.生物富集作用** C.生物降解作用 D.生物转化作用 E.生物自净作用

14. 日本痛病的病因重要是(C)

A.當地土壤原生环境中具有大量镉 B.气型镉污染土壤和水所致 **C.含镉废水污染农田而引起** D.含镉废水污染了當地居民的水源水 E.含镉废渣污染了土壤

15. 评价室内空气清洁度和居室容积的最重要指標是(C)

A.SO₂ B.CO **C.CO₂** D.NO_x E.颗粒物

16. 某患者涂抹某化妆品後 5~7 天，再次涂抹時局部出現紅腫、水疱、大疱，

病变边界不清，自覺瘙痒并有灼热感。诊断也許為(C)

A.急性皮炎 B.刺激性接触性皮炎 **C.变态性刺激性皮炎** D.光变态性皮炎
E.化妆品性痤疮

17. *有一种污染物它是含氯碳氢化合物的燃烧产物，易溶于脂肪组织，是已知的人类致癌物，也是一种环境激素。该污染物也许是(B)

A.多环芳烃 **B.二恶英** C.苯并α芘 D.有机磷 E.醛类化合物

18. 判断水质与否受人畜粪便污染的最重要指标是(C)

A.细菌总数 B.大肠菌群 **C.粪大肠菌群** D.肠道致病菌 E.厌氧芽孢菌

19. 分析空气中二氧化硫常采用的样品采集措施是(C)

A.塑料袋采样法 B.注射器采样法 **C.溶液吸取法** D.滤膜阻留法 E.固体吸附剂阻留法

20. 具有病原体的动物粪便污染土壤后，通过皮肤传染或黏膜进入人体而得病，这病也许是(B)

A.血吸虫病 **B.炭疽病** C.破伤风 D.蛔虫病 E.痢疾

二、如下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一种最佳答案，并在答题卡上将对应题号的对应字母所属的方框涂黑。

据报道，美国洛杉矶、纽约和日本东京、大阪等地曾多次发生过急性中毒烟雾事件，后证明这烟雾是大气中某些污染物在紫外线作用下发生光化学反应，所形成的一种混合烟雾。

(21~23 共用题干)

21. 引起烟雾的重要污染物是(C)

A. SO₂、NO_x

B. SO₂、烟尘

C. NO_x、碳氢化合物

D. 碳氢化合物、CO

E. CO、烟尘

22. 其重要成分為(C)

A. SO₂、NO_x、醛类

B. 硫酸盐、O₃、醛类

C. O₃、醛类、過氧酰基硝酸酯

D. 硝酸盐、SO₂、過氧酰基硝酸酯

E. O₃、硝酸盐、硫酸盐

23. 发生烟雾時，受害者的重要症状(C)

A. 咳嗽、胸痛、呼吸困难

B. 頭痛、皮肤潮紅、吸吸困难

C. 眼睛紅肿、流泪、咽喉痛

D. 呼吸急促、咳嗽、呕吐

E. 惡心、呕吐、眼睛紅肿

有一乡村近年来居民常常感到四肢麻木，乏力；在躯干的皮肤上还发既有色素沉着和脱色斑點。經调查发现该村居民在一年前家家户户打井，井的深度約為 20 米，從打井至今，一直饮用此类井水，部分居民除了上述症状外，還发现手掌和脚趾皮肤角化。

(24~25 共用題干)

24. 根据病情推测，這些症状出現也許和水中下列哪种物质過量有关(B)

A. 汞

B. 砷

- C. 氟
- D. 铬
- E. 氰化物

25. 為了弄清病因，除了采集水样、土样進行化验外，首先应考虑做的人群监测项目是(B)

- A. 心电图
- B. 生物材料样品中有害物质的测定**
- C. 肺功能
- D. 微核算验
- E. 免疫功能检测

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(26~27 題共用备选答案)

- A. 根据剂量反应和安全系数确定，不考虑社會、經濟等原因，具有法律效果
- B. 根据剂量反应和安全系数确定，不考虑社會、經濟等原因，不具有法律效果
- C. 不根据剂量反应和安全系数确定，仅考虑社會、經濟等原因，不具有法律效果
- D. 根据剂量反应和安全系数确定，考虑社會、經濟等原因，具有法律效果
- E. 不根据剂量反应和安全系数确定，仅考虑社會、經濟等原因，具有法律效果

26. 原则是：**(D)**

27. 基准是：**(B)**

(28~30 題共用备选答案)

A. 气温升高、海平面上升、病原体加速繁殖

B. 皮肤癌、白内障等疾病发病率上升

C. 眼睛刺痛、流泪、咽喉痛

D. 呼吸系统疾病、肺癌的发病率上升

E. 湖泊中水生生物死亡、建筑物腐蚀、森林枯萎

28. 温室效应可导致：**(A)**

29. 臭氧层破坏可导致：**(B)**

30. 酸雨可导致：**(E)**

健康教育与健康增进

一、如下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一种最佳答案，并在答题卡上将对应题号的对应字母所属的方框涂黑。

1. 属于健康教育项目实行的过程评价指标是(C)

A. 卫生知识知晓率

B.行為流行率

C.有效指数

D.行為变化率

E.发病率

2. 艾滋病健康教育的重要内容，不包括下列哪個(D)

A.艾滋病的危害性

B.艾滋病的传播途径

C.艾滋病的防止方略

D.艾滋病的治疗措施

E.艾滋病是一种經典的行為生活方式疾病。

3. 有关吸烟的健康教育计划目的确定为“执行计划一年後，70%青少年吸烟者戒烟”，该目的属于下列哪個层次(D)

A.總体目的

B.教育目的

C.過程目的

D.行為目的

E.健康目的

4. 增進母乳喂养的健康教育项目中，其面临的一级目的人群是(B)

A.嬰兒

B.产妇

C.乡村醫生

D.产妇家眷

E.妇女干部

5. 健康教育计划设计的首要程序是(C)

A.确定计划目的

B.明确优先项目

C.健康教育诊断

D.制定干预框架

E.评价计划

6. 大众传播的特点是(E)

A.公开

B.覆盖面广

C.单向

D.速度快

E.以上都是

7. 在疾病的三级防止中，健康增进强调(C)

A.二级防止

B.三级防止

C.一级防止甚至更早阶段

D.二级防止甚至更早阶段

E.三级防止甚至更早阶段

8. 醫院患者健康教育的形式，描述不對的的是(C)

A.门诊教育

B.住院、病房教育

C.小区关系教育

D.出院康复教育

E.随访教育

9. 有关小区健康教育与健康增進特性描述，下列不對的的是(B)

A.以小区居民為對象

B.以提高小区卫生机构經濟效益為目的

C.以增進小区居民健康為宗旨

D.以小区為單位

E.有组织、有计划、有评价的活動

10. 個人与群体之间的传播形式不包括(E)

A.讲课

B.演讲

C.汇报

D.讨论

E.交談

劳动卫生与职业病学

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种最佳答案，并在答題卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。

1. 某男性锅炉操作工，在一种通風不良条件下，持续工作 3~4 小时，忽然感到頭痛，頭暈等症狀。患者面色潮紅，口唇呈櫻桃紅色，具有呼吸加紧等体现。可疑何种毒物中毒 (D)

A.二硫化碳

B.二氧化碳

C.硫化氢

D.一氧化碳

E.氮氧化物

2. 在夏季施用有机磷农药時，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、視力模糊等症狀，在急診室進行處理時，首選措施是 (A)

A.使用阿托品

B.使用解磷定

C.吸氧

D.人工呼吸

E.輸液

3. 對已經脫塵作業的工人，還應定期作何種處理 (D)

A.體內排塵處理

B.服用治療矽肺藥物

C.脫敏治療

D.定期體檢，以儘早發現異常

E.不需任何處理

4. CO 中毒患者其皮膚和黏膜可呈(C)

A.暗紅色

B.鮮紅色

C.櫻桃紅色

D.蒼白色

E.青紫色

5. 与振動病发病率高下有亲密关系的振動参数是 (A)

A.频率

B.操作方式

C.接触振動的时间

D.工作体位

E.工作环境的气温

6. 在影响毒物對机体作用的原因中，哪一种状况和条件是錯誤的 (A)

A.接触毒性大的毒物，就一定會中毒

B.挥发性毒物，吸入中毒危险大

C.接触一定剂量的毒物，也許會中毒

D.毒物浓度与作用时间是中毒的必须条件

E.个体感受性是中毒难易的重要条件

7. 女性，23岁，织布廠挡車工两年。近2個月来，感覺耳鳴，听力下降。听力测定发现听閾提高16dB(两耳)。下班後拾几种小時听力才可恢复。此种現象称之为 (B)

A.听覺适应

B.听覺疲劳

C.听力损伤

D.噪声性耳聾

E.永久性听閾位移

8. 某纺织女工，30岁，接触棉尘6年，近几个月，每逢厂休息后来第一天上班日的下班前有胸部紧束感、气急、咳嗽、发热症状，该工人所患疾病也许是 (C)

A.感冒

B.支气管炎

C.棉尘病

D.变态反应性肺泡炎

E.肺结核

9. 从防止有机磷农药中毒角度，判断下列哪一种做法是错误的 (A)

A.施药时使用浸酸液纱布口罩，防止吸入中毒

B.施药时穿长袖衣、长裤、使用塑料围裙、鞋套、鞋盖等及防护口罩

C.配药和检修施药工具时戴胶皮手套

D.污染的工作服用碱液浸泡后用清水洗净

E.施药前用肥皂涂抹皮肤，减少药剂经皮吸取

10. 我国《尘肺病诊断原则》合用于如下尘肺 (E)

A.矽肺

B.水泥尘肺

C.铝尘肺

D.电焊工尘肺

E.以上所有

11. 下列物质中，已确定有致癌作用的物质是 (C)

A.有机磷农药

B.一氧化碳

C.铬

D.铅

E.汞

12. 属于急性有机磷农药中毒烟碱样症状的是 (D)

A.瞳孔缩小

B.語言障碍

C.支气管痉挛

D.肌束震颤

E.多汗、流涎

13. 高温作业工人的胃肠道疾病应归类于 (C)

A.职业病

B.法定职业病

C.职业性多发病

D.职业性疾患

E.职业特性

14. 属于一级防止的措施是(E)

A.初期检测病损

B.對已患病者作出對的诊断

C.患者及時脱离接触有害原因

D.防止病情惡化和发生并发症

E.以無毒物质替代有毒物质

15. 三期尘肺中，“Ⅲ”的 X 线诊断原则是 (C)

A.有密集度 3 级的小阴影，分布范围超過四個肺区

B.在二期尘肺的基础上，出現小阴影汇集

C.有大阴影出現，其長徑不不不小于 2cm，寬徑不不不不小于 1 cm

D.有密集度 2 级的小阴影，分布范围到达四個肺区

E.多种大阴影面积的總和超過右上肺区面积

16. 热痉挛的重要发病机制是 (A)

A.体内钠、钾過量丢失

B.体温调整功能发生障碍

C.外周血管扩张和大量失水

D.排汗功能疲劳和衰竭

E.机体温度感受器失能

17. 静态人体测量是测量人体 (E)

A.安静状态時的尺寸

B.睡眠状态下的尺寸

C.安静状态下人体尺寸及重量

D.静态站立時的尺寸

E.各部分的固定尺寸

18. 消除粉尘危害的主线途径是 (E)

A.密闭、抽風

B.湿式作业

C.抽風、除尘

D.個人防护

E.改革工艺過程、革新生产设备

19. 下列哪项原因与个体對毒物的敏感性有关 (D)

A.劑量、浓度和作用時間

B.毒物自身理化特性

C.毒物的联合作用

D.人体遗传特性

E.酶的特性

二、如下提供若干個案例，每個案例下设若干個考題。請根据各考題題干所提供的信息，在每題下面的 A、B、C、D、E 五個备选答案中选择一种最佳答案，并在答題卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。

男，40 岁，某蓄電池廠制造工，工龄，主诉阵发性腹部疼痛 4 小時。患者在发病前常有食欲不振。腹部隐痛、便秘等症。检查腹软，脐周有压痛，無反跳痛，血象检查白细胞数正常。

(20~23 共用題干)

20. 根据上述状况，应首先考虑的诊断是 (B)

A.急性汞中毒

B.慢性铅中毒

C.急性苯中毒

D.慢性汞中毒

E.慢性锰中毒

21. 為了明确诊断，最有价值的工作是 (B)

A.問询既往史

B.現場卫生學调查

C.试验室检查

D.深入明确职业接触史

E.問询家族史

22. 明确诊断後，對该病人应采用何种药物進行治疗 (D)

A.阿托品

B.美藍

C.乙酰胺

D.依地酸二钠钙

E.亚硝酸钠—硫代硫酸钠

23. 為防止其他工人发生类似状况，對這種状况应采用的主线性防止措施是 (A)

A.生产過程密闭化、自動化

B.加强卫生监督

C.安顿局部排毒装置

D.加强個人防护

E.定期体格检查

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(24~26 題共用备选答案)

A.氯乙烯

B.石棉

C.苯

D.联苯胺

E.煤焦油

24. 与膀胱癌发病有关的是：(D)

25. 与肺癌发病有关的是 : **(B)**

26. 与肝血管肉瘤发病有关的是 : **(A)**

(27~30 題共用备选答案)

A.低色素正常细胞性贫血

B.再生障碍性贫血

C.意向性震颤

D.白内障

E.肢端溶骨症

27. 与苯中毒亲密有关的是 : **(B)**

28. 与汞中毒亲密有关的是 : **(C)**

29. 与氯乙烯中毒亲密有关的是 : **(E)**

30. 与铅中毒亲密有关的是 : **(A)**

流行病學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中選擇一種最佳答案，并在答題卡上将對應題号的對應字母所属的方框涂黑。

1. 一种新疗法可以延長存活期，但不能治愈疾病，于是发生下列状况**(C)**

A.该病患病率減少

B.该病发病率增長

C.该病患病率增長

D.该病发病率減少

E.该病发病率和患病率均減少

2. 导致人群疟疾流行的重要传染源是**(B)**

A.疟原虫携带者

B. 疟疾病人

C. 带虫按蚊

D. 感染的牛

E. 感染的猪

3. 許多性传播疾病可經胎盤、产道等途径由母亲传给胎儿，這種传播途径称为

(D)

A. 血液传播

B. 醫源性传播

C. 平常生活接触传播

D. 母婴传播

E. 性接触传播

4. 属于气体灭菌剂的是 (B)

A. 次氯酸钠

B. 环氧乙烷

C. 過氧乙酸

D. 戊二醛

E. 洗必泰

5. 病例對照研究与队列研究的重要相似點是(A)

A. 均是分析性研究

B. 均是前瞻性研究

C. 均是回忆性研究

D. 均是试验性研究

E. 均是描述性研究

6. 地方性甲状腺肿的致病原因是(E)

A.碘摄入量過低

B.碘摄入量過高

C.碘消耗量過少

D.碘消耗量過高

E.碘摄入量過低或過高

7. 根据《中华人民共和国传染病防治法》中规定汇报的传染病有(D)

A.2类 23种

B.2类 32种

C.3类 35种

D.3类 37种

E.2类 35种

8. 确定對某传染病接触者留验、检疫或醫學观测的重要根据是该传染病的(B)

A.传染期

B.潜伏期

C.临床症状期

D.恢复期

E.病原携带期

9. 属于二级防止措施的是(D)

A.接种疫苗

B.健康增進

C.對症治疗

D.初期诊断

E.病後恢复

10. 在常用的几种抽样措施中, 最便于组织, 并且节省經費的是(C)

A.單純随机抽样

B.分层抽样

C.整群抽样

D.机械抽样

E.單純随机抽样和机械抽样

11. 甲型肝炎的重要传播途径(B)

A.母婴垂直传播

B.粪一口途径

C.醫源性传播

D.性传播疾病

E.空气传播

12. 一项吸烟与肺癌关系的配對病例對照研究, 共 63 對。病例组与對照组两组均有吸烟暴露史者 27 對, 两组均無暴露史者 4 對, 病例组有暴露史而對照组無暴露史者 29 對, 其他為對照组有暴露而病例组無暴露者。這項研究的 OR 為(B)

A.10.67

B.9.67

C.2.24

D.1.24

E.4.47

13. 通過迅速的检查、检查或其他措施, 将有病或也許有病但表面上健康的人, 同那些也許無病的人辨别開来。這種形式被稱為(B)

A. 普查

B. 疾病的筛检

C. 健康增進

D. 疾病防治的高危方略

E. 健康保护

14. 影响人群易感性升高的重要原因有(D)

A. 有计划、有环节地开展防止接种工作

B. 隐形感染者增長

C. 免疫人口的迁入

D. 新生儿增長

E. 流行後免疫人口的增長

15. 归因危险度是(B)

A. 暴露组发病率或死亡率与非暴露组发病率或死亡率之比

B. 暴露组发病率或死亡率与非暴露组发病率或死亡率之差

C. 病例组有某原因的比例与對照组無某原因的比例之比

D. 病例组有某原因的比例与對照组無某原因的比例之差

E. 以上都不是

16. 以醫院為基础的病例對照研究，最常見的偏倚是(A)

A. 选择偏倚

B. 回忆偏倚

C. 信息偏倚

D. 錯分偏倚

E. 混杂偏倚

17. 引起丙型肝炎发生的病毒是(D)

A.HBV

B.HAV

C.HEV

D.HCV

E.以上都不是

18. 下列哪项论述不對的(C)

A.O1 群和 O139 群霍乱弧菌都可以引起霍乱

B.O1 群霍乱弧菌可以引起霍乱

C.霍乱弧菌都可以引起霍乱

D.O139 群霍乱弧菌可以引起霍乱

E.霍乱是由霍乱弧菌引起的

19. 現代流行病學的病因概念為 (A)

A.使疾病发生概率升高的原因

B.引起疾病发生的环境原因

C.引起疾病发生的致病微生物

D.必然引起疾病发生的原因

E.引起疾病发生的不良生活习惯

20. 病例對照研究中，调查對象应当是 (E)

A.病例组选择怀疑患某种疾病的人，對照组选择未患该种疾病的人

B.病例组為确定患某种疾病的人，對照组為怀疑患该种疾病的人

C.病例组和對照组均未确定患某种疾病

D.病例组和對照组均是患某种疾病的人

E.病例组应是确定患某种疾病的人，對照组是不患该种疾病的人

21. 传染源是指(E)

A.体内有病原体的人

B.体内有病原体的人和動物

C.体内有病原体繁殖的人和動物

D.能排出病原体的人和動物

E.体内有病原体繁殖并能排出病原体的人和動物

22. 冠心病的重要危險原因包括(C)

A.高血压、高胆固醇血症、吸烟和体力活動局限性

B.高血压、肥胖、吸烟和糖尿病

C.高血压、高胆固醇血症、吸烟和糖尿病

D.高血压、肥胖、吸烟和 A 型行為类型

E.高血压、肥胖、应激和吸烟

23. 流行病學試驗人群来自(E)

A.同一總体的患病人群

B.同一總体的健康人群

C.同一總体的暴露人群和非暴露人群

D.同一總体的病例人群和非病例人群

E.同一總体的干预人群和非干预人群

24. 如下哪一种不是流行病學的特性(E)

A.群体特性

B.對比的特性

C.以分布為起點的特性

D.防止為主的特性

E.以治疗疾病為主的特性

25. 一项有关吸烟与膀胱癌关系的前瞻性研究成果，男性吸烟者膀胱癌发病率为 48.0/10 萬，不吸烟者发病率为 25.4/10 萬，其相對危险度為 (D)

A.0.00048

B.0.52

C.0.89

D.1.89

E.22.6

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将對應題号的對应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(26~27 題共用备选答案)

A.罹患率、患病率

B.抗体阳转率、保护率

C.病死率、死亡率

D.相對危险度、归因危险度

E.有效率、治愈率

26. 對小朋友接种麻疹疫苗後，评价效果可选用指標：**(B)**

27. 進行某药治疗高血压的临床试验，疗效评价時可选用指標：**(E)**

(28~30 題共用备选答案)

A.為了初期发现、初期诊断、初期治疗宫颈癌

- B.為了理解大學生乙型肝炎感染狀況，可不必調查所有大學的所有學生
- C.對個別發生麻疹的病人進行調查
- D.一項在健康人中发现可疑糖尿病患者的調查
- E.一次因會餐引起的食物中毒調查

28. 抽樣調查：(B)

29. 篩檢：(D)

30. 個案調查：(C)

醫學倫理學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個備選答案。請從中選擇一種最佳答案，並在答題卡上將對應題號的對應字母所屬的方框塗黑。

1. 下面有關新醫學模式的理解，不對的是(C)

- A.新醫學模式從生物、心理、社會相結合上認識疾病和健康
- B.新醫學模式從生物、心理、社會諸方面尋找影響健康和疾病的原因
- C.新醫學模式標志著人們對健康和疾病的認識到达了頂峰**
- D.新醫學模式關注的健康是一種在身體、精神和社會方面的完滿狀態
- E.新醫學模式從生物、心理、社會諸方面開展醫療衛生保健活動

2. 現代醫學模式規定醫務人員既要維護患者的利益，又要兼顧社會公益。下列幾點中，錯誤的是(E)

- A.尊重病人的知情同意的權利
- B.尊重病人知情選擇的權利
- C.尊重醫生的行醫權利
- D.堅持一視同仁的原則
- E.保護患者無損害的權利**

3. 醫患关系出現物化趋势的最重要原因(A)

A. 醫生對物理、化學等检测诊断手段的依赖性

B. 醫院分科越来越细，醫生日益专科化

C. 醫患双方互相交流的机会減少

D. 醫生減少了對患者的重视

E. 醫患交流中出現了屏障

4. 一中年男性患者因急性阑尾炎住院治疗，手术後，主管醫生為了使患者尽快恢复，給患者使用了一种比较贵的新型抗生素。但并没有同患者商议。患者恢复很快，几天後就可出院。出院時，患者发现自已需付上仟元的药费，认为醫生没有告诉自已而私自做主，自已不应当承担這笔钱。在這個案例中，醫生损害了患者的哪個权利(A)

A. 知情同意权

B. 疾病的认知权

C. 平等的醫療权

D. 规定保护隐私权

E. 病人的参与权

5. 醫學伦理學的公正原则，是指(D)

A. 不一样病人予以不一样看待

B. 不一样的經濟予以不一样看待

C. 不一样样的需要予以同样的看待

D. 同样需要的人予以同样的看待

E. 不一样的病情予以同样的看待

6. 醫學伦理的尊重原则重要包括如下几方面，除了(B)

A. 尊重患者及其家眷的自主权或决定

B. 尊重患者的一切主观意愿

C. 治疗要获得患者的知情同意

D. 保守患者的秘密

E. 保守患者的隐私

7. 人在患病後，有权选择乐意接受或拒绝醫生制定的诊治方案，這種权利是(A)

A. 自主原则的体现

B. 有利原则的体现

C. 尊重原则的体现

D. 公正原则的体现

E. 不伤害原则的体现

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将對应題号的對应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(8~10 題共用备选答案)

A. 《纽伦堡法典》

B. 《赫尔辛基宣言》

C. 《希波克拉底誓言》

D. 《大醫精诚》

E. 《伤寒杂病论》

8. 西方最早的經典醫德文献是：(C)

9. 制定有关人体试验的基本原则的是：(A)

10. 反应孙思邈的医德思想和境界的是：(D)

醫學免疫學

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中選擇一種最佳答案，并在答題卡上將對應題號的對應字母所屬的方框塗黑。

1. 分泌型 IgA 重要产生部位(E)

A. 淋巴結

B. 脾脏

C. 骨髓

D. 外周血

E. 黏膜有关淋巴组织

2. HLA 属于(C)

A. 异嗜性抗原

B. 异种抗原

C. 同种异型抗原

D. 自身抗原

E. 独特型抗原

3. 决定抗原特异性的是(A)

A. 表位

B. 抗原的分子量

C. 抗原的理化性质

D. 抗原的稳定性

E. 抗原進入机体的途径

4. 不体现 HLA- I 类分子的细胞是(A)

A.成熟紅细胞

B.B 淋巴细胞

C.皮肤细胞

D.單核细胞

E.树突状细胞

5. 下列哪项不是免疫系统的正常生理功能(E)

A.免疫防御

B.免疫监视

C.免疫耐受

D.免疫调整

E.免疫损伤

三、如下提供若干组考題，每组考題共同使用在考題前列出的 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中选择一种与考題关系亲密的答案，并在答题卡上将对应題号的对应字母所属的方框涂黑。每個备选答案也許被选择一次、多次或不被选择。

(6~8 題共用备选答案)

A.IgM

B.IgG

C.IgA

D.IgD

E.IgE

6. 唯一能通過胎盤的是：**(B)**

7. 参与 I 型超敏反应的是 : (E)

8. B 细胞成熟的标志 : (D)

(9~10 题共用备选答案)

A.C3a

B.C3b

C.C4a

D.C5a

E.C2a

9. 具有调理作用的补体成分是 : (B)

10. 具有趋化作用的补体成分是 : (D)

內科學基础

一、如下每一道題下面有 A、B、C、D、E 五個备选答案。請從中選擇一種最佳答案，并在答題卡上将對應題号的對應字母所属的方框涂黑。

1. 肝病患者下列哪項對診斷肝硬化最具确诊价值(D)

A.汇管区炎症，淋巴细胞和浆细胞浸润

B.肝细胞广泛变性壞死，出現碎屑样壞死

C.肝界线板破壞，出現桥接壞死

D.大量纤维結締组织增生，假小叶形成

E.肝细胞嗜酸性性变、气球样变，嗜酸性小体形成

2. 缺铁性贫血予以右旋糖酐铁治疗，治疗中有如下副反应，但哪項应除外(E)

A.局部疼痛

B.淋巴結炎

C.荨麻疹

D.過敏性休克

E.血尿

二、如下提供若干個案例，每個案例下設若干個考題。請根據各考題題干所提供的信息，在每題下面的 A、B、C、D、E 五個備選答案中選擇一種最佳答案，並在答題卡上將對應題號的對應字母所屬的方框塗黑。

女，30 歲，產後 3 月，突起高熱，體溫 39°C，尿頻，尿急，腎區叩痛陽性，尿白細胞+/Hp，RBC3~5/Hp.白細胞 $1.2 \times 10^6/L$ ，已作尿培養，匯報未出。

(3~5 共用題干)

3. 該患者初步診斷考慮(B)

A.產褥熱

B.急性腎盂腎炎

C.慢性膀胱炎

D.慢性腎盂腎炎急性發作

E.腎結核

4. 深入確診依托哪項化驗檢查簡便而有效(A)

A.中段尿培養，菌落計數

B.尿濃縮功能減退

C.亞硝酸鹽還原試驗

D.細菌包裹抗體

E.尿沉渣見成堆白細胞

5. 確診本病後，有效的抗生素治療，療程一般為 (C)

A.3 天

B.7-10 天

C.10-14 天

D.14-21 天

E.4-6 周

女，74 岁，晨起发现左侧肢体無力，4 小時内呈進行性加重，有糖尿病史 7 年。体检左鼻唇沟浅，伸舌左偏，左上肢肌力 0 级，左下肢肌力 III 级，左侧面部和上肢感覺減退，血压 17/10kPa，心率 70 次/分，偶有早搏。

(6~7 共用題干)

6. 根据临床症状，最也許的诊断是(D)

A.脑栓塞

B.颅内硬膜下血肿

C.脑出血

D.脑血栓形成

E.脑瘤

7. 深入明确诊断的重要措施是(E)

A.追問补充有关病史

B.脑電图

C.腰穿脑脊液检查

D.血糖、血脂和電解质检查

E.頭颅 CT

男，52 岁，2 個月前因患肺癌作扩大根治术，术中输血 600ml，术后 40 天起感乏力，食欲減退，查血肝功能 ALT 200U，AST 185U，SB 18 μ mol/L，血 HBsAb

(+) (8~11 共用題干)

8. 首先应考虑的诊断為(C)

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎**
- D. 丁型肝炎
- E. 戊型肝炎

9. 為做病原學診斷應重點查血(C)

- A. HAV-IgM
- B. 乙肝病毒標志物
- C. 抗 HCV 抗体及抗 HCV-RNA**
- D. HBsAg
- E. 抗 HEV-IgM

10. 如無有效治療，本例最終結局也許為(D)

- A. 慢性 HCV 攜帶者
- B. 肝硬化
- C. 再重疊其他肝炎病毒，感染後肝衰竭
- D. 肝癌**
- E. 自愈

11. 目前認為最有效的治療為(D)

A. 联苯双酯

B. 利巴韦林 (病毒唑)

C. 胸腺肽

D. 干扰素

E. 中药

男, 21 岁, 患 1 型糖尿病, 因肺部感染, 诱发酮症酸中毒。

(12~14 共用題干)

12. 接診時, 假如出現如下症狀, 哪種為最具特性性的(D)

A. 严重口渴, 多饮, 多尿

B. 昏迷

C. 呼吸深、大

D. 呼气有烂苹果味

E. 皮肤干燥, 弹性差

13. 入院後, 急救該病人時, 胰島素最佳的使用措施是(D)

- A.大剂量胰岛素静脉推注+肌肉注射
- B.大剂量胰岛素静脉滴注
- C.大剂量胰岛素皮下注射
- D.小剂量胰岛素静脉滴注**
- E.小剂量胰岛素静脉推注

14. 如下哪种治疗原则對此病人是錯誤的(C)

- A.积极补液，纠正脱水
- B.及時使用胰岛素
- C.积极补碱，尽快一次纠正酸中毒**
- D.严密观测血钾，防治低血钾
- E.积极治疗肺部感染

男，12岁，误服有机磷农药 1605 一口，急送醫院就诊，當時测定胆碱酯酶活力為 54%

(15~16 共用題干)

15. 患者急诊洗胃，洗胃液忌用(E)

- A.肥皂水
- B.2%碳酸氢钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485044023310012002>