

2024 年河北省丰南区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库完整参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 使用后可产生抗体，1 年内不宜再次使用的药物是

- A: 尿激酶
- B: 阿替普酶
- C: 链激酶
- D: 瑞替普酶

答案：C

2. 与细菌核蛋白体的 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 万古霉素
- D: 林可霉素

答案：B

3. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：D

4. 长期服用糖皮质激素不产生下列哪种副作用

- A: 溃疡或出血穿孔
- B: 满月脸
- C: 骨质疏松
- D: 高血钾

答案：D

5. 下列描述正确的是()

- A: 手掌损害应选择低效的制剂
- B: 根据病变部位不同选择不同浓度和强度的药物
- C: 有刺激性的药物应从高浓度开始逐渐递减
- D: 外用药经皮吸收后不会产生不良反应

答案：B

6. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是()

- A: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)
- B: 左炔诺孕酮 (1
- C: 十一酸睾酮 (40mg)
- D: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

答案：B

7. 氯霉素的抗菌作用机制是()

- A: 干扰细菌的 RNA 转录
- B: 抑制细菌的 DNA 合成
- C: 抑制细菌的蛋白质合成
- D: 干扰细菌的细胞壁合成

答案：C

8. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

- A: 可升高 T
- B: LDL-CC 主要用于原发性高胆固醇血症
- C: 可降低 HDL-C
- D: 能明显降低血浆 TG

答案：D

9. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 克拉维酸
- B: 氨曲南
- C: 他唑巴坦
- D: 美罗培南

答案：B

10. 戈那瑞林属于

- A: 促性腺激素
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 雌激素类
- D: 短效口服避孕药

答案：B

11. 下列药物中不属于治疗疥疮的是

- A: 过氧苯甲酰
- B: 克罗米通
- C: 林旦霜
- D: 硫黄软膏

答案：A

12. 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

- A: 吗氯贝胺
- B: 帕罗西汀
- C: 度洛西汀
- D: 马普替林

答案：C

13. 主要不良反应为踝部关节水肿的药物是（）

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 依那普利
- D: 哌唑嗪

答案：A

14. 治疗铜绿假单胞菌感染选用（）

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 多西环素

答案：A

15. 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是（）。

- A: 磷霉素
- B: 利福平
- C: 替考拉宁

D: 舒巴坦

答案: D

16. 头孢拉定()

A: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

B: 肾毒性大

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案: B

17. 用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

A: 华法林

B: 达比加群酯

C: 依达肝素

D: 肝素

答案: B

18. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

A: 塞来昔布

B: 吲哚美辛

C: 阿司匹林

D: 双氯芬酸

答案: A

19. 属于非麻醉性镇痛药的是

A: 美沙酮

B: 可待因

C: 吗啡

D: 布洛芬

答案: D

20. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

C: 碱化尿液，促进尿酸排泄

D: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿尿酸量

答案: A

21. 临床上用于控制子痫发作的是

A: 硫酸镁

B: 苯巴比妥

C: 苯妥英钠

D: 卡巴西平

答案: A

22. 以下不属于地西泮的药理作用的是

A: 镇静催眠

B: 抗癫痫

C: 抗抑郁

D: 抗惊厥

答案: C

23. 应用阿托品治疗肠痉挛引起口干、心悸、排尿困难是药物的

- A: 毒性反应
- B: 继发反应
- C: 变态反应
- D: 副作用

答案：D

24. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 吲哚美辛

答案：A

25. 伴有痛风的水肿患者，不宜选用下列哪种药物利尿()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿米洛利
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

26. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 多奈哌齐
- B: 丙戊酸钠
- C: 布桂嗪
- D: 佐匹克隆

答案：C

27. 双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- B: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- D: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：D

28. 下述药物中属于鼻腔减充血剂的是

- A: 色甘酸钠溶剂
- B: 布地奈德气雾剂
- C: 链霉素溶剂
- D: 盐酸麻黄碱溶剂

答案：D

29. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

- A: 孕妇
- B: 高钾血症患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 高血压患者和心力衰竭患者

答案：D

30. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 2 小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是（）

- A: 氨氯地平

- B: 硝普钠
- C: 贝那普利
- D: 美托洛尔

答案：B

31. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 阿托品
- C: 阿利吉仑
- D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：B

32. 患者，男，22 岁，诊断为风湿热，可选用

- A: 苄星青霉素
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 双氯西林

答案：A

33. （2019 年真题）起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（）

- A: 西格列汀
- B: 罗格列酮
- C: 艾塞那肽
- D: 利拉鲁肽

答案：B

34. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

B: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

C: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

D: 口服补液盐是复方制剂，I、II 代表不同的配方

答案：C

35. (2020 年真题) 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A: 雷尼替丁

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 雷贝拉唑

答案：C

36. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

A: 帕米膦酸二钠

B: 阿仑膦酸钠

C: 依替膦酸二钠

D: 唑来膦酸

答案：C

37. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

- A: 老年患者及肾功能不全者慎用
- B: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍
- C: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏
- D: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能

答案：D

38. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

- A: 袢利尿剂
- B: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- C: 醛固酮受体阻断剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：B

39. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 地塞米松

答案：C

40. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 96 小时内
- B: 出现流感症状 48 小时内
- C: 出现流感症状 100 小时内
- D: 出现流感症状 72 小时内

答案：B

41. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 过氧苯甲酰

B: 维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 异维 A 酸

答案：D

42. 两性霉素 B 属于()

A: 丙烯胺类抗真菌药

B: 多烯类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 唑类抗真菌药

答案：B

43. 长期大量服用维生素 A 会出现()

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案：B

44. 促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

A: 长春碱类

B: 他莫昔芬

C: 吲哚美辛

D: 紫杉醇

答案: D

45. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 咯萘啶或甲氟喹

B: 氯喹+伯氨喹

C: 乙胺嘧啶+磺胺药

D: 静脉滴注奎宁

答案: A

46. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

A: 万古霉素

B: 氨曲南

C: 头孢唑林

D: 青霉素 G

答案: A

47. 对阴道滴虫有很好疗效的是

A: 青蒿素

B: 二氯沙奈

C: 甲硝唑

D: 链霉素

答案: C

48. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

- A: 格列齐特
- B: 格列本脲
- C: 格列喹酮
- D: 格列美脲

答案：B

49. 关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

- A: 抗酸药直接中和胃酸
- B: 碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂
- C: 最佳服药时间是餐前
- D: 不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生

答案：C

50. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 增加镇痛作用
- B: 镇痛和解痉作用
- C: 增加解痉作用
- D: 防止成瘾

答案：B

51. 可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合，拮抗醛固酮的保钾利尿药是

- A: 氢氯噻嗪

B: 氨苯蝶啶

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案: D

52. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制碘泵

B: 抑制甲状腺素的生物合成

C: 抑制甲状腺蛋白水解酶

D: 抑制 Na^+-K^+ 泵

答案: B

53. 克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A: UGT287

B: p-糖蛋白

C: CYP3A4

D: 血浆蛋白

答案: C

54. 别嘌醇抗痛风的作用机制是

A: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

B: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

C: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

答案: C

55. 紧急降低眼压首选的药物是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 拟 M 胆碱药
- C: β -受体阻断剂
- D: 20%甘露醇

答案：D

56. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 普适泰
- C: 非那雄胺
- D: 十一酸睾酮

答案：B

57. 静脉溶栓首选的药物是

- A: 阿替普酶
- B: 维生素 K
- C: 重组人促红素
- D: 达比加群酯

答案：A

58. 雷尼替丁在使用中应注意

- A: 糖尿病患者避免使用
- B: 对食管有刺激性，需整片吞服
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：A

59. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 可诱发闭角型青光眼
- B: 哺乳期慎用
- C: 滴眼后不应压迫泪囊
- D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案：C

60. 治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 比索洛尔
- D: 氯沙坦

答案：A

61. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。缓释片一次 40mg，一日 2 次的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 喷托维林

答案：A

62. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 调节血脂
- B: 抑制细胞因子的合成
- C: 可抑制血小板聚集
- D: 抑制血管损伤后内膜增生

答案：A

63. 胆绞痛最好选用

- A: 吗啡
- B: 阿托品
- C: 阿司匹林
- D: 阿托品+哌替啶

答案：D

64. 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 阿米替林
- D: 舍曲林

答案：B

65. 抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

- A: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>ARB>利尿药> β 受体阻断药
- B: 钙通道阻滞药(CCB)>ACEI>利尿药> β 受体阻断药>ARB
- C: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB> β 受体阻断药
- D: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)> β 受体阻断药>利尿药>ARB

答案：C

66. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

- A: 地高辛
- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利

D: 氨氯地平

答案: A

67. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是

A: 葡萄糖酸钙

B: 维生素 K1

C: 氨基己酸

D: 鱼精蛋白

答案: C

68. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

A: 阿达帕林

B: 克林霉素

C: 过氧苯甲酰

D: 异维 A 酸

答案: D

69. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 甘露醇

D: 呋塞米

答案: B

70. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是()

A: 异烟肼

B: 阿莫西林

C: 氧氟沙星

D: 红霉素

答案: C

71. 布美他尼属于下列哪类利尿药

A: 强效利尿药

B: 碳酸酐酶抑制药

C: 中效利尿药

D: 保钾利尿药

答案: A

72. 氨曲南属于

A: β -内酰胺类

B: 氨基糖苷类

C: 四环素类

D: 酰胺醇类

答案: A

73. 作用机制是抗代谢的是

A: 巯嘌呤

B: 吉非替尼

C: 紫杉醇

D: 枸橼酸他莫昔芬

答案: A

74. 重组人促红素的最佳适应证是

A: 化疗药物所致贫血

B: 严重再生障碍性贫血

C: 严重缺铁性贫血

D: 慢性肾衰竭所致贫血

答案：D

75. 耐青霉素酶青霉素类的是

A: 哌拉西林

B: 青霉素 V

C: 氨苄西林

D: 苯唑西林

答案：D

76. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

A: 吗啡过量导致的呼吸抵制

B: 肝素过量导致的出血

C: 华法林过量导致的出血

D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

答案：B

77. 属于雌激素类退乳药的是()

A: 他莫昔芬

B: 甲羟孕酮

C: 己烯雌酚

D: 睾酮

答案：C

78. 可竞争肝药酶 CYP2C9、CYP2C19 而影响氯吡格雷代谢为有活性的产物，降低氯吡格雷的疗效，因此正在使用氯吡格雷的患者应避免合用

A: 泮托拉唑

B: 法莫替丁

C: 雷贝拉唑

D: 奥美拉唑

答案: D

79. 用于肝病的氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液（6AA）

B: 复方氨基酸注射液（18AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 赖氨酸注射液

答案: A

80. 直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

A: 硝苯地平

B: 氢氯噻嗪

C: 利血平

D: 肼屈嗪

答案: D

81. （2015 年真题）二磷酸果糖注射液禁用的人群是（ ）。

A: 高磷血症者

B: 高镁血症者

C: 高钾血症者

D: 高尿酸血症者

答案: A

82. 患者女, 58 岁血糖升高 10 年, 口服二甲双胍治疗: 高血压病史 5 年未规律治疗近期查体: 血压 158/95mmHg 尿常规示蛋白尿 (++) 适宜该患者使用的降压药物是 ()

- A: 依那普利
- B: 甲基多巴
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案：A

83. 主要用于预防静脉血栓的口服药物是

- A: 华法林
- B: 链激酶
- C: 低分子肝素
- D: 尿激酶

答案：A

84. 关于镇咳药作用强度的比较，正确的是

- A: 苯丙哌林>可待因>喷托维林
- B: 苯丙哌林>喷托维林>可待因
- C: 可待因>苯丙哌林>喷托维林
- D: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

答案：A

85. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 多柔比星
- B: 长春碱类
- C: 紫杉醇
- D: 伊立替康

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 金刚烷胺和美金刚合用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/485200331122012033>