

黑龙江省伊春区 2024 年《执业药师之西药学专业二》资格考试题库大全附参考答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 维生素 C
- B: 葡萄糖注射液
- C: 生理盐水
- D: 维生素 B 族

答案：C

2. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

- A: 地高辛
- B: 依那普利
- C: 米力农
- D: 多巴酚丁胺

答案：B

3. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 磺胺类药
- D: 布美他尼

答案：B

4. 治疗钙缺乏症可选用

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 依降钙素
- C: 阿法骨化醇
- D: 阿伦膦酸钠

答案：A

5. (2017 年真题) 可能引起中性粒细胞减少的药物 ()

- A: 碘，碘化物
- B: 左甲状腺素
- C: 鲨肝醇
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

6. 关于法莫替丁用药注意事项的说法, 错误的是

- A: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性, 从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢
- B: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔
- C: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积
- D: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

答案：A

7. 属于雌激素的是

- A: 甲羟孕酮
- B: 地塞米松
- C: 尼尔雌醇
- D: 泼尼松龙

答案：C

8. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 地高辛
- D: 哌唑嗪

答案：B

9. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 硫普罗宁
- C: 联苯双酯
- D: 复方甘草甜素

答案：A

10. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 二甲双胍
- B: 美司钠
- C: 氯化钾
- D: 螺内酯

答案：B

11. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 左氧氟沙星滴眼剂
- B: 氯霉素眼膏
- C: 红霉素眼膏

D: 阿托品滴眼剂

答案: A

12. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ()

A: 螺内酯

B: 氯化钾

C: 二甲双胍

D: 美司钠

答案: D

13. 患者, 女, 63 岁, 因心绞痛急诊就医, 诊断为 ST 段抬高心肌梗死, 血压 175/95mmHg, 心率 110 次/分, 该患者适使用的药物是

A: 氨氯地平

B: 美托洛尔

C: 贝那普利

D: 硝普钠

答案: B

14. (2018 年真题) 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法, 错误的是 ()

A: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

B: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

C: 甲硝唑有致突变和致畸作用

D: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案: B

15. 常用的外用痤疮治疗药不包括

- A: 过氧苯甲酰
- B: 特比萘芬
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案：B

16. 临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

- A: 地高辛
- B: 多巴酚丁胺
- C: 米力农
- D: 依那普利

答案：A

17. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 卡托普利
- B: 地高辛
- C: 氨氯地平
- D: 哌唑嗪

答案：D

18. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

- A: 血钾
- B: 血氨
- C: 血钠
- D: 血氯

答案：B

19. 关于复方氢氧化镁的叙述，下列哪项是正确的

- A: 口服易吸收
- B: 对溃疡面有保护作用
- C: 中和胃酸作用强而迅速
- D: 不影响排便

答案：C

20. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 佝偻病
- B: 脚气病
- C: 夜盲症
- D: 孕育异常

答案：D

21. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 布洛芬
- D: 塞来昔布

答案：D

22. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 洛伐他汀
- D: 硝苯地平

答案：D

23. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

A: μ 2 受体

B: δ 受体

C: μ 1 受体

D: K 受体

答案：B

24. 在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 4 周内

B: 1 周内

C: 3 周内

D: 2 周内

答案：D

25. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

A: 阿米洛利

B: 氢氯噻嗪

C: 螺内酯

D: 氨苯蝶啶

答案：B

26. 林可霉素可以作为首选药的是

A: 胆道感染

B: 呼吸道感染

C: 皮肤感染

D: 金葡菌致骨髓炎

答案：D

27. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 吲达帕胺
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：B

28. 镇痛药合理用药原则不包括

- A: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物
- B: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量
- C: 按时给药，而不是按需给药
- D: 尽可能选择口服给药

答案：A

29. 关于 PDE5 抑制剂的代谢动力学，错误的是

- A: 他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄
- B: 伐地那非对 PDE1 和 PDE6 的选择性是西地那非的 4 倍
- C: 他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响
- D: 伐地那非对 PDE5 的选择性是西地那非和他达拉非的 10 倍

答案：A

30. 患者女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导，错误的是（）

- A: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

- B: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响,服药期间应监测甲功
- C: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响
- D: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

答案: D

31. 长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

- A: 氯霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 利巴韦林
- D: 四环素可的松

答案: D

32. 胰岛素和磺酰脲类药物最常见的共同不良反应是

- A: 肝功能损伤
- B: 低血糖反应
- C: 胃肠道反应
- D: 过敏反应

答案: B

33. 急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案: A

34. 组胺 H

- A: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

B: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

C: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁

D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案: C

35. 地高辛的 $t_{1/2}=33$ 小时，按每日给予治疗量，血药浓度何时可达到稳态

A: 6 天

B: 3 天

C: 9 天

D: 12 天

答案: A

36. (2017 年真题) 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是 ()

A: 奎宁

B: 乙胺嘧啶

C: 青蒿素

D: 伯氨喹

答案: B

37. 属于第二代 CCB 的是

A: 左旋氨氯地平

B: 乐卡地平

C: 硝苯地平控释片

D: 氨氯地平

答案: C

38. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 阿利克仑（阿利吉仑）
- D: 阿托普利

答案：D

39. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：B

40. 大环内酯类的主要清除途径是

- A: 主要经呼吸道排泄
- B: 主要经肝脏清除
- C: 主要经肾脏排泄
- D: 经肝、肾双途径清除

答案：B

41. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 溴苄胺
- B: 维拉帕米
- C: 硝苯地平
- D: 地尔硫

答案：A

42. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 复方甘草酸苷
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：B

43. 克拉霉素与环孢素合用()

- A: 不良反应叠加
- B: 后者血药浓度下降，药效降低
- C: 药理作用拮抗
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：D

44. (2020 年真题) 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

- A: 羧甲司坦口服液
- B: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- C: 孟鲁司特片
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：B

45. 铜绿假单胞菌性结膜炎常用

- A: 多黏菌素 B 滴眼液
- B: 金霉素眼膏
- C: 夫西地酸滴眼剂
- D: 1% 泼尼松滴眼液

答案：A

46. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 去氧肾上腺素
- B: 异丙肾上腺素
- C: 去甲肾上腺素
- D: 多巴胺

答案：A

47. 镇静作用明显的 H

- A: 组胺
- B: 阿司咪唑
- C: 苯海拉明
- D: 西咪替丁

答案：C

48. 不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是()

- A: 伏立康唑
- B: 氟康唑
- C: 卡泊芬净
- D: 两性霉素 B

答案：B

49. 伊曲康唑属于()

- A: 多烯类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 丙烯胺类抗真菌药
- D: 棘白菌素类抗真菌药

答案：B

50. 对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

- A: 利尿剂
- B: 氯化钾、葡萄糖注射液
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：A

51. 日晒时有光敏现象的药品是

- A: 多西环素
- B: 庆大霉素
- C: 加替沙星
- D: 头孢哌酮

答案：A

52. 利福平

- A: 禁用于早产儿、新生儿
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：B

53. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是()。

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 洛哌丁胺片
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案：B

54. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

- A: 每日化疗前，应用 5-HT
- B: 5-HT
- C: 5-HT
- D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案：C

55. 具有双向作用，小剂量时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是
()

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 依替膦酸二钠
- C: 氯屈膦酸二钠
- D: 帕米膦酸二钠

答案：B

56. 可用于骨和关节感染的药物是 ()

- A: 四环素
- B: 林可霉素
- C: 青霉素
- D: 万古霉素

答案：B

57. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类药物是
()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

58. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 白色念珠菌
- B: 克柔念珠菌
- C: 新型隐球菌
- D: 热带念珠菌

答案：B

59. 用于绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

- A: 雌二醇
- B: 黄体酮
- C: 米非司酮
- D: 地塞米松

答案：A

60. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 重金属元素及其化合物
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 煤焦油类
- D: 肾上腺皮质激素类

答案：C

61. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 利妥昔单抗
- B: 贝伐珠单抗
- C: 西妥昔单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案: A

62. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 8mg / kg
- B: 6mg / kg
- C: 4mg / kg
- D: 2mg / kg

答案: B

63. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

- A: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍
- B: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍
- C: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍
- D: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍

答案: C

64. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

- A: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情
- B: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射
- C: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用

D: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

答案：A

65. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是 ()

A: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障

B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物

C: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

D: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

答案：A

66. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

A: 不宜使用洋地黄

B: 常规剂量的洋地黄

C: 停用洋地黄

D: 快速洋地黄化

答案：A

67. 主要用于控制疟疾症状的药物是

A: 甲硝唑

B: 吡喹酮

C: 氯喹

D: 乙胺嘧啶

答案：C

68. 青光眼患者应该慎用

A: 沙美特罗

B: 沙丁胺醇

C: 孟鲁司特

D: 噻托溴铵

答案: D

69. 治疗阴道滴虫病的首选药是()。

A: 阿苯达唑

B: 噻嘧啶

C: 甲硝唑

D: 吡喹酮

答案: C

70. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的药物是()

A: 异烟肼

B: 氧氟沙星

C: 阿莫西林

D: 红霉素

答案: B

71. 主要抑制排卵的短效口服避孕药

A: 炔诺酮

B: 雌三醇

C: 雌二醇

D: 复方炔诺酮片

答案: D

72. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

A: 抑制排酸作用

B: 子宫内膜突破性出血

C: 代谢加快而失效

D: 代谢加速而导致意外怀孕

答案: A

73. 对抗香豆素类过量引起出血可选用

A: 垂体后叶素

B: 维生素 K

C: 鱼精蛋白

D: 维生素

答案: B

74. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

B: 主要用于治疗急性白血病

C: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

D: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

答案: D

75. 早产儿、新生儿禁用()

A: 氯霉素

B: 夫西地酸

C: 四环素可的松

D: 利福平

答案: A

76. 氨基糖苷类药的主要作用靶点是

A: 核糖体的 30S 亚基

B: 细胞内膜 PBP

C: 核糖体的 50S 亚基

D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案: A

77. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物的是

A: 维生素 K3

B: 维生素 K4

C: 维生素 K1

D: 维生素 B1

答案: C

78. 环磷酰胺属于哪一类抗肿瘤药物

A: 抗肿瘤金属配合物

B: 烷化剂

C: 抗肿瘤抗生素

D: 抗代谢抗肿瘤药

答案: B

79. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

A: 磺胺嘧啶

B: 甲氧苄啶

C: 复方新诺明

D: 磺胺多辛

答案: A

80. 锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

A: 文拉法辛

B: 吗氯贝胺

C: 吡拉西坦

D: 氟西汀

答案: C

81. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

A: β 受体阻断剂

B: 留钾利尿剂

C: 人促红素

D: 噻嗪类利尿剂

答案: B

82. 患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A: 可使用大环内酯类药物如红霉素

B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢

C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

D: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

答案: A

83. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 骨化三醇

B: 阿仑膦酸钠

C: 雷洛昔芬

D: 降钙素

答案: C

84. 呋喃妥因主要用于

- A: 消化道感染
- B: 全身感染
- C: 呼吸道感染
- D: 尿路感染

答案：D

85. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- D: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

答案：C

86. （2017 年真题）眼底散瞳检查宜选用（）

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：C

87. 属于治疗中枢性尿崩症用药的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 醋酸去氨加压素
- C: 左甲状腺素
- D: 生长抑素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/485304104140012040>