

《中医骨伤科学》期末考试题：

一、 名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1、 骨折成角移位：

两骨折段的轴线交叉成角，以角顶的方向称为向前、向后、向外或向内成角。（P129）

2、 固定：

固定是治疗的一种重要手段，复位后，固定起到主导作用和决定作用。已复位的骨折必须持续地固定在良好的位置，防止再移位，直到骨折愈合为止。目前常用的固定方法分为外固定和内固定两类。（P141）

3、 骨折：

（答案）骨的完整性或连续性中断时称为骨折。（P128）

4、 复位：

（答案）复位是将移位的骨折段恢复正常或接近正常的解剖关系，重建骨骼的支架作用。（P140）

5、 稳定型骨折

（答案）复位后经适当外固定不易发生再移位者，如裂纹骨折、青枝骨折、嵌插骨折及横形骨折等。（P130）

二、 填空题（每个空格 0.5分，共 20 分）

1、 胫腓骨骨折的治疗原则_____，治疗重点_____。

2、 股骨颈和股骨干之间形成一个夹角，称_____，正常值为

_____。

3、 股骨颈骨折按解剖部位分 _____、 _____
_____ 三型。

4、 锁骨中外 1/3 骨折，骨折端因受肌肉的牵拉及上肢重力的影响，骨折近端常向 _____ 移位，远端向 _____ 移位，并向内侧重叠移位。

5、 正常人桡骨远端与腕骨形成关节面，其掌倾角为 _____，尺偏角为 _____。

6、 骨折的急救包括 _____、 _____、 _____、 _____。

7、 桡骨下端骨折是指 _____，临床上可分 _____
_____、 _____、 _____ 四种类型。

8、 Colles骨折可出现典型畸形，即侧面看呈 _____ 畸形，正面看呈 _____ 畸形。

9、 脱位的特有体征有 _____、 _____、 _____。

10、 骨折常见的致伤暴力为以下形式 _____、 _____
_____、 _____、 _____。

11、 骨折常见的 5 种移位是 _____、 _____、 _____
_____、 _____、 _____。

12、 直接暴力引起的骨折多为 _____ 骨折或 _____。

三、单项选择题（请选择一个最佳答案，每题 1 分，共 20 分

- 1、 餐叉样畸形改变常见于_____骨折。A
- A、 桡骨下端骨折 B、 肱骨干骨折 C、 尺骨下端骨折 D、 肩关节脱位
- 2、 下列哪项不属于稳定骨折：（ B ）
- A、 裂缝骨折 B、 螺旋骨折 C、 横断骨折 D、 嵌插骨折
- 3、 下列哪种情况可排除骨折的或能性：（ D ）
- A、 受伤部位无畸形 B、 无骨擦音 C、 局部肿胀与瘀斑
D、 以上均不能排除
- 4、 肱骨干骨折最常见的并发症是（ B ）
- A、 肱动静脉损伤 B、 桡神经损伤 C、 正中神经损伤 D、 尺神经损伤
- 5、 股骨颈骨折晚期最常见的并发症是：（ D ）
- A、 创伤性髋关节炎 B、 髋关节僵硬
C、 褥疮及泌尿系感染 D、 股骨头缺血性坏死
- 6、 下列哪项不是锁骨骨折固定的方法（ C ）
- A、 “8”字绷带固定 B、 双圈固定 C、 夹板 D、 克氏针内固定
- 7、 下列哪项不是骨折特有体征（ D ）
- A、 畸形 B、 骨擦音 C、 异常活动 D、 功能障碍
- 8、 陈旧性骨折是指（ C ）
- A、 骨折损伤后立即来就诊者； B、 骨折损伤后 2—3 周内就诊者； C、 骨折损伤后 2—3 月内就诊者； D、 骨折损伤后任何时间内就诊者；

9、骨折畸形愈合是指（ D ）

A、骨折愈合缓慢；B、关节功能受明显影响；C、陈旧性骨折的愈合；D、骨折发生重叠、旋转；成角而愈合

10、骨折部位骨碎裂成三块以上骨折，称为（ D ）。

A、完全骨折 B、压缩骨折 C、复杂骨折 D、粉碎性骨折

11、小夹板外固定的适应症是四肢闭合性骨折、（ B ）和陈旧性四肢骨折适合于手法复位者。

A、粉碎性骨折；B、四肢开放性骨折创面小或经处理后创口已愈合；C、颈椎骨折；D、髌骨骨折

12、.粘膝征阳性是（ B ）的特有体征

A 膝关节半月板损伤 B 髌关节前脱位 C 髌关节后脱位 D 膝关节脱位

四、多项选择题（请选择2个或2个以上的正确答案，每题1分，共10分）

1、骨折的治疗方法有（ ABCD ）

A 手法复位 B 夹板固定 C 中药辨证用药
D 功能锻炼

2、骨折诊断中有确诊价值的体征是（ ABC ）

A 畸形 B 反常活动 C 骨擦音 D 局部肿痛及功能障碍

3、外伤性脱位，下面哪些是正确的（ ABC ）

A 肩关节脱位可形成习惯性脱位 B 髌关节脱位以后脱位常见

C 髌关节脱位可引起股骨头坏死 D 肘关节脱位多为前脱位

4、致伤外力分为：(ABCD)

A、直接暴力；B、间接暴力；C、肌肉强力收缩；D、持续劳损

5、外伤分为：(AB)

A、骨折；B、脱位；C、伤筋；D、伤经络

6、肱骨髁上骨折常见的类型有：(ABC)

A、伸直型；B、屈曲型；C、粉碎型；D、嵌插型

7、肱骨髁上骨折可引起的并发症有：(CD)

A、桡神经损伤；B、正中神经损伤；C、尺神经损伤；D、肱动脉损伤

8、骨折线的形式分类有：(ABCD)

A 螺旋形骨折 B 横形骨折 C 斜形骨折 D 粉碎骨折

1、股骨头的血运来源于：(ACD)

A 圆韧带动脉 B 腓动脉 C 关节囊的小动脉 D 骨干滋养小动脉

五、是非题 (在你认为正确的句子后的括号中打√，认为错的则打×，每题1分，共10分)

1、肘关节前脱位，肘部呈靴样畸形。(√)

2、骨折合并脱位时治疗一般先整复脱位后整复骨折。(×)

3、髌骨骨折局部摸到凹陷呈沟状骨折端。(√)

4、桡骨下端伸直型骨折，骨折远端向掌侧和桡侧移位？(√)

5、牵引主要是矫正患肢的重叠移位？(×)

6、锁骨骨折不必强求解剖复位，稍有移位对上肢功能影响不大。

(√)

7、 肱骨干中下 1/3 骨折易损伤尺神经，且易产生骨延迟愈合。

(√)

8、 肱骨髁上骨折早期易致神经血管损伤及前臂缺血性挛缩，后期易造成肘内翻等并发症。(√)

9、肱骨干骨折易发生分离移位，复位避免过度牵引。(√)

10、股骨颈基底型骨折易出现股骨头缺血性坏死
(×)

六、 问答题（每题 4 分,共 20 分）

- 1、 叙述断骨未续证型的中医辨证要点？
- 2、 叙述关节脱位的早期并发症？
- 3、 骨折的临床愈合标准及骨性愈合标准是什么？
- 4、 简述骨折的特征？（答案）
- 5、 简述股骨干骨折的移位特点。

七、 病历分析（10 分）

患者陈某，男，23 岁，半小时前不慎发生车祸，当时无昏迷，自觉臀部及少腹部疼痛，不能行走，翻身时疼痛甚，并出现血尿。检查患者呈平卧位，血压 80 / 50mmHg ，心率 110 次 / 分，痛苦面容，烦躁，询问患者可作出简单反应，双侧瞳孔等大等圆，直径为 3mm，对光反射灵敏，双下肢远端活动、血运、感觉尚好，并未触及骨擦音，骨盆挤压征阳性，无腹膜刺激征。根据以上资料，

- 1、最可能的诊断是什么？
- 2、为确诊你应做哪些最主要检查？
- 3、简述急救处理、治疗原则。

答案：

一、

6、 骨折成角移位：

两骨折段的轴线交叉成角，以角顶的方向称为向前、向后、向外或向内成角。（P129）

7、 固定：

固定是治疗的一种重要手段，复位后，固定起到主导作用和决定作用。已复位的骨折必须持续地固定在良好的位置，防止再移位，直到骨折愈合为止。目前常用的固定方法分为外固定和内固定两类。（P141）

8、 骨折：

（答案）骨的完整性或连续性中断时称为骨折。（P128）

9、 复位：

（答案）复位是将移位的骨折段恢复正常或接近正常的解剖关系，重建骨骼的支架作用。（P140）

10、 稳定型骨折

（答案）复位后经适当外固定不易发生再移位者，如裂纹骨折、青枝骨折、嵌插骨折及横形骨折等。（P130）

二、 填空题

- 1、（答案）主要恢复小腿的长度和负重功能、处理胫骨骨折
- 2、（答案）颈干角、 $110^{\circ}\sim 140^{\circ}$
- 3、（答案）头下型、颈中型、基底部型
- 4、（答案）后上方、前下方
- 5、（答案） $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$
- 6、（答案）救治危及生命的并发伤、包扎止血、固定、转运
- 7、（答案）桡骨下端骨折是指桡骨远侧端 3cm 范围内的骨折、伸直型、屈曲型、背侧缘劈裂骨折、掌侧缘劈裂骨折
- 8、（答案）餐叉样、枪上刺刀样
- 9、（答案）关节畸形、关节孟空虚、弹性固定
- 10、（答案）成角畸形、侧方移位、缩短移位、分离移位、旋转移位
- 11、（答案）成角畸形、侧方移位、缩短移位、分离移位、旋转移位
- 12、（答案）横形骨折、粉碎性骨折

三、 1A； 2B、 3D、 4B、 5D、 6C、 7D、 8C、 9D、 10D、 11B、 12B

四、 1、ABCD 、2ABC 、3ABC 、4ABCD 、5AB 、6ABC 、7CD 、8ABCD 、
9ACD

五、 1√ 2×、 3√ 4√ 5、×6√ 7√ 8√ 9√ 10×

六、1、（答案）骨断中期，骨位已正，尚有瘀血未去，筋骨连接未坚，局部肿瘀未消尽，疼痛压痛固定，功能活动障碍，舌质淡，苔薄白，脉沉缓。

2、(答案) 早期并发症有①骨折, 多发生在关节邻近的骨端或关节边缘; ②血管损伤, 一般多因压迫牵拉伤所致; ③神经损伤, 多为脱位的骨端压迫或牵拉所致; ④感染, 开放性脱位如不及时清创或清创不彻底, 可引起关节与创面化脓性感染或发生特异性感染。

3、(答案) 骨折的临床愈合标准: (一) 局部无压痛, 无纵向叩击痛; (二) 局部无异常活动; (三) X 线照片显示骨折线模糊, 有连续性骨痂通过骨折线; (四) 功能测定 在解除外固定情况下, 上肢能平举 1Kg 达一分钟, 下肢能连续徒手步行三分钟, 并不少于 30 步; (五) 连续观察两周骨折处不变形, 则观察的第一天即为临床愈合日期。骨折的骨性愈合标准: (一) 具备临床愈合标准的条件; (二) X 线照片显示骨小梁通过骨折线。

4、(一) 畸形: 骨折时常因暴力作用、肌肉或韧带牵拉、肢体重量、搬运不当等可使断端发生不同程度的移位, 出现肢体形状改变而发生畸形; (二) 骨擦音: 由于骨折断端相互触碰或摩擦而产生, 一般在局部检查时用手触摸骨折处才可感觉到; (三) 异常活动骨干部无嵌插的完全性骨折, 可出现好似关节一样的可动性, 被称之为假关节现象。是因为骨的连续性丧失后所呈现的异常活动。

5、(答案) (一) 上 1/3 骨折时, 骨折近端受髂腰肌、臀中肌、臀小肌和髋关节外旋肌的牵拉而产生屈曲、外展、外旋移位; 远折端受内收肌群的牵拉而向上、向内、向后移位, 造成向外成角和缩短; (二) 中 1/3 骨折时, 两断端除重叠外, 移位无一定规律, 其畸形往往是按受力方向而相应成角。大多数近端呈外旋、屈曲倾向, 远端则因受内

收肌的牵拉而向内、向上方移位，使两折端向前外成角；（三）下 1/3 骨折时，远断端受膝后方关节囊及腓肠肌牵拉而向后倾倒，锐利的骨折端可压迫或刺伤腘动、静脉以及胫神经、腓总神经。

七、（答案）

- 1、 最可能的诊断为：A、骨盆骨折；B、尿道损伤；C、休克
- 2、 检查为：A 骨盆平片、B 腹部平片、C 肛门指诊、D 尿道检查、肝胆腹腔双肾 B 超检查；
- 3、 急救处理、治疗原则为：
A、完善各项检查。B、补充血容量、积极治疗创伤性休克。C、严密监测生命征。D、抗感染、支持等对症处理。E、插尿管并留置及接袋，记尿量、观察有无血性尿。F、临时外固定骨盆。

《中医伤科学》试题 wj

姓名： 班别： 学号： 分数：

一. 名词解释（10分，每题2分）

1. 骨折

2. 髓内翻

3. 骨擦感

4. 缺血性肌挛缩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485321042344011333>