

实用临床护理三基考试试题含参考答案

1、如人工流产术中出现子宫穿孔，下列哪项处理措施是错误的：（ ）

- A、立即停止操作
- B、观察生命体征、腹痛及有无出血情况
- C、给予子宫缩剂及抗生素
- D、减小负压继续完成手术

答案：D

2、有机磷农药中毒病人，在应用抗胆碱药时，下列哪项临床表现不能表明阿托晶化：（ ）

- A、颜面潮红
- B、皮肤干燥
- C、心率 110 次/分
- D、肺部啰音增加

答案：D

3、静脉输液时造成病人急性肺水肿发生的原因是：（ ）

- A、输入致热物质
- B、输液速度过快
- C、长时间输入高浓度药液
- D、输液过程中无人守护

答案：B

4、下列关于 TUR 综合症的叙述，错误的是：（ ）

A、TUR 是由于术中大量的冲洗液被吸收，使血容量急剧增加，形成稀释性低钠血症

- B、病人表现烦躁、恶心、抽搐、昏迷
- C、应减慢输液速度，给予利尿剂、脱水剂
- D、TUR 综合征是前列腺术后常见的并发症

答案：D

5、下列说法哪项是正确的：（ ）

- A、肌无力危象是由于抗胆碱酯酶药物过量所致
- B、胆碱能危象是由于抗胆碱酯酶药物剂量不足所致
- C、注射腾喜龙后如症状减轻者为肌无力危象
- D、出现呼吸肌无力时，应用抗胆碱酯酶药物无效

答案：C

6、纤维结肠镜术前何时行清洁灌肠对检查效果最佳：（ ）

- A、前 1 天晚餐后

- B、术前 8 小时
- C、术前 4 小时
- D、术前 1 小时

答案：D

7、尿石症病人的护理措施，错误的是：

- A、术后绝对卧床 1 个月
- B、肠蠕动恢复后可进食
- C、饮水每日 3000~4000ml
- D、保持引流通畅

答案：A

8、关于破伤风病人的护理，错误的一项是：（ ）

- A、为减少刺激，不需专人护理
- B、严密观察生命体征的变化
- C、加强呼吸道管理
- D、观察局部伤口情况

答案：A

9、有关胃镜检查术前准备的描述，错误的是：（ ）

- A、检查前禁食、禁水 6 小时
- B、检查前 24 小时内避免做消化道钡剂透视
- C、幽门梗阻病人禁食 24 小时
- D、取左侧卧位

答案：C

10、下列有关低心排综合征的叙述，正确的是：（ ）

A、体外循环术后，由于心脏排血量显著减少以致重要脏器灌注不足而引起的休克症候群

B、由于急性心脏病变引起心排血量显著、急剧地降低，导致组织器官灌注不足和急性淤血的综合征

C、由于心排血量突然骤减、中断或严重低血压而引起一时性脑缺血、缺氧

D、由于各种原因引起短时间内大量出血及体液丢失，使有效循环血量降低所致

答案：A

11、口底、颌下及颈部的急性蜂窝组织炎危及生命的并发症是：（ ）

- A、颅内化脓性海绵状静脉窦炎
- B、肺部化脓性感染
- C、喉头水肿致呼吸困难，甚至窒息

D、败血症

答案：C

12、造成输血前红细胞破坏引起溶血反应的原因不包括：（ ）

- A、血液储存时间过久
- B、血液被剧烈震荡
- C、血液中加入高渗或低渗性溶液
- D、输入异型血

答案：D

13、在下列术后出血的原因中，除外哪项：（ ）

- A、凝血机制障碍
- B、术中止血不完善
- C、术后结扎线脱落
- D、未施行加压包扎

答案：D

14、下列哪一项不是干眼症病人的特征性表现：（ ）

- A、泪液分泌减少
- B、不流泪
- C、泪膜稳定性降低
- D、眼表功能损害

答案：B

15、中医学的基本特点是：（ ）

- A、整体护理，辨证论治
- B、整体观念，辨证论治
- C、整体观念，辩证施护
- D、整体护理，辩证施护

答案：B

16、最常用的硝酸酯类抗心绞痛药是：（ ）

- A、硝酸甘油
- B、心得安
- C、消心痛
- D、心痛定

答案：A

17、病情级别为 II 级的急诊病人符合下列哪一项：（ ）

- A、争性症状不能缓解的病人
- B、有潜在危及生命的可能

- C、如果得不到紧急救治，很快会导致生命危险
- D、慢性疾病急性发作的病人

答案：B

18、护患沟通中对建立良好第一印象至关重要的一项是：（ ）

- A、自我介绍
- B、注意外在形象
- C、记住病人姓名
- D、介绍护理单元

答案：B

19、初产妇孕 32 周时测得 Bp150 / 120 mmHg，水肿(++)、尿蛋白(+)，自觉轻度头晕，该孕妇的初步诊断为：（ ）

- A、妊娠水肿
- B、轻度妊高征
- C、中度妊高征
- D、重度妊高征

答案：C

20、下列不属于无创通气禁忌证的一项是：（ ）

- A、心跳、呼吸骤停
- B、上呼吸道阻塞
- C、围手术期低氧血症
- D、面部手术

答案：C

21、心脏的正常起搏点位于：（ ）

- A、窦房结
- B、房室结
- C、房室交界
- D、心房肌

答案：A

22、下列哪项不是清洁的目的：（ ）

- A、去除潜在的病原微生物
- B、减少接触感染的机会
- C、保持物品美观
- D、预防医院感染

答案：C

23、有关睡眠型呼吸暂停的叙述，错误的一项是：（ ）

- A、中枢性呼吸暂停是由于药物中毒引起的
- B、睡眠型呼吸暂停分为中枢性和阻塞性两种
- C、睡眠型呼吸暂停是一种在睡眠中发生自我抑制、没有呼吸的现象
- D、肥胖者可发生睡眠型呼吸暂停

答案：A

24、依据纽曼模式，护理的主要功能是：（ ）

- A、执行医嘱
- B、执行护理程序
- C、帮助护理对象保持、恢复系统的平衡和稳定
- D、健康教育

答案：C

25、评价机体活动能力时，以下哪项不是主要观察内容：（ ）

- A、行走
- B、书写
- C、穿衣
- D、洗漱口

答案：B

26、支气管胸膜瘘一般常发生在术后：（ ）

- A、3~4天
- B、5~6天
- C、7~10天
- D、10~12天

答案：C

27、病人对突如其来的意外伤害毫无心理准备，在经过短暂的应激状态后表现为异常的平静与冷漠，少言寡语，对各种治疗处置反应平淡.这属于下列哪种心理反应：（ ）

- A、无效性否认
- B、ICU综合征
- C、愤怒与敌对
- D、情绪休克

答案：D

28、肾病综合征病人出现尿量小于400ml/d，应警惕：（ ）

- A、急性肾衰竭
- B、慢性肾衰竭
- C、肾前性少尿

D、尿潴留

答案：A

29、恶性肿瘤病理分级的根据是：（ ）

A、肿瘤生长快慢

B、肿瘤的生长方式及浸润性

C、有无复发或转移

D、肿瘤细胞的组织学分化程度

答案：D

30、道德是由以下哪项因素决定的：（ ）

A、文化基础

B、物质基础

C、经济基础

D、环境因素

答案：C

31、小儿高热惊厥的紧急处理，错误的是：（ ）

A、惊厥发作时立即搬至抢救室进行抢救

B、及时清除口鼻咽分泌物，保持呼吸道通畅

C、密切观察生命体征、瞳孔及神志改变

D、专人守护，防止坠床和碰伤

答案：A

32、破伤风发生强直性痉挛累及肌群的先后顺序是：（ ）

A、表情肌→咬肌→颈项肌→背腹肌→四肢肌

B、咬肌→表情肌→颈项肌→背腹肌→四肢肌

C、咬肌→颈项肌→表情肌→四肢肌→背腹肌

D、颈项肌→表情肌→咬肌→背腹肌→四肢肌

答案：B

33、何种元素具有与铁互相干扰吸收的作用：（ ）

A、锌

B、钙

C、磷

D、镁

答案：A

34、紧张综合征病人最明显的临床表现是：（ ）

A、面色潮红

B、手心出汗

- C、紧张性木僵
- D、手足不自主的摆动

答案：C

35、关于颅内压的叙述，错误的是：（ ）

- A、颅内压是指颅内容物对颅腔壁所产生的压力
- B、颅内压是指颅内血液对血管壁所产生的压力
- C、正常成人平卧位时的颅内压为 0.7~2.0 kPa70~200mmH₂O
- D、儿童的颅内压比成人的低

答案：B

36、类风湿性关节炎急性发作期不宜：（ ）

- A、卧床休息
- B、限制受累关节活动
- C、置关节于功能位
- D、多活动关节，避免僵硬

答案：D

37、缺铁性贫血属于哪一类贫血：（ ）

- A、正细胞正色素性
- B、大细胞低色素性
- C、小细胞正色素性
- D、小细胞低色素性

答案：D

38、胎盘早剥的处理原则是：（ ）

- A、纠正休克、及时终止妊娠
- B、应用纤维蛋白原
- C、催产素促进及早分娩
- D、立即剖宫产

答案：A

39、预防切口感染最关键的措施是：（ ）

- A、改善病人的营养状况
- B、定期更换切口敷料
- C、严格执行无菌操作
- D、足量使用抗生素

答案：C

40、环境降温是中暑病人降温的方法之一，通常将室温调节为：（ ）

- A、15~20℃

B、20~25℃

C、26~30℃

D、10~15℃

答案：B

41、属于客观方面的健康资料是：（ ）

A、疼痛

B、愉快

C、水肿

D、乏力

答案：C

42、对女性尿道的描述，错误的是：（ ）

A、窄

B、短

C、直

D、后方紧临肛门，且易发生逆行性尿路感染

答案：A

43、为预防和控制子痫发作，首选药物是：（ ）

A、利血平

B、复方降压片

C、安定

D、硫酸镁

答案：D

44、继发性闭经是指曾建立正常月经后，因某种病理性原因而月经停止几个月以上者（ ）

A、4个月

B、6个月

C、8个月

D、12个月

答案：B

45、中心静脉压(CVP)降低的常见原因有：（ ）

A、使用呼气末正压 PEEP

B、心源性休克

C、血容量不足

D、肺动脉高压

答案：C

46、张女士，40岁，患者主诉下腹部胀痛，排尿困难，体检见耻骨上膨隆，可扪及囊样包块，叩诊呈实音，有压痛。对该患者实施的护理措施中不正确的一项是：（ ）

- A、让患者听流水声
- B、口服利尿剂
- C、用温水冲洗会阴部
- D、行导尿术

答案：B

47、机械通气时，吸痰操作错误的是：（ ）

- A、吸痰前后，适当□高吸入氧浓度
- B、吸痰前，结合翻身、拍背使痰液从周边肺野向中心集中
- C、吸引负压不超过 19.6 kPa200cmH₂O
- D、用吸引口鼻腔的吸痰管再吸引气道

答案：D

48、低氧血症伴有二氧化碳潴留病人，应选择何种类型的氧疗方式：（ ）

- A、高压氧疗
- B、高浓度氧疗
- C、中等浓度氧疗
- D、低浓度氧疗

答案：D

49、正常妇女排卵后基础体温可升高：（ ）

- A、0.1~0.2℃
- B、0.3~0.5℃
- C、0.6~1℃
- D、1℃

答案：B

50、关于主动湿化的优点叙述不正确的是：（ ）

- A、无附加死腔
- B、低阻力
- C、灵活控制温度和湿度
- D、不会过度湿化

答案：D

51、为预防和控制子痫发作，首选药物是：（ ）

- A、利血平
- B、复方降压片

- C、安定
- D、硫酸镁

答案：D

52、李先生，60岁，因“脑血栓形成”后3周，右侧上下肢能在床面上平移，但不能抬起，判断其肌力为：（）

- A、0级
- B、1级
- C、2级
- D、3级

答案：C

53、使用退热药后出现体温不升，不包括下列哪类病人：（）

- A、极度营养不良病人
- B、全身衰竭病人
- C、严重休克病人
- D、抽搐病人

答案：D

54、我国列为重点防治的性传播疾病主要有几种：（）

- A、5种
- B、6种
- C、种
- D、8种

答案：D

55、产后出血是指：（）

- A、产褥期阴道出血达500ml以上
- B、胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过500ml者
- C、胎盘娩出后24小时内阴道流血量达500ml以上
- D、临产后到胎盘娩出，阴道流血量达500ml以上

答案：B

56、浸润型肺结核属于：（）

- A、I型
- B、II型
- C、III型
- D、IV型

答案：C

57、成人经鼻气管插管的深度为：（）

- A、导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 27cm±2cm
- B、导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 22cm±2cm
- C、导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 25cm±2cm
- D、导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 29cm±2cm

答案：A

58、术后发生血栓性静脉炎，严禁局部按摩是为了防止发生：（）

- A、小动脉萎缩
- B、腿挛缩变形
- C、脑血管动脉瘤
- D、肺栓塞

答案：B

59、下列哪项不是肺癌的主要转移途径：（）

- A、直接扩散
- B、淋巴转移
- C、血行转移
- D、种植

答案：D

60、人口老龄化是指：（）

- A、社区团体中老年人增加
- B、老年人年龄划分新标准
- C、老年人口数占总人口数的 10%以上
- D、社会人口结构中老年人口占总人口的比重不断增加的过程

答案：D

61、必需脂肪酸是指：（）

- A、人体不可缺少
- B、自身不能合成
- C、通过食物供给
- D、多不饱和脂肪酸
- E、饱和脂肪酸

答案：ABCD

62、为保持淹溺病人呼吸道通畅，应立即采取的措施有：（）

- A、清除口鼻中的异物
- B、将舌头拉出
- C、取下义齿
- D、松开领口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486035234022010042>