

2024 年广西壮族自治区扶绥县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库往年题考

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：D

2. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μgqd 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是()

- A: 早餐前半小时，顿服
- B: 晚餐后顿服
- C: 早餐后半小时，顿服
- D: 睡前顿服

答案：A

3. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 C
- C: 维生素 K1
- D: 低分子肝素

答案：A

4. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物代谢速度的是

- A: 食醋中的醋酸
- B: 食盐中的氯化钠
- C: 酒中的乙醇
- D: 茶叶中的鞣酸

答案：C

5. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

- A: 蛋白同化制剂
- B: 易制毒药品
- C: 肽激素类
- D: 精神刺激剂

答案：A

6. 不稳定型心绞痛的药物治疗中，不属于抗凝治疗的药物为

- A: 磺达肝癸钠
- B: 替罗非班

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 肝素

D: 低分子肝素

答案：B

7. 误服汞产生的急性汞中毒，最先表现的症状是

- A: 头痛、头晕
- B: 神经衰弱
- C: 兴奋
- D: 口腔炎、胃肠炎

答案：D

8. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜餐后服用的药品是

- A: 普伐他汀
- B: 格列美脲
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案：C

9. 高血压患者的降压目标老年高血压（）

- A: <130 / 80mmHg
- B: <150 / 90mmHg
- C: <120 / 80mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案：B

10. 服用药物对粪外观的影响，保泰松

- A: 红至黑色
- B: 变红或黑色
- C: 黄色

D: 橘红至红色

答案: B

11. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

A: 遗传因素

B: 胃窦部幽门螺杆菌感染

C: 化学物质的刺激

D: 吸烟

答案: B

12. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: ACEI、AR

B: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

C: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

D: 硝普钠、利尿药、ACEI

答案: C

13. 可能影响儿童骨骼发育的药物是()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 头孢克洛
- B: 诺氟沙星
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 阿莫西林

答案：B

14. 应用铁剂的影响因素预防铁负荷过重，表现为铁的吸收与体内储存量有关，缺铁性贫血者的吸收率为

- A: 10%~20%
- B: 0.4
- C: 10%~30%
- D: 0.3

答案：D

15. 高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

- A: 依那普利
- B: 美托洛尔
- C: 氢氯噻嗪
- D: 维拉帕米

答案：B

16. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

- A: www. cm
- B: org. cn
- C: www. cp
- D: org. cn

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

17. 使用年龄折算法，体重折算法，体表面积折算法等计算，是指

- A: 严格掌握用药剂量
- B: 明确诊断
- C: 密切监护
- D: 严格掌握适应证

答案：A

18. 痛经伴有精神紧张者可口服

- A: 布洛芬
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

19. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

- A: C 级
- B: D 级
- C: X 级
- D: A 级

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

20. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 μ mol/L (正常值: 男性 180~440 μ mol/L)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 格列齐特
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 甘精胰岛素

答案: C

21. 下列药物中不按兴奋剂管理的是

- A: 精神刺激剂
- B: 钙通道阻滞剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 利尿剂

答案: B

22. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用阿托伐他汀钙片
- B: 停用瑞格列奈片
- C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

23. 患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()

B: 骨质疏松

C: 消化性溃疡

D: 低血压

答案：A

24. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 复方消化酶送服时不宜用热水

B: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

C: 与吸附剂合用须间隔 2~3h

D: 胰酶口服时应嚼碎

答案：D

25. 黄体酮用于输尿管结石

A: 过度治疗用药

B: 盲目联合用药

C: 无适应证用药

D: 超适应证用药

答案：D

26. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是（）

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 布地奈德混悬液

C: 多索茶碱注射液

D: 孟鲁斯特纳咀嚼片

答案：B

27. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白
- B: 药用炭
- C: 小檗碱
- D: 洛哌丁胺

答案：D

28. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 二巯丙醇"驱汞"治疗
- B: 弱碱中和强酸
- C: 药用炭吸附
- D: 依地酸钙钠解救铅中毒

答案：C

29. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用？
- B: 首选口服补液，必要时静脉补液？
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用？
- D: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充？

答案：C

30. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 葡萄糖酸亚铁
- C: 乳酸亚铁
- D: 去铁胺

答案：D

31. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：A

32. 淋巴细胞正常参考区间是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 0.005~0.05

B: 0.20~0.40

C: 0~0.01

D: 0.03~0.08

答案：B

33. 患者，男性，55 岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 Hb72g / L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

- A: 服药时不能饮用茶和咖啡
- B: 注意足够的蛋白质摄入
- C: 尽量使用铁锅烹饪
- D: 大便颜色变黑为消化道出血所致

答案：D

34. 服用药物对粪外观的影响，利福平

- A: 红至黑色
- B: 橘红至红色
- C: 黄色
- D: 变红或黑色

答案：B

35. (2017 年真题) 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 泼尼松

答案：B

36. 患者，男，56 岁，慢性乙型肝炎患者，ALT120U/L。下列药物中可以使用的是

- A: 氟康唑
- B: 异烟肼

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 水飞蓟素

D: 利福平

答案: C

37. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

A: <140 / 90mmHg

B: <130 / 80mmHg

C: <125 / 75mmHg

D: <150 / 90mmHg

答案: A

38. 餐前 1h 服用的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 奥美拉唑

C: 伊托必利

D: 复方氢氧化铝

答案: D

39. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断急、慢性白血病

B: 诊断恶性贫血

C: 诊断痛风

D: 诊断心肌梗死

答案: D

40. 蒽环类药物的主要毒副作用是 ()

A: 溶血性尿毒症

B: 肺纤维化

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 心脏毒性

D: 出血性膀胱炎

答案：C

41. 使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

A: 60mg tid

B: 60mg qd

C: 60mg bid

D: 100mg/次

答案：A

42. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

A: pc

B: po

C: qn

D: Ac

答案：A

43. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

B: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

C: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

答案：B

44. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 阿莫西林 + 克拉霉素

B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 克拉霉素

C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 甲硝唑

D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星

答案: C

45. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗 (具体药物及剂量不详) 后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验 (+)。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周

B: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

C: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd, 疗程 4 周

答案: D

46. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

A: 药动学相互作用

B: 药物制剂因素

C: 药物的使用

D: 药理作用

答案: D

47. 由服用利尿剂所引起的尿失禁属于 ()

A: 压力性尿失禁

B: 急迫性尿失禁

C: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

D: 真性尿失禁

答案: C

48. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为 ()

A: 姿势反射障碍

B: 神经精神障碍

C: 体位性低血压

D: 不安腿综合征

答案: A

49. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充, 或因果关系难以定论, 缺乏文献资料佐证; 可评价为

A: 可能无关

B: 待评价

C: 可能

D: 很可能

答案：B

50. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者的预后大为改观，血液净化的方法不包括

A: 血液滤过

B: 腹膜透析

C: 血液置换

D: 血液透析

答案：C

51. 切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

A: 地芬诺酯

B: 匹维溴铵

C: 环孢素 A

D: 蒙脱石散

答案：B

52. 控制癫痫持续状态应首选

A: 口服硫酸镁

B: 肌内注射地西洋

C: 静脉注射地西洋

D: 静脉注射丙戊酸钠

答案：C

53. 患者，女，65 岁，间断腹胀、纳差 6 年，因病情加重伴精神恍惚 3 天为主诉入院，实验室检查：ALT200U/L，AST320U/L，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史 20 年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史 10 年，便秘多年，3~4 天排便一次。

- A: 辅酶 A
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 水溶性维生素
- D: 维生素 B1

答案：B

54. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素

- A: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5 小时
- B: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- D: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

答案：D

55. 依据药物临床评价的对象和内容判断，对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

- A: III 期临床试验
- B: IV 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：C

56. (2017 年真题) 高脂饮食可促进其吸收的药物是 ()

- A: 维 A 酸片
- B: 非洛地平片
- C: 左旋多巴片
- D: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

答案: A

57. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 体位性低血压
- B: 高血钾
- C: 快速房性心律失常伴传导阻滞
- D: 心动过缓

答案: B

58. 属于超适应证用药的是

- A: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗
- B: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗
- C: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- D: 黄体酮用于排除结石

答案: D

59. 治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

- A: 半衰期小于 30 分钟

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 半衰期大于 30 小时
- C: 半衰期 8~24 小时
- D: 半衰期大于 24 小时

答案：A

60. 可使驾驶员出现定向力障碍的药物是

- A: 吲达帕胺
- B: 哌替啶
- C: 东莨菪碱
- D: 右美沙芬

答案：B

61. 血管紧张素 II 受体阻断剂

- A: 缬沙坦
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

62. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

- A: 铁剂联用维生素
- B: 阿托品联用普萘洛尔
- C: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- D: 硝苯地平联用普萘洛尔

答案：A

63. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

C: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂

D: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂

答案: D

64. 痛风时尿沉渣结晶为 ()

A: 磷酸盐结晶?

B: 酪氨酸?

C: 草酸盐结晶?

D: 尿酸盐结晶?

答案: D

65. 结核病化学治疗的基本原则是 ()

A: 早期、联合、适量、规律、全程

B: 早期、单一、适量、规律、全程

C: 早期、单一、足量、规律、全程

D: 早期、联合、足量、规律、全程

答案: A

66. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 溶血性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼细胞性贫血

答案: C

67. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

- A: 48 小时
- B: 4 小时
- C: 1 周
- D: 24 小时

答案：B

68. 下列药品中，孕妇禁用的是

- A: 拉贝洛尔
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 维生素 A
- D: 环丙沙星

答案：D

69. (2021 年真题) 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是 ()

- A: 昂丹司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 地塞米松
- D: 苯海拉明

答案：B

70. 医院获得性肺炎无感染高危因素患者的最常见病原体为

- A: 流感嗜血杆菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 肺炎链球菌

D: 大肠杆菌

答案：C

71. 通过抑菌圈直径判断细菌对不同药物的敏感性，而不以最小抑菌浓度（MIC）判断药物抗菌作用的药敏试验方法是

A: 肉汤稀释法

B: 琼脂稀释法

C: 纸片扩散法

D: E-test 法

答案：C

72. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

A: 美托洛尔

B: 依那普利

C: 氢氯噻嗪

D: 哌唑嗪

答案：A

73. （2015 年真题）患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

B: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

D: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

答案：B

74. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A: 别嘌醇

B: 丙磺舒

C: 阿司匹林

D: 秋水仙碱

答案：B

75. 评价肾功能的可靠指标是

A: 血清肌酐

B: 尿素氮

C: 尿液酸碱度

D: 尿液肌酐

答案：A

76. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

A: 阿那曲唑

B: 炔雌醇

C: 他莫昔芬

D: 丙酸睾酮

答案：A

77. 钙制剂属于

A: 激素替代剂

B: 促进骨矿化剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 骨形成刺激剂

D: 骨吸收抑制剂

答案: B

78. (2017 年真题) 患者, 77 岁, 因感冒发热咳嗽, 自服酚麻美敏片、维 C 银翘片, 三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是 ()

A: 维生素

B: 氯苯那敏

C: 银翘

D: 对乙酰氨基酚

答案: B

79. 长期应用苯二氮

A: 后遗效应

B: 首剂效应

C: 毒性反应

D: 戒断症状

答案: D

80. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

A: 加替沙星

B: 头孢哌酮

C: 拉氧头孢

D: 利巴韦林

答案: A

81. 对某些患者应教会正确量取内服液体制剂, 是针对

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 交代药物的用量
- B: 交代用药注意事项
- C: 交代用药途径及用药方法
- D: 交代药品贮存条件与方法

答案：A

82. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17 β 一雌二醇
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- D: 雌二醇-屈螺酮片

答案：C

83. IV 期新药临床试验样本数要求

- A: 主要病种 \geq 300 例
- B: 常见病 \geq 12000 例
- C: 20~30 例
- D: \geq 300 例

答案：B

84. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 慢性支气管炎
- B: 支气管哮喘
- C: 阻塞性肺气肿

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 慢性支气管炎合并肺气肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/486144012101011030>