2024年广西壮族自治区扶绥县《执业药师之西药学专业二》考试必背200题题库【黄金题型】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A：美西律

B：胺碘酮

C：地尔硫革

D：普萘洛尔

答案：D

2.属于III类抗心律失常药

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：普萘洛尔

D：利多卡因

答案：B

3.下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A：用药期间应监测肝肾功能

B：与传统化疗药存在交叉耐药

C：常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

D：用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

答案：B

4.能竞争DNA聚合酶的抗病毒药是

A：拉米夫定

B：阿昔洛韦

C：利巴韦林

D：碘苷

答案：B

5.治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

A：乙胺嘧啶+磺胺药

B：静脉滴注奎宁

C：氯喹+伯氨喹

D：咯萘啶或甲氟喹

答案：C

6.全身用药可以用于伤寒、副伤寒的酰胺醇类药物是()

A：呋喃妥因

B：氯霉素

C：左氧氟沙星

D：复方磺胺甲噁唑

答案：B

7.用于过敏性休克的是()

A：熊去氧胆酸

B：阿托品

C：肾上腺素

D：甲氧氯普胺

答案：C

8.雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

A：2

B：4

C：8

D：6

答案：D

9.为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

A：二甲双肌

B：氯化钾

C：美司钠

D：螺内酯

答案：C

10.频繁、剧烈无痰干咳患者宜选用

A：地关索酯

B：喷托维林

C：右美沙芬

D：可待因

答案：D

11.下列保肝药中属于必需磷脂类的是

A：甘草酸二铵

B：多烯磷脂酰胆碱

C：复方甘草酸苷

D：联苯双酯

答案：B

12.肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

A：抑制磷的排泄

B：抑制钙的排泄

C：抑制钾的排泄

D：抑制钠的排泄

答案：D

13.属于叶酸类抗代谢类药物的是()

A：长春瑞滨

B：甲氨蝶呤

C：吉西他滨

D：巯嘌呤

答案：B

14.血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

A：β 受体阻断药

B：留钾利尿药

C：人促红素

D：噻嗪类利尿药

答案：B

15.神经毒性较严重的是

A：卡铂

B：顺铂

C：奥沙利铂

D：亚叶酸钙

答案：C

16.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：吲达帕胺

B：呋塞米

C：乙酰唑胺

D：氨苯蝶啶

答案：B

17.甲氧苄啶联用利福平使

A：肾毒性增加

B：抗凝作用增强

C：白细胞减少风险增加

D：半衰期缩短

答案：D

18.双香豆素与阿司匹林合用可

A：竞争性对抗

B：与其竞争结合血浆蛋白

C：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

D：产生协同作用

答案：D

19.属于工类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A：胺碘酮

B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

答案：D

20.华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是

A: 维生素B12

B: 氨甲苯酸

C: 硫酸鱼精蛋白

D: 维生素K1

答案：D

21.（2021年真题）有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是（）

A: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄

B: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

C: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

D: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：C

22.体内缺乏维生素B

A: 不孕症

B: 脂溢性皮炎

C: 脚气病

D: 贫血

答案：C

23.口服后很少被吸收的口服降糖药是

A: 二甲双胍

B：罗格列酮

C：达格列净

D：阿卡波糖

答案：D

24.硫脲类最重要的不良反应是

A：丙硫氧嘧啶

B：甲状腺素

C：血管神经性水肿

D：粒细胞下降

答案：D

25.（2020年真题）患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A：普萘洛尔

B：特布他林

C：利多卡因

D：碘化钾

答案：A

26.抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

A：环磷酰胺

B：奥沙利铂

C：丝裂霉素

D：塞替派

答案：A

27.在体内主要经CYP3A4代谢的质子泵抑制剂是

A：兰索拉唑

B：米索前列醇

C：枸橼酸铋钾

D：铝碳酸镁

答案：A

28.对高肾素型高血压病有特效的是

A：肼屈嗪

B：依那普利

C：卡托普利

D：尼群地平

答案：C

29.单纯疱疹病毒感染的首选药是

A：干扰素

B：金刚烷胺

C：碘苷

D：阿昔洛韦

答案：D

30.为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

A：克拉维酸

B：舒巴坦

C：他唑巴坦

D：西司他丁

答案：D

31.抗利尿作用最明显的阿片类镇痛药物是

A：吗啡

B：苯巴比妥

C：地西泮

D：苯妥英钠

答案：A

32.对肾功能影响较小的抗高血压药是()

A：胍乙啶

B：肼屈嗪

C：卡托普利

D：利血平

答案：B

33.分泌盐皮质激素的是

A：束状带和网装带

B：网状带

C：束状带

D：球状带

答案：D

34.用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

A：绒促性素

B：硝苯地平

C：米非司酮

D：噻嘧啶

答案：A

35.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

B: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

C: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

D: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素

答案：B

36.临床主要用于脑型恶性疟的药物是()。

A: 氯喹

B: 甲硝唑

C: 伯氨喹

D: 奎宁

答案：D

37.（2018年真题）适应症仅应用于治疗失眠的药物是（）

A: 佐匹克隆

B: 地西泮

C: 苯巴比妥

D: 氟西汀

答案：A

38.作用于DNA拓扑异构酶I的生物碱是

A: 来曲唑

B: 甲氨蝶呤

C: 羟喜树碱

D: 卡莫氟

答案：C

39.硫脲类抗甲状腺药的主要药理作用是()

A: 影响碘的摄取

B: 促进甲状腺素的释放

C: 抑制甲状腺素的合成

D: 干扰甲状腺素的作用

答案：C

40.阿哌沙班属于

A: 直接凝血酶抑制剂

B: 促凝血因子合成药

C: 维生素K拮抗剂

D: 凝血因子Xa抑制剂

答案：D

41.目前首选的口服减肥药是

A: 鲑降钙素

B: 奥利司他

C: 阿法骨化醇

D: 阿仑膦酸钠

答案：B

42.有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

A: 吡嗪酰胺

B: 乙胺丁醇

C：异烟肼

D：利福平

答案：C

43.肌内注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

A：7～12 分钟

B：10～25 分钟

C：4 小时

D：8 小时

答案：C

44.主要作用于 S 期的抗肿瘤药物是

A：烷化剂

B：长春碱类

C：抗代谢药

D：抗癌抗生素

答案：C

45.下列不属于抗肿瘤药的是

A：氟胞嘧啶

B：长春新碱

C：长春碱

D：三尖杉酯碱

答案：A

46.（2016 年真题）军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

A：头孢曲松

B：罗红霉素

C: 利奈唑胺

D: 头孢他啶

答案：B

47.患者，男性，46岁，经常头痛，头晕近8年。2天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压230／120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为202／120mmHg，且气急不能平卧，心率108次／分，早搏3次／分。两肺底有湿啰音。

A: 硫氰酸盐不超过50μg／ml，氰化物不超过2μmoL／ml

B: 硫氰酸盐不超过100μg／ml，氰化物不超过3μmol／ml

C: 硫氰酸盐不超过200μg／ml，氰化物不超过4μmol／ml

D: 硫氰酸盐不超过20μg／ml，氰化物不超过1μmol／ml

答案：B

48.华法林是消旋体，由S-华法林和R-华法林组成，二者的抗凝作用是

A: S-华法林的抗凝作用约是R-华法林的5倍

B: R-华法林的抗凝作用约是S-华法林的5倍

C: 二者抗凝作用关系不确定

D: 二者抗凝作用等效

答案：A

49.下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

A: 比马前列素

B: 噻吗洛尔

C: 阿托品

D: 毛果芸香碱

答案：C

50.属于ⅠB类抗心律失常药

A：胺碘酮

B：普萘洛尔

C：奎尼丁

D：利多卡因

答案：D

51.维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质的是

A：葡萄糖

B：果糖

C：维生素

D：脂肪乳

答案：A

52.属于雌激素受体断剂的抗肿瘤药是

A：他莫昔芬

B：阿那曲唑

C：丙酸睾酮

D：炔雌醇

答案：A

53.（2020年真题）可用于治疗绦虫感染的药物是

A：林旦

B：甲硝唑

C：氯硝柳胺

D：哌嗪

答案：C

54.关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误是

A: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

B: 两类药不能混入同一容器内

C: 可在身体同一部位给药

D: 治疗急性感染通常疗程不宜超过7～14日

答案：C

55.治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 红霉素

B: 克林霉素

C: 万古霉素

D: 克拉霉素

答案：B

56.洋地黄的主要适应症不包括

A: 阵发性室上性心动过速

B: 房室传导阻滞

C: 急、慢性充血性心力衰竭

D: 心房扑动

答案：B

57.不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

A: 提高蛋白质的分解代谢

B: 增高肝糖原

C: 升高血糖

D: 增强钙离子的吸收

答案：D

58.强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A：利多卡因

B：胺碘酮

C：普萘洛尔

D：苯妥英钠

答案：D

59.新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A：双环醇

B：甘草酸二铵注射剂

C：多烯磷脂酰胆碱注射剂

D：硫普罗宁注射剂

答案：C

60.根据时间药理学的理论，糖皮质激素隔日疗法的给药时间为()

A：晚上7时

B：上午7时

C：下午4时

D：凌晨4时

答案：B

61.泛昔洛韦口服后代谢为

A：西多福韦

B：阿昔洛韦

C：更昔洛韦

D：喷昔洛韦

答案：D

62.多柔比星与阿糖胞苷同用可()

A：导致坏死性结肠炎

B：易产生沉淀

C：增加心脏毒性

D：增加肝毒性

答案：A

63.呋布西林()

A：特别对铜绿假单胞菌有效

B：对G

C：对G

D：抗菌作用强，对厌氧菌有效

答案：A

64.属于多巴胺D2受体阻断剂的是

A：氯苯那敏

B：多潘立酮

C：奥美拉唑

D：法莫替丁

答案：B

65.不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

A：碳酸钙

B：三硅酸镁

C：氢氧化铝

D：铝碳酸镁

答案：D

66.司坦唑醇不具有的适应证为()

A：遗传性血管神经性水肿

B：慢性消耗性疾病

C：骨质疏松症

D：痤疮

答案：D

67.肥胖型二型糖尿病患者首选的降糖药

A：胰岛素皮下注射

B：静脉用胰岛素

C：二甲双胍

D：刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：C

68.格列本脲的作用特点是

A：提高靶细胞对胰岛素的敏感性

B：刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

C：增强胰岛素的作用

D：抑制胰高血糖素的分泌

答案：B

69.主要作用于有丝分裂M期，干扰微管蛋白合成的药物是

A：高三尖杉酯碱

B：氟尿嘧啶

C：顺铂

D：多柔比星

答案：A

70.（2016年真题）属于α1受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

A：普适秦

B：特拉唑嗪

C：酚妥拉明

D：度他雄胺

答案：B

71.属于β受体阻断剂的降低眼压药是()

A：曲伏前列素

B：甘露醇

C：噻吗洛尔

D：毛果芸香碱

答案：C

72.镇静作用明显的H

A：阿司咪唑

B：组胺

C：苯海拉明

D：西咪替丁

答案：C

73.口角炎患者用选用的维生素是

A：维生素B

B：维生素D

C：维生素B

D：维生素A

答案：C

74.青霉素可杀灭()

A：立克次体

B：病毒

C：支原体

D：螺旋体

答案：D

75.（2020年真题）痛风急性发作时首选的药物是

A：苯溴马隆

B：非布司他

C：秋水仙碱

D：碳酸氢钠

答案：C

76.抑制胃酸分泌作用最强的药物是

A：奥美拉唑

B：雷尼替丁

C：尼扎替丁

D：西咪替丁

答案：A

77.属于平衡型氨基酸制剂的是

A：赖氨酸注射液

B：复方氨基酸注射液（9AA）

C：复方氨基酸注射液（6AA）

D：复方氨基酸注射液（18AA）

答案：D

78.通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

A：卡托普利

B：维拉帕米

C：硝酸甘油

D：哌唑嗪

答案：A

79.以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A：电解质紊乱

B：伤口愈合缓慢

C：心律失常

D：诱发癫痫

答案：C

80.使用羟甲唑啉滴鼻液期间，可能发生的不良反应是

A：鼻黏膜充血

B：流泪

C：一过性针刺感

D：心率加快

答案：D

81.诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A：链霉素

B：异烟肼

C：利福平

D: 乙胺丁醇

答案：C

82.通过激动胰高血糖素样肽-1受体降低血糖的药物

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 艾塞那肽

D: 二甲双胍

答案：C

83.普芦卡必利为泻药的作用机制是

A: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

B: 选择性、高亲和力的5-HT4受体激动剂，可通过5-HT4受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

C: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

D: 通过激活CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内cGMP可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

答案：B

84.治疗阴道滴虫病的首选药是()。

A: 吡喹酮

B: 甲硝唑

C: 噻嘧啶

D: 阿苯达唑

答案：B

85.在体内消除缓慢，有蓄积性的药物是

A：利多卡因

B：哌替啶

C：阿托品

D：洋地黄毒苷

答案：D

86.不干扰血小板因子Ⅳ和血小板，致血小板减少症风险低，血浆半衰期21小时，极少引起出血的抗凝血药是()。

A：依诺肝素

B：阿哌沙班

C：水蛭素

D：磺达肝葵钠

答案：D

87.羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌内注射次数

A：2次

B：1次

C：4次

D：3次

答案：B

88.属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()。

A：噻吗洛尔

B：毛果芸香碱

C：乙酰唑胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/487121022052010024