北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿骨科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

Ⅰ　D.骨盆骨折合并尿道断裂

E.骨盆骨折合并膀胱损伤

3、单项选择题：Salter 截骨术适合于（　）。A.小于 18 个月

B.18 个月～6 岁

C.6～12 岁

D.成人

E.所有患者

4、单项选择题：患儿，8 岁，据 X 线片诊断桡骨远端青枝骨折，有背侧成角，正确的处理是（　）。A.药物治疗

B.手法复位，石膏托外固定

C.手术复位内固定

D.不予处理

E.卧床 2 周

5、单项选择题：6 岁以上儿童先天性髋关节脱位的手术方法，不宜采用（　）。A.股骨短缩截骨术

B.髋臼成形术

C.股骨旋转截骨术

D.骨盆内移截骨术

E.Salter 骨盆旋转截骨术

6、单项选择题：地震现场，某人左腰部及下肢被倒塌砖墙压住，6 小时后救出，4 小时后送到医院。主诉口渴，尿少，呈暗红色。检查：脉搏 120 次 / 分，血压 11.7/9.3kPa，左下肢明显肿胀，皮肤有散在淤血斑及水疱，足背动脉较健侧较弱，趾端发凉，无骨折征。拟诊断为（　）。A.创Ⅰ　E.CT 检查

9、单项选择题：男，6 岁，右股骨急性骨髓炎，经抗炎治疗，病期 40d，体温趋于平稳 2 周，最适合治疗（　）。A.继续选用有效抗生素

B.患肢制动，观察经过

C.切开引流留管局部应用抗生素

D.死骨剔除蝶形手术

E.死骨剔除肌瓣充填手术

10、单项选择题：股骨干骨转移瘤合并病理骨折时，为减轻骨折的症状，应采用（　）。A.皮牵引

B.患肢抬高，置下肢外展屈曲位

C.髓内针固定

D.石膏外固定

E.夹板固定

11、单项选择题:为了测定小儿麻痹症后遗症患者的臀中肌肌力,下列哪项试验是最正确的(　　)。A.Caenslen征

B.Thomas 征

C.Shoemaker 征

D.Trendelenburg 征

E.Dugas 征

12、单项选择题：5 岁男孩，驼背，疼痛 5 个月，消瘦贫血，无神经症状，经检查双肺浸润性结核，6～8 胸椎结核，伴椎旁脓肿，血沉 112mm/h，在支持疗法及全身抗结核治疗同时应首选（　　）。A.病灶清除术

B.石膏背心

C.卧硬板床

D.冷脓肿穿刺

E.矫正驼背

13、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼外展角应为（　　）。A.40～50

B.大于 60

C.小于 40

D.40～60

E.30～40

14、单项选择题：45 岁男性，车祸 3 小时入院，诊断为骨盆骨折，左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折，首先应密切观察哪种并发症（　　）。A.休克

B.泌尿系感染

C.创口感染

D.疼痛

E.坠积性肺炎

15、单项选择题:男性，10 岁，外伤后左膝附近肿胀，剧痛，体温达 39～40℃，经大剂量抗生素应用 3 天，效果不明显。体检：急性病容，左大腿下段及膝关节肿胀明显，发红，皮温高，压痛明显，左膝活动受限，X 线平片骨质未见破坏，血白细胞 19×109/L，中性 89%，最佳处理（　　）。A.全身支持疗法

B.反复关节穿刺及腔内抗生素注射

C.股骨下端切开引流

D.止痛药物应用

E.血液细菌培养

16、单项选择题：在脊髓灰质炎后遗症的临床表现中，下列哪项是错误的（　　）。A.皮肤感觉正常

B.肌肉呈不同程度的弛缓性瘫痪

C.走路不稳，影响功能

D.X 线片骨骼变细，下肢不等长

E.行走时呈剪刀式步态

17、单项选择题：对疑为恶性的骨肿瘤采用切开活检术时，应注意的是（　　）。A.对于肢体肿瘤的活检应采用横行切口

B.加压包扎伤口，不必仔细止血

C.为更好地显露肿瘤，手术不必局限于一个间室

D.确定手术方案时，必须考虑到最终手术时能够将活检部位的组织切除

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488030075015006063