

2024 年河南省安阳县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整版（典优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于链激酶的叙述不正确的是
- A: 对各种早期栓塞有溶解作用
 - B: 链球菌感染可增强其作用
 - C: 是 β 溶血链球菌产生的一种蛋白质
 - D: 可促使纤溶酶原激活形成纤溶酶

答案：B

2. 支气管哮喘急性发作时宜使用的药物是（）
- A: 吸入用布地奈德混悬液
 - B: 孟鲁司特钠咀嚼片
 - C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
 - D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

3. 全身性红斑狼疮宜用
- A: 地塞米松
 - B: 泼尼松
 - C: 倍他米松
 - D: 氢化可的松

答案：B

4. 甲状腺危象选用（）

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：A

5. 与 DNA 结合，进而抑制 DNA 和 RNA 合成

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 氟尿嘧啶
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：D

6. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 胍乙啶
- C: 肼屈嗪
- D: 普萘洛尔

答案：B

7. 仅作为吸入给药的平喘药是()

- A: 沙丁胺醇
- B: 沙美特罗
- C: 布地奈德
- D: 特布他林

答案：B

8. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 吉西他滨
- B: 泼尼松
- C: 奥沙利铂
- D: 顺铂

答案：D

9. 他汀类所引起的肝损害特点不包括

- A: 当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍以上，需要减量或停药
- B: 肝毒性与剂量无关
- C: 所有他汀类药物都产生肝毒性
- D: 使用辛伐他汀当转氨酶升高至正常值上限的 3 倍需停药

答案：B

10. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

- A: 地屈孕酮
- B: 依普黄酮
- C: 他莫昔芬
- D: 戊酸雌二醇

答案：A

11. 患者，女，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现皮疹或皮肤瘙痒及白细胞减少的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 左甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 地塞米松

答案：A

12. 早产儿、新生儿出血宜选用 ()

- A: 叶酸
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 维生素 K

答案：D

13. 螺内酯临床常用于

- A: 醛固酮升高引起的水肿
- B: 脑水肿
- C: 尿崩症
- D: 急性肾功能衰竭

答案：A

14. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

- A: 氯化钠
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钾
- D: 氯化钙

答案：A

15. 可选择性抑制 MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

- A: 司来吉兰
- B: 左旋多巴
- C: 苯海索
- D: 恩他卡朋

答案：A

16. 为阳离子表面活性剂，有广谱杀菌、抑菌作用，吸附在细菌胞壁后，改变其表面结构和渗透平衡，使胞浆内成分渗漏，高浓度时可使胞浆凝固，抑制细胞壁修复而呈杀菌作用，且不易产生耐药性的消毒防腐药是

- A: 聚维酮碘
- B: 氯己定
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

答案：B

17. 高效抑菌药是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氯霉素
- C: 头孢菌素
- D: 异烟肼

答案：A

18. 氨曲南的作用特点不包括

- A: 可用于治疗脑膜炎
- B: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏
- C: 血浆半衰期较短
- D: 时间依赖性抗菌药物

答案：A

19. 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是()。

- A: 眼底检查者
- B: 虹膜睫状体炎患者
- C: 睫状肌麻痹患者

D: 青光眼患者

答案：D

20. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

A: 血红蛋白

B: 网织红细胞计数

C: 血清铁蛋白

D: 巨核细胞计数

答案：D

21. (2017 年真题) 关于镇咳药作用强度的比较, 正确的是 ()

A: 苯丙哌林 > 喷托维林 > 可待因

B: 苯丙哌林 > 可待因 > 喷托维林

C: 可待因 > 苯丙哌林 > 喷托维林

D: 喷托维林 > 苯丙哌林 > 可待因

答案：B

22. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 己烯雌酚

B: 氟他胺

C: 他莫昔芬

D: 托瑞米芬

答案：B

23. 下述药物中，不属于促动力药的是

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 氢氧化铝

D: 甲氧氯普胺

答案: C

24. 氨茶碱的主要平喘机制为

A: 直接舒张支气管

B: 松弛气道平滑肌

C: 抑制腺苷酸环化酶

D: 激活鸟苷酸环化酶

答案: B

25. 氟西汀的作用机制是

A: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解

B: 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取

C: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

D: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

答案: C

26. 下列药物按作用机制分类，属于抗纤溶药的是

A: 凝血酶

B: 维生素 K

C: 酚磺乙胺

D: 氨甲苯酸

答案: D

27. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

A: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

- B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg
- 答案：D**

28. 特布他林的平喘作用维持时间是

- A: 10~12 小时
- B: 4~6 小时
- C: 3~5 分钟
- D: 10~20 分钟

答案：B

29. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

- A: 胆固醇吸收抑制剂
- B: 胆汁酸结合树脂
- C: 抗氧化剂
- D: 他汀类药物

答案：D

30. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 双嘧达莫
- B: 氯吡格雷
- C: 阿替普酶
- D: 阿司匹林

答案：B

31. 服用磺胺多辛的方式不正确的是

- A: 餐后 2 小时服用
- B: 餐中服用
- C: 餐前 1 小时服用
- D: 每次服药时饮水约 240ml

答案：B

32. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

- A: 碳酸钙
- B: 三硅酸镁
- C: 氢氧化铝
- D: 氢氧化镁

答案：A

33. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 联苯苄唑
- B: 特比萘芬
- C: 阿莫罗芬
- D: 制霉菌素

答案：B

34. （2020 年真题）为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

35. 关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

- A: 口服吸收好，组织药物浓度高
- B: 与其他药物有交叉耐药性
- C: 不良反应少
- D: 抗菌谱广，抗菌力强

答案：B

36. 治疗厌氧菌引起的严重感染

- A: 红霉素
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：B

37. 使用氟尿嘧啶 4~6h 前使用哪种药物可以起到协同作用

- A: 西咪替丁
- B: 阿司匹林
- C: 别嘌醇
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

38. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

- A: 腺嘌呤
- B: 糖皮质激素
- C: 利可君
- D: 利伐沙班

答案：D

39. 多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- C: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：B

40. 不溶于水，微溶于有机溶剂的是

- A: 博来霉素
- B: 替尼泊苷
- C: 依托泊苷
- D: 羟喜树碱

答案：D

41. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答。

- A: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- B: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- C: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

答案：C

42. （2020 年真题）餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 米索前列醇
- B: 兰索拉唑

C: 枸橼酸铋钾

D: 铝碳酸镁

答案: D

43. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

A: 沙丁胺醇

B: 茶碱

C: 沙美特罗

D: 孟鲁司特

答案: D

44. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是

A: 十一酸睾酮

B: 哌唑嗪

C: 非那雄胺

D: 普适泰

答案: D

45. 适用于需要尽快解决急性症状的抗前列腺增生症药物是

A: 丙酸睾酮

B: 非那雄胺

C: 西地那非

D: 坦洛新

答案: D

46. 关于氨基己酸的描述，错误的是

A: 在血中以游离状态存在

- B: 不与血浆蛋白结合
- C: 在体内维持时间短，不代谢
- D: 口服吸收缓慢

答案：D

47. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

- A: 依那普利
- B: 硝酸甘油
- C: 氨氯地平
- D: 哌唑嗪

答案：D

48. 属于抗流感病毒药的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 司他夫定
- C: 奥司他韦
- D: 恩替卡韦

答案：C

49. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 美托洛尔
- B: 双氯芬酸
- C: 氢氯噻嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：C

50. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 奥司他韦
- D: 干扰素

答案：B

51. 乳果糖禁用于

- A: 妊娠期
- B: 肝性脑病
- C: 急腹症
- D: 哺乳期

答案：C

52. 患者，男，56 岁。有糖尿病病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl。

- A: 静脉注射
- B: 皮下注射
- C: 舌下含服
- D: 口服

答案：A

53. 严重心衰首剂可出现低血压反应的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平

C: 硝酸甘油

D: 卡托普利

答案：D

54. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

A: 氯沙坦

B: 卡托普利

C: 硝苯地平

D: 普萘洛尔

答案：A

55. 耐青霉素酶青霉素类的是

A: 青霉素 V

B: 氨苄西林

C: 哌拉西林

D: 苯唑西林

答案：D

56. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 1 周

B: 3 天

C: 3 周

D: 4 天

答案：B

57. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 酰胺醇类(氯霉素)
- B: 四环素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 林可霉素类

答案：C

58. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能够出现寒战、咽痛、心率加快等症状，其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应，这种反应称为

- A: 金鸡纳反应
- B: 吉海反应
- C: 青霉素脑病
- D: 瑞夷综合征

答案：B

59. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是 ()。

- A: 干咳
- B: 低血糖
- C: 光过敏
- D: 水肿

答案：A

60. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 对室上性和室性心动过速都有效

- B: 特异性针对房颤有效
- C: 只对室上性心动过速有效
- D: 只对室性心动过速有效

答案：A

61. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

- A: 阿米洛利
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

62. 通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 维拉帕米
- D: 硝酸甘油

答案：A

63. (2019 年真题) 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是（）

- A: 碳酸氢钠
- B: 非布司他
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：C

64. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- B: 一次 50~100 μg ，一日 2 次
- C: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次
- D: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

答案：D

65. 下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：C

66. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 多西环素

答案：A

67. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 尼群地平

答案：B

68. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

- A: 可以松弛前列腺平滑肌
- B: 减小增大的前列腺体积
- C: 无心血管不良反应
- D: 降低血清前列腺特异抗原（PSA）水平

答案：A

69. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 很少发生耐药
- B: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌
- C: 抑酸作用强大，持续时间长
- D: 停药后复发率低

答案：B

70. 关于唑吡坦作用特点的说法，错误的是()

- A: 唑吡坦具有镇静催眠作用，抗焦虑作用
- B: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- C: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- D: 唑吡坦属于 γ -氨基丁酸 A 型受体激动剂

答案：A

71. 对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

- A: 头孢唑林

- B: 头孢噻吩
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢拉定

答案：C

72. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法, 正确的是()

- A: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗
- B: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- C: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- D: 孟鲁司特钠起效快, 适用于哮喘急性发作

答案：C

73. 对高肾素型高血压病有特效的是

- A: 依那普利
- B: 肼屈嗪
- C: 卡托普利
- D: 尼群地平

答案：C

74. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

- A: 导致坏死性结肠炎
- B: 增加心脏毒性
- C: 增加肝毒性
- D: 易产生沉淀

答案：D

75. 患者女, 32 岁, 孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血, 该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

A: 维生素 B12

B: 维生素 D

C: 叶酸

D: 维生素 K

答案：D

76. 考来替泊的降脂作用机制主要是

A: 抑制脂肪分解

B: 阻滞胆汁酸在肠道的重吸收

C: 增加脂蛋白酶活性

D: 抑制细胞对 LDL 的修饰

答案：B

77. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 达托霉素

B: 氨基糖苷类

C: 氟喹诺酮类

D: 阿奇霉素

答案：D

78. 阿斯综合征患者禁用

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 氨己烯酸

D: 丙戊酸钠

答案：A

79. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 更昔洛韦
- B: 氯霉素
- C: 四环素可的松
- D: 利巴韦林

答案：A

80. 氯霉素属于
- A: 氨基糖苷类
 - B: 酰胺醇类
 - C: 四环素类
 - D: β -内酰胺类

答案：B

81. 广谱调血脂药物是
- A: 吉非罗齐
 - B: 考来烯胺
 - C: 烟酸
 - D: 氯贝丁酯

答案：C

82. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 超快代谢型患者
- B: 慢代谢型患者
- C: 快代谢型患者
- D: 中间代谢型患者

答案：B

83. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

- A: 9%硼酸冰片滴耳液
- B: 四环素
- C: 曲伏前列素
- D: 1%碘甘油

答案：A

84. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 阿莫罗芬
- D: 环吡酮胺

答案：B

85. (2017 年真题) 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 达比加群酯
- C: 氨甲环酸
- D: 华法林

答案：D

86. 治疗血吸虫病宜选用

- A: 吡喹酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 甲硝唑
- D: 氯喹

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/488043077044007022>