

泌尿外科专科考试模拟题及参考答案

一、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

1、下列哪种损伤患者，必须密切观察尿量和尿色，以防发生急性肾衰（ ）

- A、火器伤
- B、切割伤
- C、剥脱伤
- D、裂伤
- E、挤压伤

正确答案：E

2、保列治药物治疗前列腺增生的机制是

- A、抑制 H₂ 受体
- B、抑制α受体
- C、抑制 B 受体
- D、抑制雄性激素受体
- E、抑制 5α还原酶

正确答案：E

3、肾癌主要转移途径（ ）

- A、直接转移
- B、血行转移
- C、沿肾静脉以癌栓形式转移
- D、淋巴转移

正确答案：C

4、睾丸癌最常见的是

- A、腺癌
- B、鳞癌
- C、精原细胞癌
- D、透明细胞癌

正确答案：C

5、以下哪项是前列腺增生的临床症状

- A、发热
- B、尿频排尿困难
- C、高血压
- D、肾绞痛

正确答案：B

6、以下哪项是前列腺增生的最初的症状

- A、肾积水
- B、进行性排尿困难
- C、血尿
- D、尿频

正确答案：D

7、赵先生，44 岁，肾绞痛 2 小时，下列哪种止痛措施最好

- A、阿托品穴位注射
- B、肾区热敷
- C、阿托品+哌替啶肌注
- D、针刺

正确答案：C

8、输尿管结石患者绞痛发作时，最重要的处理方法是（ ）

- A、大量饮水
- B、给予解痉药物
- C、卧床休息
- D、应用抗菌药
- E、跳跃运动.

正确答案：B

9、测量尿比重可了解

- A、肾小球滤过功能
- B、肾小管的分泌功能
- C、肾脏的浓缩功能
- D、肾小管重吸收功能
- E、肾小管酸碱平衡功能

正确答案：C

10、男性泌尿系损伤最常见的部位是（ ）

- A、肾
- B、膀胱
- C、前尿道
- D、输尿管
- E、后尿道

正确答案：C

11、患者，男性， 30 岁，因尿急、尿痛、终末血尿而就诊，经检查确诊为肾结核。该患者原发病灶一般发生在（ ）

- A、肺
- B、肾
- C、输尿管
- D、尿道
- E、膀胱

正确答案：A

12、男，50 岁，间歇无痛性血尿 3 个月，经检查诊断为左侧肾癌，该病人出现血尿表明

- A、肾癌已侵入肾盏，肾盂
- B、肾癌已侵入肾门
- C、早期肾癌
- D、晚期肾癌

正确答案：A

13、肾结石的手术治疗不包括

- A、经皮肾镜取石术
- B、输尿管镜取石术
- C、开放性手术
- D、电切镜碎石

正确答案：D

14、为防止双 J 管移位的措施错误的是

- A、若腰部疼痛时，可适当的捶打腰部
- B、避免提重物
- C、避免突然的下蹲
- D、避免伸展四肢

正确答案：A

15、目前是最为肯定的膀胱癌致病危险因素

- A、辛辣食品
- B、尿路感染
- C、熬夜
- D、喝酒
- E、吸烟

正确答案：E

16、泌尿系最常见的肿瘤是

- A、肾癌
- B、前列腺癌
- C、肾盂癌
- D、输尿管癌
- E、膀胱癌

正确答案：B

17、肾切除术后预防急性肾功能衰竭应重点观察（ ）

- A、呼吸
- B、体温
- C、尿量
- D、神志

正确答案：C

18、下列不属于肾上腺的皮质层是

- A、圆状带
- B、球状带
- C、网状带
- D、束状带

正确答案：A

19、泌尿系统疾病的诊断中，错误的是（ ）

- A、肾绞痛后血尿，先考虑上尿路结石
- B、急性尿潴留伴有急迫尿意感，应考虑神经损伤病变
- C、骑跨伤出现尿道口滴血，应考虑前尿道损伤
- D、无痛性间接性血尿，应考虑肾脏肿瘤
- E、进行性顽固性膀胱刺激征，应考虑泌尿系结核

正确答案：B

20、病理改变在肾脏,但临床表现主要在膀胱的疾病是（ ）

- A、肾肿瘤
- B、肾结核
- C、肾盂肿瘤
- D、膀胱肿瘤

正确答案：B

21、患者，男性，68 岁，行前列腺摘除术后第 3 天，病人感觉下腹部剧烈疼痛，并有强烈尿意、肛门坠胀感，膀胱冲洗液不滴，引起尿液血色

明显加重，考虑病人出现了（ ）

- A、前列腺窝出血
- B、急性肠梗阻
- C、TUR 综合征
- D、膀胱痉挛
- E、尿失禁

正确答案：D

22、女性患者,45 岁,因左侧输尿管结石住院行“钬激光碎石+DJ 管置入术”,下列哪项不是 DJ 管护理的“三防”

- A、防拔管
- B、防移位
- C、防逆流
- D、防感染

正确答案：A

23、肾损伤非手术治疗的护理措施，以下错误的是

- A、注意观察血尿变化
- B、注意腹痛变化
- C、定时观察生命体征
- D、鼓励患者早期起床活动
- E、监测体温变化

正确答案：D

24、在进行体外冲击波治疗后，结石位于肾下盏碎石后应采取体位

- A、头低脚高位
- B、俯卧位
- C、头高脚低位
- D、侧卧位

正确答案：A

25、柯兴综合征是由哪种激素代谢异常引起的

- A、多巴胺
- B、醛固酮
- C、肾上腺素
- D、皮质醇

正确答案：D

26、输尿管结石易滞留或嵌顿的输尿管三个狭窄部位不包括

- A、肾盂输尿管交界处
- B、输尿管、膀胱交界处
- C、尿道舟状窝
- D、输尿管越过髂血管处

正确答案：C

27、服用强心苷类药物的病人，心率低于多少次时应停用（ ）

- A、40 次/分
- B、50 次/分
- C、60 次/分
- D、30 次/分

正确答案：C

28、前列腺癌手术时应切除

- A、外周区
- B、移行区
- C、中央区
- D、整个腺体

正确答案：D

29、肾结核化疗用药护理错误的是（ ）

- A、双肾结核可服用磺胺类药物
- B、按时、足量服药
- C、遵嘱使用药物保护肝脏
- D、定期检查肝功能
- E、足量、足疗程服药

正确答案：A

30、腹腔镜下肾囊肿去顶开窗术术后常见并发症不包括

- A、尿道损伤
- B、高碳酸血症
- C、皮下气肿
- D、肾周血肿
- E、腹膜损伤、血管及肠管损伤

正确答案：A

31、正常成年人 24 小时尿量为

- A、800-1000ml
- B、600-800ml

- C、400-600ml
- D、1000-2000ml
- E、2000-3000ml

正确答案：D

32、影响尿路结石形成的因素不包括

- A、异物
- B、体质的强弱
- C、梗阻
- D、感染

正确答案：B

33、关于肾癌的描述，错误的是（ ）

- A、主要见于中老年人，男性多于女性
- B、临床典型表现为无痛性血尿
- C、早期可无症状
- D、起源于肾小球上皮细胞

正确答案：D

34、哪项不是嗜铬细胞瘤三联征

- A、出汗
- B、血尿
- C、头痛
- D、心悸

正确答案：B

35、反映肾功能的指标是（ ）

- A、血尿素氮
- B、凝血酶原时间
- C、黄疸指数
- D、中心静脉压
- E、3P 试验

正确答案：A

36、体外冲击波治疗前的护理不正确的是

- A、治疗中不得随便移动体位
- B、术前3天忌食产气食品
- C、取下身上的金属物质
- D、术晨不用禁食

正确答案：D

37、目前已明确的与前列腺增生密切相关的因素有

- A、吸烟
- B、年龄
- C、饮酒
- D、细菌感染

正确答案：B

38、正常人尿液的 PH 值为（ ）

- A、4.5-8.0
- B、4.5-7.5
- C、4.0-8.0
- D、3.5-6.5
- E、3.5-5.5

正确答案：B

39、睾丸癌术前的护理措施错误的是

- A、完善相关检查
- B、密切观察睾丸肿胀及阴囊坠胀、坠痛等情况
- C、应进食高蛋白、高维生素、高热量饮食，少运动
- D、做好心理护理

正确答案：C

40、下列关于睾丸肿瘤，正确的是

- A、多为良性生殖细胞瘤
- B、多因睾丸无痛性，进行性增大就诊
- C、非精原细胞癌多见
- D、多发生老年人

正确答案：B

41、禁忌作逆行肾盂造影的情况是

- A、尿潴留
- B、尿道狭窄
- C、排尿困难
- D、血尿
- E、尿失禁

正确答案：B

42、阴茎癌术后引流管的护理错误的是

- A、严格遵循无菌原则
- B、为避免影响活动，无需固定引流管
- C、保持引流管通畅
- D、密切观察引流液的量、色、性状

正确答案：B

43、肾癌发生于肾小管的

- A、生殖细胞
- B、上皮细胞
- C、体细胞
- D、表皮细胞

正确答案：B

44、患者，男性，34岁，终末肉眼血尿。提示病变部位可能在（ ）

- A、后尿道、膀胱颈或膀胱三角区
- B、前尿道
- C、肾
- D、膀胱前壁
- E、输尿管

正确答案：A

45、肾结石病人的主要症状

- A、尿频、尿急
- B、活动后镜下血尿
- C、排尿困难
- D、尿失禁

正确答案：B

46、尿道球部损伤常出现（ ）

- A、终末血尿
- B、尿道口滴血
- C、尿频
- D、全程血尿
- E、尿痛

正确答案：B

47、下列哪项不是经皮肾肾盂镜取石术的并发症

- A、感染
- B、尿外渗

C、性功能障碍

D、出血

正确答案：C

48、物理降温后，需多长时间再次测量体温以进行观察（ ）

A、10 分钟

B、15 分钟

C、30 分钟

D、20 分钟

正确答案：C

49、提示病变在后尿道、膀胱颈部或膀胱三角区的是（ ）

A、第 1 杯尿液异常

B、第 2 杯尿液异常

C、后 2 杯尿液异常

D、3 杯尿液均异常

E、第 3 杯尿液异常

正确答案：E

50、尿道断裂术后，预防尿道狭窄最主要的措施是（ ）

A、定期尿道扩张

B、多喝水、勤排尿

C、局部理疗

D、留置导尿管 7-10 天

E、预防感染

正确答案：A

51、可作为肿瘤定性诊断的检查是

A、B 超

B、病理检查

C、CT

D、X 线检查

正确答案：B

52、在进行体外冲击波治疗后，结石位于中、上肾盏、肾盂、输尿管上段者碎石后应采取体位

A、头高脚低位

B、侧卧位

C、头低脚高位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488047105055006033>