专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省龙海市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库参考答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.属于脂溶性维生素的是

A：维生素B12

B：维生素

C：维生素B1

D：维生素

答案：D

2.三环类抗抑郁药的致死量通常高于

A：2.5g

B：2g

C：1g

D：1.5g

答案：B

3.对乙酰氨基酚归属

A：D级

B：B级

C：X级

D：C级

答案：B

4.排便在一日内超过3次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

A：谷维素

B：天麻素

C：磷霉素

D：黄连素

答案：D

5.患者，女，34岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示TSH增高，TT4降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

A：若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始

B：推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片

C：治疗初期每4～6周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量

D：左甲状腺素钠片应于早餐前1小时，空腹将1日剂量一次性用水送服

答案：B

6.铁剂联用维生素C

A：作用不同的靶点

B：促进机体的利用

C：延缓或降低抗药性

D：协同作用

答案：B

7.避免使用g，mg，μg等专业计量单位，是针对

A：交代用药注意事项

B：交代用药途径及用药方法

C：交代药品贮存条件与方法

D：交代药物的用量

答案：D

8.尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A：二巯丙醇

B：依地酸钙钠

C：二巯丁二钠

D：青霉胺

答案：B

9.(治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是（）

A：碳酸镁

B：硫糖铝

C：米索前列醇

D：雷贝拉唑

答案：C

10.药品不良事件简写为

A：ADE

B：ADR

C：AE

D：DUI

答案：A

11.药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 减少不良反应

B: 非竞争性拮抗作用

C: 敏感化作用

D: 竞争性拮抗作用

答案：C

12.服用保泰松、水杨酸钠可呈现

A: 黄色

B: 橘红至红色

C: 红至黑色

D: 白陶土便

答案：C

13.（2019年真题）患者，女，35岁，复杂部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A: 视物模糊

B: 牙龈增生

C: 共济失调

D: 低血糖

答案：D

14.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A: 每次10ml，每日三次，餐前给药

B: 30ml，晚餐时一次服用

C: 30ml，早餐时一次服用

D: 每次10ml，每日三次，餐后给药

答案：C

15.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

C: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

16.可引起A/G比值＜1的是

A: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

B: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

C: 各种原因脱水所致的血液浓缩

D: 摄入不足、消化不良时

答案：B

17.服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

A: 格列本脲

B: 泼尼松

C: 维生素

D: 维生素

答案：A

18.《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

A: 10℃

B: 20℃

C: 15℃

D: 4℃

答案：B

19.患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: 关节痛

B: 皮疹

C: 胃肠道反应

D: 低血糖

答案：C

20.血管紧张素Ⅱ受体阻断剂

A: 依那普利

B: 氨氯地平

C: 氢氯噻嗪

D: 缬沙坦

答案：D

21.患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 羧甲司坦

B: 可待因

C: 喷托维林

D: 右美沙芬

答案：B

22.处方审核“四查十对”中“四查”不包括

A: 处方

B: 药品

C: 配伍禁忌

D: 药品成本

答案：D

23.以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

A: 胃蛋白酶?

B: 凝血酶?

C: 胰蛋白酶?

D: 门冬酰胺酶?

答案：C

24.阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

A: 有机硫类

B: 去甲肾上腺素

C：阿托品

D：苯妥英钠

答案：C

25.只能采用注射方式给药的药物是

A：维生素D

B：铁剂

C：磷结合剂

D：促红细胞生成素

答案：D

26.（2018年真题）老年女性,心功能衰竭,服用呋塞米及螺内酯片,正确的使用方法是（）

A：清晨服用

B：应同时碱化尿液

C：舌下含服

D：用温水调服

答案：A

27.代谢性或呼吸性碱中毒

A：尿酸碱度增高

B：尿胆红素检测阳性

C：尿蛋白检测阳性

D：尿酸碱度降低

答案：A

28.采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

A: 冷性荨麻疹

B: 幼小荨麻疹

C: 热性荨麻疹

D: 人工荨麻疹

答案：D

29.严重肝病患者的尿液常见

A: 尿酸盐结晶

B: 酪氨酸和亮氨酸结晶

C: 草酸盐结晶

D: 磷酸盐结晶

答案：B

30.外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

A: 庆大霉素

B: 甲硝唑

C: 制霉菌素

D: 林可霉素

答案：C

31.不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

A: 管理漏洞

B: 病例数目少

C: 考察不全面

D: 观察时间短

答案：D

32.以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

A: 高脂血症

B: 高血压

C: 肾病综合征

D: 急性胰腺炎

答案：D

33.老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

A: 数字评分法

B: Bayesian反馈法

C: Beers标准

D: CTP评分标准

答案：C

34.氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

A: 药动学相互作用

B: 药物制剂因素

C: 药理作用

D: 药物的使用

答案：A

35.新生儿的相对总体液量比成人高，体液占体重

A: 75%~80%

B: 75%~85%

C: 70%~80%

D: 72%~80%

答案：A

36.患者男,34岁因糖尿病酮症酸中毒入院,需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物,应选用的药物是（）

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 低精蛋白锌胰岛素

D: 门冬胰岛素

答案：B

37.某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

A: 缺血性脑卒中

B: 脑出血

C: 短暂性脑缺血发作

D: 脑血栓形成

答案：B

38.属于抗胆碱药的是

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 恩托卡朋

答案：C

39.可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

A：食盐中的氯化钠

B：茶叶中的鞣酸

C：食醋中的醋酸

D：酒中的乙醇

答案：D

40.噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

A：支气管痉挛

B：血尿酸升高

C：直立性低血压

D：足踝部水肿

答案：B

41.导致13万多例横纹肌溶解症患者的是

A：阿托伐他汀

B：罗非昔布

C：己烯雌酚

D：加替沙星

答案：A

42.口服吐根糖浆催吐用于解救

A：巴比妥中毒

B：丙咪嗪中毒

C：磷化锌中毒

D：三唑仑中毒

答案：B

43.常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

A: 链霉素

B: 妥布霉素

C: 奈替米星

D: 新霉素

答案：D

44.患者女58岁，有2型糖尿病史，因头疼、头晕就诊，体征和实验室检查，餐前血糖7.8mmoL/L，餐后血糖11.2mmoL/L，糖化血红蛋白8.8%，血压166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h，推荐在降糖的基础上，合并选用

A: 氢氯塞嗪

B: 赖诺普利

C: 特拉唑嗪

D: 二甲双胍

答案：B

45.具有缩瞳和降低眼压的拟M胆碱药是

A: 毛果芸香碱

B: 拉坦前列素

C: 噻吗洛尔

D: 溴莫尼定

答案：A

46.“制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都需要参考循证医学的研究结果”表明循证医学实践能够

A：改变降脂治疗观念

B：有助于个体化给药

C：有利于诊断特殊疾患

D：列为医药卫生行政决策的依据

答案：D

47.V级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的

A：E级

B：C级

C：D级

D：B级

答案：C

48.患者，女，16岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为37．4℃，确诊为尿路感染。

A：磺胺甲噁唑一甲氧苄啶

B：阿莫西林

C：头孢噻肟

D：诺氟沙星

答案：D

49.（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A：二巯丙醇

B：维生素K

C：亚甲蓝

D：纳洛酮

答案：D

50.高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

A：依那普利

B：美托洛尔

C：氢氯噻嗪

D：维拉帕米

答案：B

51.患者，女，32岁，妊娠20周。1天前发热，体温39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

A：金刚烷胺片

B：利巴韦林片

C：阿昔洛韦片

D：奥司他韦胶囊

答案：D

52.可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素K减少的抗菌药物是

A：美罗培南

B: 头孢唑林

C: 青霉素

D: 头孢哌酮

答案：D

53.下列药品中易发生水解反应的是

A: 盐酸氯丙嗪

B: 头孢氨苄

C: 肾上腺素

D: 维生素

答案：B

54.患者，男，48岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片0.3gqd、利福平胶囊0.6gqd、乙胺丁醇片1.0gqd、吡嗪酰胺片1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

A: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

B: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

C: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能

D: 患者治疗期间应避免服用维生素B6

答案：A

55.成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 3.1～5.7mmol/L

B: 1.03～2.07mmol/L

C: 0.56～1.70mmol/L

D: 2.1～3.1mmol/L

答案：D

56.药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务的重要人群是

A：住院患者

B：社区患者

C：门诊患者

D：过敏体质者

答案：D

57.血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

A：>90g／L

B：30～60g/L

C：60～90g/L

D：<30g／L

答案：D

58.采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A：1.5～2.0

B：2.0～3.0

C：0.8～1.5

D：3.0～4.0

答案：B

59.药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A: 出版或更新的频率

B: 检索路径及费用

C: 索引的完备程度

D: 引用参考文献的质量

答案：D

60.在药物信息(MI)源中，文献资料的数量最大的是

A: 一级信息源

B: 互联网站

C: 二级信息源

D: 数据库

答案：A

61.氨氯地平片的适宜服用时间是

A: 早晨

B: 餐后

C: 餐前

D: 餐中

答案：A

62.COPD气流受限严重程度分级的方法是

A: HAS-BLED评分

B: CHA，DS，-VASe评分

C: FEV1占预计值%

D: CTP分级

答案：C

63.具有解热镇痛抗炎作用，镇痛作用较强、对胃肠道刺激性小的是

A：贝诺酯

B：阿司匹林

C：布洛芬

D：吲哚美辛

答案：C

64.COMT抑制剂

A：司来吉兰

B：苯海索

C：恩托卡朋

D：左旋多巴

答案：C

65.一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

A：急性铅中毒

B：急性汞中毒

C：香豆素类杀鼠药

D：磷化锌等杀鼠药

答案：A

66.影响氟胞嘧啶药效的PK/PD参数是

A：AUC0～24/MIC

B：%T>MI

C：Cmax/MIC

D：Cmax

答案：B

67.选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

A: 可待因

B: 阿司匹林

C: 硫酸氨基葡萄糖

D: 塞来昔布

答案：C

68.治疗水疱型足癣宜选用的药物是

A: 阿昔洛韦软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 维A酸乳膏

D: 复方苯甲酸酊

答案：D

69.肾上腺皮质激素治疗类风湿关节炎时，应注意的事项是

A: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

B: 服药期间不宜饮酒

C: 用药期间宜吃高蛋白食物

D: 服药期间不宜饮茶

答案：C

70.为保障用药安全，需要进行血药浓度监测的药物是

A: 青霉素

B: 罗红霉素

C: 地高辛

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

71.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: 胃溃疡?

B: 萎缩性胃炎?

C: 十二指肠溃疡?

D: 浅表性胃炎?

答案：C

72.属于H2受体拮抗剂的是（）

A: 铝碳酸镁

B: 埃索美拉唑

C: 多潘立酮

D: 法莫替丁

答案：D

73.作为多重用药的管理策略，“用药列表”的作用最可能见效的是

A: 减少联合用药的药物种类

B: 可判断治疗疾病的主要药物、辅助治疗药物，甚至是不必要的药物

C: 有助于指出需特别监测、必要时应停服的药物

D: 有助于指出不适合患者服用的、相互作用存在潜在危险性的药物

答案：A

74.下列是5位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

A: 成人静脉血13.0×109/L

B: 6个月～2岁婴儿11.0×109/L

C: 成人末梢血8.0×109/L

D: 成人静脉血4.3×109/L

答案：A

75.以下有关 γ-GT 检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断痛风

C: 诊断急慢性白血病

D: 诊断恶性贫血

答案：A

76.高血压合并消化性溃疡者宜不用

A: 甲基多巴

B: 硝苯地平

C: 利血平

D: 酚妥拉明

答案：C

77.患者，女，27岁，今日早起出现打喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕、咳嗽、少量咳痰症状，体温37.6℃，疑似普通感冒，前来药店购买药物。药师给予其购药指导，下述错误的是

A: 尽早服用阿莫西林胶囊

B: 应戴口罩，避免出入人多的公共场合，注意隔离

C: 适当补充水分、保持室内空气流通，避免继发细菌感染

D: 在症状出现后24小时内开始每天服用至少75mg醋酸锌或葡萄糖酸锌等含锌制剂

答案：A

78.通过抑菌圈直径判断细菌对不同药物的敏感性，而不以最小抑菌浓度（MIC）判断药物抗菌作用的药敏试验方法是

A: E-test 法

B：纸片扩散法

C：琼脂稀释法

D：肉汤稀释法

答案：B

79.帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

A：体位性低血压

B：神经精神障碍

C：姿势反射障碍

D：不安腿综合征

答案：C

80.以下属于急性肾盂肾炎表现的是（）

A：尿液常浑浊、有异味

B：可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

C：约30%可出现血尿

D：老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

答案：D

81.癫痫持续状态首选的药物是

A：卡马西平

B：拉莫三嗪

C：丙戊酸钠

D：地西泮

答案：D

82.单核细胞正常参考区间是

A：0.03～0.08

B：0～0.01

C：0.20～0.40

D：0.005～0.05

答案：A

83.适用于高血压伴前列腺增生症的高血压患者服用的药物是

A：氢氯噻嗪

B：多沙唑嗪

C：阿替洛尔

D：阿利吉仑

答案：B

84.选择的前提是

A：药物治疗的规范性

B：药物治疗的安全性

C：药物治疗的方便性

D：药物治疗的有效性

答案：B

85.苯二氮类药物过量或者中毒，特异性解救药物是

A：碘解磷定

B：氟马西尼

C：氟奋乃静

D：新斯的明

答案：B

86.黄体酮用于输尿管结石

A：超适应证用药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/488063021043007022