

抗菌药物临床合理应用

- 1.肾功能减退者不宜应用的抗菌药物为：D
- 2.二重感染的常见病原菌不包括:C.革兰阳性杆菌
- 3.甲类传染病鼠疫的病原菌是：C.鼠疫耶尔森菌
- 4.低温冰箱需每天观察并记录一次,要求温度变化不超过设定范围的：B。 $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- 5.对血液和无菌体液培养均应以急诊报告对待，实行三级报告制度,第一级报告应在初始培养出现阳性报告后： B
- 6.对 CAP 可选择的药物主要有哪三大类: C
- 7.机械通气相关性肺炎(VAP) 是指气管插管机械通气多长时间后并发的肺炎： D
- 8.流行性出血热发热期发生毛细血管损害，出现“三痛”，即：A
- 9.HFRS 最有效最基本的治疗措施是：B
- 10.狂犬病从临床发病到死亡的平均持续时间为：B
- 11.血管神经性水肿大多由哪种抗菌药物引起：B.青霉素
- 12.鼠疫是我国法定传染病中的：A。甲类传染病
- 13.鼠疫中最为严重的临床类型是:C.肺鼠疫
- 14.军团菌属临床首选治疗药物为：A.红霉素等大环内酯类
- 15.我国小儿肺炎病死数约占全世界：B.7%
- 16.在造血干细胞移植早期易发生的真菌感染主要是以什么感染为主：B.念珠菌
- 17.哌拉西林、头孢哌酮和头孢曲松在胆汁中的浓度均可达到血药浓度的：A。10 倍以上
- 18.成人化脓性关节炎最常见的致病菌是：B.金黄色葡萄球菌
- 19.为预防烧伤后出现导管感染,导管保留时间勿过长，经健康皮肤置管保留：C。7 天
- 20.成人及青少年 HIV/AIDS 病人的 HAART 一线推荐方案为：A.AZT(或 d4T)+3TC+EFV（或 NVP）
- 21.大环内酯类药物不包括：C。氯霉素
- 22.制霉菌素属于哪种类型的抗真菌药：A.多烯类
- 23.嗜肺军团菌的生存能力较强，在下水道污水中可存活：B.1 年
- 24.慢性鼻窦炎是指病程大于：C。3 个月
- 25.肾功能不全时乙胺丁醇半衰期延长至：D。10h
- 26.隧道感染指的是来自导管出口部位多长范围内,沿皮下隧道导管路径的触痛、红斑和硬结:C.2cm
- 27.H7N7 感染患者主要表现为：C。结膜炎
- 28.治疗炭疽的首选药物为:C。青霉素 G
- 29.成人伤寒患者首选的经验用药是:C。氟喹诺酮类
- 30.流行性腮腺炎患儿必须隔离至腮腺肿胀出现后几天或腮腺肿胀完全消退:C。7 天
- 32.败血症应首选：C.万古霉素
- 33.以下不属于 β 内酰胺类抗生素的是：B。林可霉素类
- 34.病人对药物过敏不宜使用头孢菌素时，针对葡萄球菌、链球菌可用：D。克林霉素
- 35.轻度腹腔感染是指腹膜炎较局限，发病时间在:B.12h 以内
- 36.盆腔感染或盆腔炎症性疾病最常见的是：B。子宫内膜炎
- 37.骨科人工植入物的感染最常见的致病菌是：B。厌氧菌
- 38.艾滋病患者发生弓形体感染首选的治疗方案为：D.乙胺嘧啶+磺胺嘧啶
39. HFRS 最有效最基本的治疗措施是：B。综合液体疗法

- 40.布鲁菌病传染源主要为病畜，以什么为主:C.羊
- 41.伤寒沙门菌感染过后约多少患者可成为携带者:A.3%
- 42.我国存在的新生隐球菌以哪一型最多见：B。A 型
- 43.关于血液标本的采集方法,以下说法错误的是：B.不推荐静脉血直接入瓶
- 44.关于肺结核病合并妊娠的化学治疗，以下说法错误的是：A。妊娠伴结核性脑膜炎者应积极治疗，不可轻易终止妊娠
- 45.感染性心内膜炎如不治疗，死亡率为:D.100%
- 46.导管相关性感染的病原菌多为皮肤常驻菌，最常见的病原菌为：D。凝固酶阴性葡萄球菌
- 47.围手术期预防性应用抗菌药物的具体适应证不包括：A.所有Ⅰ类清洁手术
- 48.麻疹前驱期末在口腔颊黏膜上可见到白色或灰白色斑点，多见于：A。第二磨牙对应的颊黏膜部位
- 49.百日咳患者应进行呼吸道隔离,至发病后：D。40 天
- 50.白喉首选的抗菌药物为:B。青霉素 G
- 51.以下属于氨基青霉素的是：A
- 52.关于脑膜炎奈瑟菌,以下说法错误的是：C
- 53.产碱杆菌在自然界分布广泛，以哪种细菌最为常见：B
- 54.志贺菌属中最常见且抗原结构最复杂的是：D
- 55.甲类传染病鼠疫的病原菌是:C
- 56.军团菌属临床首选治疗药物为：A
- 57.人类艾滋病病毒和肝炎病毒只能感染：A
- 58.以下属于侵袭性肺真菌病的主要临床特征的是:A
- 59.胆道系统感染病原菌最常见的是：B
- 60.霍乱患者静脉补液量宜根据失水程度决定，以第一个 24h 计,轻型者补液量为:C
- 61.由痢疾志贺菌引起的菌痢特别严重，死亡率可高达：B
- 62.关于涂片的急诊报告，以下说法错误的是:D
- 63.革兰阴性肠杆菌肺炎治疗疗程应达到：B
- 64.慢性心包炎的病程超过：C
- 65.造血干细胞移植后发生真菌感染的危险因素不包括：C
- 66.10 岁以下禽流感患儿金刚烷胺用药剂量为 5mg/（kg?d），每日总量不超过：B
- 67.麻疹前驱期末在口腔颊黏膜上可见到白色或灰白色斑点,多见于：A
- 68.HFRS 常用利尿药为呋塞米，可从少量开始，逐步加大剂量,每日总量以多少为宜:B
- 69.流脑可发生于任何年龄,但什么年龄段的婴幼儿发病率最高：B
- 70.间日疟、卵形疟的潜伏期约：C
- 71.卷曲霉素须采取的给药方法为：B
- 72.奈瑟菌属中主要的致病菌为：C
- 73.以下哪种类型的大肠埃希菌类似于志贺菌，感染后可引起肠炎症状，出现黏液脓血便：B
- 74.鼠疫中最为严重的临床类型是:C
- 75.沙雷菌属中的哪种细菌是引起肠道外感染的主要病原菌：D
- 76.感染性心内膜炎常出现肺栓塞症状，多是哪侧心腔脱落的栓子引起:B
- 77.水痘带状疱疹病毒引起的带状疱疹常常在造血干细胞移植多少天后出现：B
- 78.1 个月以内的新生儿发生急性细菌性脑膜炎，最常见的病原菌是：C
- 79.急性淋巴结炎首选的抗菌药物为：A
- 80.治疗艾滋病病人合并 PCP 首选的药物是：D

81.志贺菌属最适生长温度为:D
82.卫生部抗菌药物临床应用监测工作已于 2006 年 5 月正式开始,目前成员单位已扩大至:D
83.毛细支气管炎的发病高峰年龄段是:B
84.目前主张尽量用短疗程治疗 HAP (VAP), 良好的临床反应都出现在用药几天内:C
85.慢性肾功能不全并发肺结核病的发病率较通常人群高:A
86.血流感染的病原体和感染的部位有着密切的关系, 经泌尿系感染常见的病原菌有:B
87.发生 CRI/CRBSI 的危险性顺序正确的是:B
88.布鲁菌病传染源主要为病畜, 以什么为主:C
89.在我国流行的为血吸虫病为:A
90.地方性斑疹伤寒的主要传染源是:A
91.1987 年问世的第 1 个抗艾滋病病毒的药物是:C
92.药敏试验的初始质量控制应按 CLSI 要求连续 30 天测试该实验室用的抗生素各类的药敏试验,如 30 天内失控小于几次可转入常规药敏质量控制:A
93.肾功能减退时不宜选用的抗菌药物有:C
94.以下不属于 β 内酰胺类抗生素的是:B
95.对经验性治疗 48h 内即退热的患者, 为减少感染复发, 通常须待中性粒细胞回升至多少时停用抗菌药物:A
96.一般公认的最适宜的围手术期预防用抗菌药物是:B
97.以下哪种类型的肝炎经粪-口途径传播:D
98.脊髓灰质炎瘫痪期最常见的是:C
99.关于麻疹的流行情况,以下说法错误的是:D
100.流行性腮腺炎患儿必须隔离至腮腺肿胀出现后几天或腮腺肿胀完全消退:D
抗链球菌的首选药物是() B、 青霉素
创伤或手术后脑脓肿, 病原菌主要是() C、 金黄色葡萄球菌
急性胆囊炎首选的检查方法是() B、 B 超
伤寒最常见的两个并发症是() D、 肠出血和肠穿孔
心血管、头颈、胸腹壁、四肢软组织手术和骨科手术, 主要感染葡萄球菌,一般首选() A、 第 1 代头孢菌素
急性淋巴结炎多继发于四肢化脓性感染病灶,什么部位最常见() A、 腹股沟部位和腋窝
关于麻疹的流行情况,以下说法错误的是() D、 6 个月以下婴儿免疫力差, 很容易患麻疹
AAD 的症状一般出现在应用抗菌药物后() B、 5~10 天
最常见的尿路感染途径是() A、 上行感染
机械通气相关性肺炎(VAP)是指气管插管机械通气多长时间后并发的肺炎() D、 48~72h
临床以哪种类型的鼠疫最为多见() A、 腺鼠疫
流行性腮腺炎患儿必须隔离至腮腺肿胀出现后几天或腮腺肿胀完全消退()C、 7 天
百日咳的潜伏期一般为()C、 7~10 天
风疹患儿应隔离至出疹后() B、 5 天
霍乱患者静脉补液量宜根据失水程度决定, 以第一个 24h 计,轻型者补液量为() C、 3000~4000ml
以下哪种病毒只能感染人类() C、 带状疱疹病毒
由于利福平、丙硫异烟胺的致畸作用, 故禁止在妊娠几个月以内应用()B、 3 个月
霍乱在《中华人民共和国传染病防治法》中列为() A、 甲类传染病
引起硬脑膜外脓肿最常见的病原菌是()C、 金黄色葡萄球菌

丝虫病首选药物为 ()D、 海群生

新生儿破伤风解痉治疗首选() B、 地西洋

确定给药方案的三要素不包括 () C、 药效

最常见的一类机会致病真菌是 () A、 念珠菌

急性血源性骨髓炎是最常见的骨感染类型, 经常发生于 () A、 儿童

关于便标本采集, 以下说法错误的是 () A、 因粪便标本本身含很多细菌可不必用无菌容器

异烟肼口服吸收迅速,生物利用度可达 ()D、 90%

B 群链球菌感染首选() A、 青霉素或氨苄西林

新生儿破伤风潜伏期通常为() C、 7 天

流行性出血热是由汉坦病毒属某些病毒引起的以什么为传染源的自然疫源性疾病() D、 鼠类

疟疾病原治疗首选 () A、 氯喹

以下属于侵袭性肺真菌病的主要临床特征的是 () A、 肺孢子菌肺炎胸部 CT 片呈磨玻璃样肺间质浸润影, 伴有低氧血症

侵袭性曲霉菌感染以什么最常见 () B、 肺曲霉菌病

我国小儿肺炎病死数约占全世界 () B、 7%

脊髓灰质炎前驱期持续() B、 3~4 天

1. 抗菌药物的联合应用指征不包括: B

2. 关于脑膜炎奈瑟菌, 以下说法错误的是: C。人类和各类哺乳动物均是脑膜炎奈瑟菌的宿主

3. 引起瓣膜异常患者出现亚急性细菌性心内膜炎最常见的致病菌是:D

4. 克雷伯菌属是条件致病菌, 临床感染中以哪种细菌多见: B

5. 四环素类抗菌药物引起牙齿黄染及牙釉质发育不良,不可用于几岁以下患儿: C。8 岁

6. HAP 的定义为病人入院时未患有, 也不处于感染潜伏期, 而于入院多长时间后罹患的由病原菌引起的肺实质性炎症: C.48h

7. 急性胆囊炎首选的检查方法是: B。B 超

8. 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌首选: A。万古霉素或去甲万古霉素

9. 骨科人工植入物的早期感染多发生在术后: A.1 个月内

10. 危及流行性乙型脑炎病人生命的三种主要症状是: B.高热、抽搐及呼吸衰竭

11. 利福喷汀为长效利福霉素衍生物, 其消除半衰期约: C

12. 以下哪些药物不易保留于血浆: D

13. 白血病化疗后粒缺感染没有明确的临床表现, 什么常常为唯一的临床体征: C

14. 哌拉西林、头孢哌酮和头孢曲松在胆汁中的浓度均可达到血药浓度的: A

15. 肝移植后早期深部曲霉病较少发生,但一旦发生, 死亡率达: B

16. 盆腔感染或盆腔炎症性疾病最常见的是: A

17. MOF 病人的死亡率随着受累器官或系统数目的增多而升高, 二个器官功能衰竭死亡率为: B

18. 新型隐球菌脑膜炎抗真菌治疗应首选: A

19. 流行性出血热多尿期多发生于病程的: C

20. 我国哪种细菌引起的痢疾为常见: D

21. 头孢吡肟和头孢匹罗属于: D

22. 治疗衣原体感染的主要药物不包括: C

23. 我国存在的新生隐球菌以哪一型最多见: B

24. 以下不能通过血脑屏障的抗菌药物是:D
25. 以下属于Ⅲ类（污染）切口的是：D
26. 有厌氧菌参与的胆道感染多见于曾接受过胆道手术的患者，厌氧菌中以哪种细菌占多数：D
27. 急性胆囊炎首选的检查方法是:B
28. 自发性腹膜炎最常见的致病菌是：A
29. 艾滋病患者发生弓形体感染首选的治疗方案为：D
30. 胎传梅毒系母体的梅毒螺旋体通过胎盘进入胎儿体内,多发生于：D
31. 以下不属于β内酰胺类抗菌药物的是：D
32. 关于葡萄球菌的形态和培养特性，以下说法错误的是:C
33. 以下哪种病毒又称卫星病毒：D
34. 关于便标本采集，以下说法错误的是：A
35. 对革兰阳性球菌，以下哪种抗菌药物呈中度PAE：A
36. 出生20天后各年龄期小儿CAP的首位病原菌是：A
37. 关于肺结核病合并妊娠的化学治疗，以下说法错误的是：A
38. 特异性骨与关节感染主要是：C
39. 临床上艾滋病患者最常见的真菌感染是：B
40. 最有效的杀阿米巴包囊的药物是:B
41. 婴儿应用哪种抗菌药物后可引起颅内压增高：B
42. 在假单胞菌属的感染中铜绿假单胞菌的感染占：A
43. 嗜麦芽窄食单胞菌感染后，临床治疗首选：A
44. 治疗立克次体感染的首选药物是:A
45. 军团菌在MH-LH琼脂上可产生什么颜色的色素：C
46. 真菌感染最简单也是最有用的实验室诊断方法是：C
47. 念珠菌显色培养基主要用于念珠菌菌种鉴定,30~37℃培养48h,如果颜色变为绿色，说明是哪种念珠菌感染：A
48. 造血干细胞移植后最常见的并发症是:A
49. 一旦怀疑或诊断CMV感染，应立即开始抗病毒治疗，首选药物为：C
50. 无菌性脑膜炎综合征在各种开颅术后均可能发生，儿童后颅窝手术后发生率达:D
51. 第2代头孢菌素类常用的注射品种有：B。头孢呋辛、头孢替安、头孢孟多
52. 肾功能减退时不宜选用的抗菌药物有：C.多粘菌素、呋喃妥因、萘啶酸
53. 细菌性气管支气管炎首选的抗菌药物为：A。青霉素类
54. 新生儿HAP以什么多见:B.肺炎链球菌和流感嗜血杆菌
55. 对于肺毛霉病,目前有确切疗效的治疗是：D。两性霉素B联合氟胞嘧啶
56. 根据结核菌素试验判断标准，硬结直径10~19mm为：C。中度阳性反应
57. 胆道系统感染病原菌最常见的是:B.肠源性革兰阴性杆菌
58. 肝移植后早期感染的常见病原体是B。细菌和真菌
59. 化脓性关节炎最常见的来源是：B。继发于关节创伤、手术及穿刺的感染
60. 登革热的主要传播媒介是：B。埃及伊蚊和白纹伊蚊
61. 在假单胞菌属的感染中铜绿假单胞菌的感染占:B.60%
63. 1987年问世的第1个抗艾滋病病毒的药物是：C.齐多夫定
64. 迁延性肺炎的病程为：B.1~3个月
65. 机械通气相关性肺炎(VAP)是指气管插管机械通气多长时间后并发的肺炎:D.48~72h

66. 近年来肠球菌引起的血流感染有明显增高的趋势, 以什么为主: C. 屎肠球菌
67. CMV 感染的危险因素最重要的是: D. 患者的免疫系统的抑制程度
68. 盆腔感染的感染途径不包括: D. 经消化道感染
69. 传染性非典型肺炎常以什么为首发和主要症状: A. 发热
70. 丝虫病首选药物为: D. 海群生
- 以下属于二线抗结核药物的是 () C、 对氨基水杨酸、阿米卡星
- 我国疟疾主要在南方流行, 以哪种类型为主 () D、 间日疟
- 中重型 AAD 患者多表现为假膜性肠炎 (PMC), 而几乎所有的 PMC 均由什么引起 () c. 艰难
- 化脓性关节炎最常见的来源是 () A、 血行感染
- 腹膜透析引起的腹膜炎首选 () A、 万古霉素或去甲万古霉素
- 狂犬病的病死率几乎为 () D、 100%
- 早发性 VAP 是指机械通气几天发生的肺炎 () C、 ≤4 天
- 手术部位感染约占全部医院感染的 () A、 15%
- 大环内酯类药物不包括 () C、 氯霉素
- 骨关节结核的化疗疗程推荐为 () C、 9 个月
- 对于肺真菌病, 试验性治疗一般应用几天, 若不见效, 应停止试验治疗 () B、 5~10 天
- 根据 2007 年美国感染性疾病学会/美国胸科学会制定的成人 CAP 管理共识指南, 以下属于主要标准的是 () D、 有创性机械通气
- 10 岁以下禽流感患儿金刚烷胺用药剂量为 5mg/ (kg·d), 每日总量不超过 () B、 150mg
- 埃希菌属包括 5 个种, 其中最常见临床分离菌是 () A、 大肠埃希菌
- 地方性斑疹伤寒的主要传染源是 () A、 家鼠
- 卡他莫拉菌引起的中耳炎常发生在 () A、 儿童
- 引起尿路感染的致病微生物以什么最为常见 () A、 细菌
- 病程超过多长时间以上视为慢性菌痢 () B、 2 个月
- 肝移植后早期深部曲霉病较少发生, 但一旦发生, 死亡率达 () C、 70%~80%
- 儿童 CMV 感染的一线用药是 () B、 更昔洛韦
- 慢性心包炎的病程超过 () C、 6 个月
- 单纯疱疹病毒主要侵犯什么部位的皮肤黏膜 () A、 颜面和生殖器、
1. 抗链球菌的首选药物是 () B、 青霉素。
 2. 治疗衣原体感染的主要药物不包括 () C、 氨基糖甙类。
 3. 创伤或手术后脑脓肿, 病原菌主要是 () C、 金黄色葡萄球菌。
 4. 中华医学会呼吸病学分会 1999 年制定的 HAP 诊断标准不包括 () D、 白细胞 $4 \times 10^9/L$, 或 $< 2 \times 10^9/L$
 5. 志贺菌中最常见且抗原结构最复杂的是 () B、 B 群。
 6. 心血管、头颈、胸腹壁、四肢软组织手术和骨科手术, 主要感染葡萄球菌, 一般首选 () A、 第 1 代头孢菌素。
 7. 以下哪种类型的肝炎经粪—口途径传播 () D 戊型肝炎。
 8. 急性胆囊炎首选的检查方法是 () B、 B 超。
 9. 伤寒最常见的两个并发症是 () D、 肠出血和肠穿孔。
 10. 关于肠球菌的形态和培养特性, 以下说法错误的是 () A、 肠球菌为革兰阴性球菌。
 11. 机械通气相关性肺炎 (VAP) 是指气管插管机械通气多长时间后并发的肺炎 () D、 48 ~
 12. 万古霉素耐药粪肠球菌首选 () A、 大剂量氨苄西林。
 13. 1962 年发现的第一个抗疱疹病毒药物是 () A、 碘苷。

- 14、流行性腮腺炎患儿必须隔离至腮腺肿胀出现后几天或腮腺肿胀完全消退 (C、7 天)。
- 15、CMV 肺炎是最严重的并发症,病死率极高,在有效的抗病毒治疗出现前,死亡率为 (D、90%)。
- 16、最常见的尿路感染途径是 (A、上行感染)。
- 17、AAD 的症状一般出现在应用抗菌药物后 (B、5~10 天)。
- 18、临床以哪种类型的鼠疫最为多见 (A、腺鼠疫)。
- 19、关于麻疹的流行情况,以下说法错误的是 (D、6 个月以下婴儿免疫力差,很容易患麻疹)。
- 20、急性淋巴结炎多继发于四肢化脓性感染病灶,什么部位最常见(A、腹股沟部位和腋窝)。
- 21、风疹患儿应隔离至出疹后 (B、5 天)。
- 22、为预防烧伤后出现导管感染,导管保留时间勿过长,经健康皮肤置管保留 (B、5 天)。
- 23、霍乱患者静脉补液量宜根据失水程度决定,以第一个 24h 计,轻型者补液量为 (C、3000~4000ml)。
- 24、由于利福平、丙硫异烟胺的致畸作用,故禁止在妊娠几个月以内应用(B、3 个月)。
- 25、军团菌属临床首选治疗药物为(A、红霉素等大环内酯类)。
- 26、新型隐球菌脑膜炎患者颅内压大于多少往往预后不良(C、300mmH₂O)。
- 27、百日咳的潜伏期一般为 (C、7~10 天)。
- 28、以下哪种病毒只能感染人类(C、带状疱疹病毒)。
- 29、霍乱在《中华人民共和国传染病防治法》中列为(A、甲类传染病)。
- 30、成人伤寒患者首选的经验用药是 (C、氟喹诺酮类)。
- 31、在急性肝炎的基础上,黄疸持续多长时间,并除外其他原因引起的肝内外梗阻性黄疸者,可诊断为急性淤胆型肝炎 (C、3 周以上)。
- 32、从麻疹前驱期至恢复期,全病程约 (C、10 天)。
- 33、抗结核药物使用过程中,若转氨酶升高低于多少且无症状者,可在密切监测下继续用药 (B、正常上限 3 倍)。
- 34、新生儿破伤风解痉治疗首选 (B、地西洋)。
- 35、急性血源性骨髓炎是最常见的骨感染类型,经常发生于 (A、儿童)。
- 36、引起硬脑膜外脓肿最常见的病原菌是 (C、金黄色葡萄球菌)。
- 37、确定给药方案的三要素不包括 (C、药效)。
- 38、丝虫病首选药物为 (D、海群生)。
- 39、关于便标本采集,以下说法错误的是 (A、因粪便标本本身含很多细菌可不必用无菌容器)。
- 40、最常见的一类机会致病真菌是 (A、念珠菌)。
- 41、以下不属于疱疹病毒科的是 (C、天花病毒)。
- 42、B 群链球菌感染首选 (A、青霉素或氨苄西林)。
- 43、异烟肼口服吸收迅速,生物利用度可达(D、90%)。
- 44、新生儿破伤风潜伏期通常为(C、7 天)。
- 45、流行性出血热是由汉坦病毒属某些病毒引起的以什么为传染源的自然疫源性疾病(D、鼠类)。
- 46、布鲁菌病传染源主要为病畜,以什么为主 (C、羊)。
- 47、预防麻疹的根本性措施是(B、减毒活疫苗主动免疫)。
- 48、以下属于非核苷类 HIV 逆转录酶抑制剂的是 (B、奈韦拉平、地拉韦啉)。
- 49、骨科人工植入物的早期感染多发生在术后 (A、1 个月内)。
- 50、疟疾病原治疗首选 (A、氯喹)。
- 51、我国疟疾主要在南方流行,以哪种类型为主(D、间日疟)。

- 52、以下属于二线抗结核药物的是(C、对氨基水杨酸、阿米卡星)。
- 53、脊髓灰质炎前驱期持续 (B、3~4 天)。
- 54、人禽流行性感冒主要经什么途径传播 (D、呼吸道传播)。
- 55、我国小儿肺炎病死数约占全世界 (B、7%)。
- 56、近年来肠球菌引起的血流感染有明显增高的趋势, 以什么为主(D、粪肠球菌)。
- 57、以下属于侵袭性肺真菌病的主要临床特征的是 (A、肺孢子菌肺炎胸片 CT 片呈磨玻璃样肺间质浸润影, 伴有低氧血症)。
- 58、中重型 AAD 患者多表现为假膜性肠炎 (PMC), 而几乎所有的 PMC 均由什么引起 (C、艰难梭菌)。
- 59、HFRS 常用利尿药为呋塞米, 可从少量开始, 逐步加大剂量, 每日总量以多少为宜 (D、 $\leq 800\text{mg}$)。
- 60、侵袭性曲霉菌感染以什么最常见 (B、肺曲霉菌病)。
- 61、手术部位感染约占全部医院感染的 (A、15%)。
- 62、大环内酯类药物不包括(C、氯霉素)。
- 63、骨关节结核的化疗疗程推荐为 (C、9 个月)。
- 64、腹膜透析引起的腹膜炎首选(A、万古霉素或去甲万古霉素)。
- 65、中枢神经系统感染应首选 (A、 β 内酰胺类)。
- 66、化脓性关节炎最常见的来源是 (A、血行感染)。
- 67、狂犬病的病死率几乎为(D、100%)。
- 68、MSSA 骨髓炎应首选(B、夫西地酸或苯唑西林)。
- 69、早发性 VAP 是指机械通气几天发生的肺炎 (C、 ≤ 4 天)。
- 70、沙雷菌属中能产生马铃薯霉烂味的是(B、气味沙雷菌)。
- 71、百日咳患者应进行呼吸道隔离, 至发病后 (D、40 天)。
- 72、革兰阴性肠杆菌肺炎治疗疗程应达到 (B、14~21 天)。
- 73、10 岁以下禽流感患儿金刚烷胺用药剂量为 $5\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 每日总量不超过(B、150mg)。
- 74、MOF 病人的死亡率随着受累器官或系统数目的增多而升高,二个器官功能衰竭死亡率为 (B、60%)。
- 75、WHO 推荐的肺结核的初始标准化方案为 (D、2HRZ/4HR)。
- 76、四环素类抗菌药物引起牙齿黄染及牙釉质发育不良, 不可用于几岁以下患儿 (C、8 岁)。
- 77、埃希菌属包括 5 个种,其中最常见临床分离菌是 (A、大肠埃希菌)。
- 78、根据 2007 年美国感染性疾病学会/美国胸科学会制定的成人 CAP 管理共识指南, 以下属于主要标准的是 (D、有创性机械通气)。
- 79、抗菌药物的使用占各类药物的比例达(C、30%~40%)。
- 80、对于肺真菌病, 试验性治疗一般应用几天, 若不见效, 应停止试验治疗 (B、5~10 天)。
- 81、病程超过多长时间以上视为慢性菌痢 (B、2 个月)。
- 82、最常见的引起过敏性休克的药物是 (A、青霉素)。
- 83、卡他莫拉菌引起的中耳炎常发生在 (A、儿童)。
- 84、引起尿路感染的致病微生物以什么最为常见 (A、细菌)。
- 85、发生 CRI/CRBSI 的危险性顺序正确的是 (A、锁骨下静脉<颈内静脉<股静脉)。
- 86、肝移植后早期深部曲霉病较少发生,但一旦发生, 死亡率达 (C、70%~80%)。
- 87、急性胆道感染时临床上最常选用 (D、第 3 代头孢菌素或广谱青霉素)。
- 88、关于不动杆菌属的生物学特性,以下说法错误的是 (A、为革兰阳性杆菌)。
- 89、地方性斑疹伤寒的主要传染源是(A、家鼠)。
- 90、以下不属于 HAP 的医源性危险因素的是 (B、近期有多器官功能障碍)

- 91、最有效的杀阿米巴包囊的药物是 (B、二氯尼特)。
- 92、慢性心包炎的病程超过 (C、6 个月)。
- 93、急性细菌性上呼吸道感染的病原菌主要为(C、溶血性链球菌)。
- 94、M—H 药敏琼脂要求琼脂厚度是 (B、4mm)。
- 95、儿童 CMV 感染的一线用药是 (B、更昔洛韦)。
- 96、嗜肺军团菌的生存能力较强，在下水道污水中可存活 (B、1 年)。
- 97、最常见的致病曲霉是 (C、烟曲霉)。
- 98、单纯疱疹病毒主要侵犯什么部位的皮肤黏膜 (A、颜面和生殖器)。
- 99、新生儿感染时应避免应用的抗菌药物是 (B、喹诺酮类)。
- 100、人类艾滋病病毒和肝炎病毒只能感染 (A、人类和黑猩猩)。
1. 坂崎肠杆菌能引起新生儿脑膜炎和菌血症，死亡率高达 () B 50%
2. 急性重症胆管炎最普遍的主诉是：B。右上腹痛
3. 鼠疫的主要传播途径为 D 鼠蚤叮咬
4. 目前公认的分类方法是将沙门菌属分为几个亚属 4 个
5. 氟康唑治疗隐球菌病疗程不少于 A 2~4 周
6. 肝胆系统感染时合理选用抗菌药物应符合的基本原则不包括 b
7. 在出生后几岁内出现症状的称为早期胎传梅毒 2 岁
8. 流行性乙型脑炎的并发症以什么最常见 C 肺不张
9. 临床上艾滋病患者最常见的真菌感染是
10. 以下哪些药物对胎儿有致畸或明显毒性作用，妊娠期间不可应用 D 氨基糖苷类、万古霉素
11. 伤寒的传播途径 A
12. 无菌体液细菌培养成功的首要因素是 B
13. 为准确掌握抗菌药在组织中达到有效浓度的时间，一般应静脉给药，且于多长时间内滴完 A
14. 以下哪种抗结核药口服不吸收,必须注射 C
15. 引起脑脓肿最常见的细菌是 B
16. 黑热病目前以什么为治疗的首选药 B
17. 机械通气患者并发 VAP 的最重要途径是 B
18. 对轻、中度脱水病人，ORS 用量在最初 6h,成人每小时：B.750ml
19. 3 个月到 2 岁化脓性关节炎患儿，推荐应用：B.头孢曲松
20. 葡萄球菌属分为 b

10 岁以下禽流感患儿金刚烷胺用药剂量为 5mg/ (kg?d)，每日总量不超过： B

1957 年哪个国家首次报道手足口病： B

1987 年问世的第 1 个抗艾滋病病毒的药物是： C

1 个月以内的新生儿发生急性细菌性脑膜炎,最常见的病原菌是: CD

1 岁以上的儿童，处于艾滋病期或 CD4+T 淋巴细胞百分比为多少建议治疗： A

AOM 是小儿上呼吸道感染使用抗菌药物的明确指征,应首选:A

B 群链球菌感染首选：A

CAP 预防措施之一为流感疫苗的接种，针对的人群不包括： B

CMV 肺炎是最严重的并发症,病死率极高，在有效的抗病毒治疗出现前，死亡率为: D

HAP 的定义为病人入院时未患有，也不处于感染潜伏期，而于入院多长时间后罹患的由病原菌引起的肺实质性炎症： C

HFRS 常用利尿药为呋塞米，可从少量开始，逐步加大剂量，每日总量以多少为宜： AD

MOF 病人的死亡率随着受累器官或系统数目的增多而升高，二个器官功能衰竭死亡率为： BC

MSSA 骨髓炎应首选：B

WHO 推荐的肺结核的初治标准化疗方案为： D

埃希菌属包括 5 个种，其中最常见临床分离菌是: A

艾滋病患者发生弓形体感染首选的治疗方案为： BD

艾滋病于哪一年在美国首先发现： B

安尼芬净推荐剂量为首剂： B

氨苄西林对流感嗜血杆菌临床分离株 PAE 为: A

按照 WHO 有关合理用药的标准,医院抗菌药物平均使用率应该低于： C

白喉根据病变部位，分四种类型，其中最常见的是: B

白血病化疗后感染的发生与化疗后粒缺情况以及持续的时间密切相关，中性粒细胞 $<0.1 \times 10^9/L$ ，持续 2 周者发生感染的几率为： A

败血症应首选: C

包虫病是人感染棘球蚴所致的慢性寄生虫病，棘球蚴主要侵犯： C

鼻病毒主要感染： B

闭合性脑外伤或伴有颅骨骨折、脑脊液漏者发生脑膜炎常由什么细菌感染引起： A

病程超过多长时间以上视为慢性菌痢： B

病人对药物过敏不宜使用头孢菌素时,针对葡萄球菌、链球菌可用： D

布鲁菌病病程超过多长时间者为慢性感染： C

布鲁菌病传染源主要为病畜，以什么为主： C

布鲁菌病急性感染患者发热的典型热型为: D

产碱杆菌在自然界分布广泛，以哪种细菌最为常见: B

成人及青少年 HIV/AIDS 病人的 HAART 一线推荐方案为： A

出生 20 天后各年龄期小儿 CAP 的首位病原菌是： A

传染性非典型肺炎常以什么为首发和主要症状: A

传染性非典型肺炎的潜伏期通常限于: B

传染性非典型肺炎是由哪种病毒感染引起的呼吸道传染病: D

创伤或手术后脑脓肿,病原菌主要是: C

从麻疹前驱期至恢复期,全病程约: C

大多数移植后感染一般发生在术后: D

大环内酯类药物不包括: C

大面积烧伤病人穿刺和置管频度最高的是: A

大约多少 AIDS 患者会出现 PCP: C

单纯疱疹病毒主要侵犯什么部位的皮肤黏膜: A

胆道系统感染病原菌最常见的是: B

当青霉素 G 剂量大于 1000 万 U/d,脑脊液中浓度超过多少时会出现青霉素脑病: AC

登革热的主要传播媒介是: B

低温冰箱需每天观察并记录一次,要求温度变化不超过设定范围的: B

对于肺毛霉菌病,目前有确切疗效的治疗是: D

对于肺真菌病,试验性治疗一般应用几天,若不见效,应停止试验治疗: B

对于无并发症的腹膜炎病人,若感染源已得到有效控制,抗菌药物的使用时间一般为: C

对于真菌菌血症患者治疗疗程一般是: D

多少病毒性心包炎患者可闻及心包摩擦音: BC

儿童 CMV 感染的一线用药是: B

二重感染的常见病原菌不包括: C

风疹患儿应隔离至出疹后: AB

腹膜透析引起的腹膜炎首选: A

肝移植后早期感染的常见病原体是: B

肝移植后早期深部曲霉病较少发生,但一旦发生,死亡率达: AC

感染沙门菌后最为常见的临床症状是: B

感染性心内膜炎常出现肺栓塞症状,多是哪侧心腔脱落的栓子引起: B

革兰阴性肠杆菌肺炎治疗疗程应达到: AB

根据结核菌素试验判断标准,硬结直径 10~19mm 为: C

根据社区获得性肺炎的诊断标准,以下哪一项是建立诊断的必须条件: A

骨科人工植入物的早期感染多发生在术后: A

骨科人工植入物感染最常见的类型是: B

骨与关节结核手术治疗必须在抗结核药物治疗的基础上进行,术前一般要抗结核治疗: BD

骨与关节结核在各个年龄段均可发病,但以儿童和青少年多见,几岁以下儿童发病率最高: D

关于便标本采集,以下说法错误的是: A

关于肠球菌的形态和培养特性,以下说法错误的是: A

关于麻疹的流行情况,以下说法错误的是: D

关于涂片的急诊报告,以下说法错误的是: D

国内以哪种类型的钩体病最为多见: C

黄杆菌属在血琼脂培养基上生长良好,最适生长温度为: C

霍乱在《中华人民共和国传染病防治法》中列为: A

急性出血性眼结膜炎是由什么为最主要病原体引起的急性传染病: C

急性会厌炎可首选的抗菌药物为: CD

脊髓灰质炎前驱期持续: B

甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌首选： A

间日疟、卵形疟的潜伏期约： C

紧急情况下临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物，但仅限于几天的用量： A

据国内外报道,HAP 的病原菌以什么占首位： B

军团菌在 MH-LH 琼脂上可产生什么颜色的色素：C

抗结核药物使用过程中，若转氨酶升高低于多少且无症状者，可在密切监测下继续用药： B

抗菌药物的使用占各类药物的比例达： C

抗菌药物相关性出血性结肠炎以肉眼血性大便为主要临床表现，病变局限于： C

抗菌药物应用评估活动需要定期加以评价,至少： A

狂犬病的病死率几乎为： D

离心后尿沉渣镜下白细胞每高倍视野大于几个是尿路感染诊断较为可靠的指标： BD

利福喷汀为长效利福霉素生物，其消除半衰期约： CD

痢疾菌培养的急诊报告，不含药敏结果报告时间应为： A

链球菌对红霉素的耐药性较高，我国的耐药率高达： C

两性霉素 B 属于： A

流脑可发生于任何年龄，但什么年龄段的婴幼儿发病率最高： B

流行性出血热是由汉坦病毒属某些病毒引起的以什么为传染源的自然疫源性疾病： D

流行性乙型脑炎患儿出现惊厥首选的镇静剂为： A

氯霉素、红霉素在乳汁中浓度约为母血浓度的： D

慢性肾功能不全并发肺结核病的发病率较通常人群高： A

每年死亡人数最多的传染病是： A

目前主张尽量用短疗程治疗 HAP（VAP）,良好的临床反应都出现在用药几天内： A

哪种病原体感染引起的视网膜脉络膜炎是 AIDS 病人视力障碍的主要原因： C

哪种疫苗的使用已消灭了小儿麻痹症： B

脑膜炎奈瑟菌感染后,治疗用抗菌药物不包括： B

普通感冒和急性病毒性上呼吸道感染具有自限性，一般病程在： B

浅表真菌病感染仅仅局限于： D

曲霉感染后首选药物为： D

确定给药方案的三要素不包括： C

人类艾滋病病毒和肝炎病毒只能感染： A

妊娠期尿路感染病人宜选用的抗菌药物是： C

沙雷菌属中的哪种细菌是引起肠道外感染的主要病原菌： D

肾功能不全患者应用氟康唑时，肌酐清除率为多少时，不需调整剂量： C

手术部位感染约占全部医院感染的： A

胎传梅毒系母体的梅毒螺旋体通过胎盘进入胎儿体内，多发生于： D

炭疽的 5 种临床类型中,最多见的一种是： A

铜绿假单胞菌是假单胞菌的代表菌种,人体皮肤、肠道、呼吸道均有存在，特别是儿童皮肤分离率达： D

为预防烧伤后出现导管感染，导管保留时间勿过长，经健康皮肤置管保留： B

唯一在我国批准上市的神氨酸酶抑制剂是： B

我国存在的新生隐球菌以哪一型最多见： B

我国开始执行抗生素处方药管理规定的时为： B

我国小儿肺炎病死数约占全世界： AB

无菌性脑膜炎综合征在各种开颅术后均可能发生,儿童后颅窝手术后发生率达： CD
细菌性气管支气管炎首选的抗菌药物为： A
新生儿 HAP 以什么多见： CD
新生儿感染时应避免应用的抗菌药物是： B
新生儿破伤风的死亡率几乎为： D
新生儿使用哪种抗菌药物时可导致灰婴综合征： C
新型隐球菌脑膜炎患者颅内压大于多少往往预后不良： C
新型隐球菌脑膜炎抗真菌治疗应首选： A
血管神经性水肿大多由哪种抗菌药物引起： B
血吸虫病的首选治疗药物为： B
血液培养的合格标准是： C
以下不属于β内酰胺类抗菌药物的是： AB
以下不属于疱疹病毒科的是： C
以下哪些药物不易保留于血浆： D
以下属于Ⅲ类（污染）切口的是： D
以下属于二线抗结核药物的是： C
以下属于非核苷类 HIV 逆转录酶抑制剂的是： B
以下属于盆腔感染的宜选药物的是： AD
以下属于氧头孢烯类抗菌药物的是： B
引起肺曲霉病最常见的曲霉为： A
引起急性扁桃体咽炎的细菌病原主要是： A
引起手术部位感染最常见的病原菌是： C
引起硬脑膜外脓肿最常见的病原菌是： C
由于利福平、丙硫异烟胺的致畸作用，故禁止在妊娠几个月以内应用： BC
有严重的中毒症状，持续高热不退,经对症治疗 5 天以上最高体温仍超过多少度可考虑应用糖皮质激素： C
幼儿急性血源性骨髓炎的主要致病菌是： D
预防麻疹的根本性措施是： B
真菌感染诊断的"金标准" 是： B
真性细菌尿是指中段尿培养，菌落计数为多少可确定为尿路感染： B
志贺菌属中最常见且抗原结构最复杂的是： B
制霉菌素属于哪种类型的抗真菌药： A
治疗深部真菌感染的药物不包括： A
治疗衣原体感染的主要药物不包括： C
中华医学会呼吸病学会 1999 年制定的 HAP 诊断标准不包括： D
中重型 AAD 患者多表现为假膜性肠炎(PMC)，而几乎所有的 PMC 均由什么引起： C
主要经肾排泄的药物不包括： A
最常见的一类机会致病真菌是： A
最典型的肠热症是由哪种细菌引起的伤寒： C
最小的微生物是： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495003222334011244>