

2022-2023 年护师类之儿科护理主管护师高分通关题库 A4 可打印版

单选题（共 75 题）

1、确定传染病检疫期的依据是（ ）。

- A. 潜伏期
- B. 传染期
- C. 发热期
- D. 极期
- E. 后遗症期

【答案】 A

2、孕 32 周早产儿，有窒息史，生后 10 小时出现脑性尖叫，易激惹，并出现惊厥，诊断为新生儿颅内出血

- A. 硬膜下穿刺引流
- B. 蛛网膜下穿刺引流
- C. 硬膜下注入抗生素
- D. 脑室穿刺引流
- E. 前囟加压固定

【答案】 D

3、多数传染病的病程发展具有阶段性，从病原体侵入人体至开始出现临床表现的时期称为

- A. 恢复期
- B. 前驱期

C. 症状明显期

D. 潜伏期

E. 迁延期

【答案】 D

4、形成腹外疝的两个基本发病因素是（ ）。

A. 婴幼儿腹肌发育不全和老年人腹肌萎缩

B. 腹股沟管和股管宽大

C. 妊娠和重体力劳动

D. 腹壁肌肉强度降低和腹内压增高

E. 腹壁外伤和感染导致腹壁缺损

【答案】 D

5、引起急性肾炎最常见的细菌是

A. 大肠埃希菌

B. 金黄色葡萄球菌

C. A 组 β 溶血性链球菌

D. 革兰阳性杆菌

E. 变形杆菌

【答案】 C

6、患儿，男，8岁，眼睑水肿4天伴尿少，近2日尿呈浓茶色，患儿无尿频、尿急、尿痛。患儿3周前曾患上呼吸道感染。查体：T36.2℃，R26次/分，P100次/分，BP130/90mmHg，神清，双眼睑及颜面水肿，双足背轻度非凹陷性水肿，心肺（-），腹软，肝、脾肋下未及。

- A. 先天性肾病
- B. 单纯性肾病
- C. 肾炎性肾病
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 泌尿系感染

【答案】 D

7、能使跟腱反射改变的椎间盘突出部位在

- A. L
- B. L
- C. L
- D. L
- E. S

【答案】 D

8、学龄期常见的心理行为问题是（ ）。

- A. 吮拇指
- B. 违拗
- C. 焦虑
- D. 自杀
- E. 异物吸入

【答案】 C

9、门静脉高压症形成后首先出现的是（ ）。

- A. 肝肿大
- B. 脾肿大
- C. 腹水
- D. 呕血
- E. 交通支扩张

【答案】 B

10、原始心脏开始形成的时间是（ ）。

- A. 胚胎发育第 1 周
- B. 胚胎发育第 2 周
- C. 胚胎发育第 3 周
- D. 胚胎发育第 4 周
- E. 胚胎发育第 5 周

【答案】 B

11、孕 32 周早产儿，有窒息史，生后 10 小时出现脑性尖叫，易激惹，并出现惊厥，诊断为新生儿颅内出血

- A. 地塞米松
- B. 酚磺乙胺
- C. 肾上腺素
- D. 苯巴比妥
- E. 胞二磷胆碱

【答案】 B

12、护士在工作中感到要不断学习才能适应和胜任护理工作，自我要求继续学习成长，在不影响临床工作的前提下宜选择的学习方式是（ ）。

- A. 脱产学习
- B. 半脱产学习
- C. 进修学习
- D. 自学或临床培训
- E. 参加学习班

【答案】 D

13、患儿，男性，日龄 2d。上腭中线和齿龈部有黄白色斑点，称为“马牙”，该患儿的护理方法是

- A. 挑破
- B. 用软布擦净
- C. 抗炎治疗
- D. 不需处理，可自行消失
- E. 用制霉菌素甘油

【答案】 D

14、（ ）是导致胎儿畸形的诱因。

- A. 接触放射线
- B. 孕妇营养均衡
- C. 生活习惯良好
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

【答案】 A

15、小儿发生惊厥时首先采取的护理措施是（ ）。

- A. 送入抢救室
- B. 解松衣物，平卧，头偏向一侧
- C. 给予物理降温
- D. 准备急救用物
- E. 置牙垫于上下磨牙之间

【答案】 B

16、新生儿败血症最常见的并发症是（ ）。

- A. 核黄疸
- B. 硬肿症
- C. 中耳炎
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 化脓性骨髓炎

【答案】 D

17、风湿热患儿，服用阿司匹林药物治疗期间，病情观察的重点是（ ）。

- A. 血压变化
- B. 胃肠道反应
- C. 血电解质变化
- D. 有无心律不齐
- E. 有无过敏反应

【答案】 B

18、初孕妇，28岁，妊娠34周，既往体健，下肢浮肿及血压升高两周，拟妊娠期间高血压病，收入院治疗，下列辅助项目中，有助于判断其临床分类检查是（ ）。

A. 红细胞压积累

B. 24小时尿蛋白定量

C. 眼底检查

D. 血小板计数

E. 肝肾功能检查

【答案】 B

19、流行性乙型脑炎的主要传染源是（ ）。

A. 猪

B. 患者

C. 隐性感染者

D. 蚊子

E. 蝙蝠

【答案】 A

20、最常见的腹外疝类型是

A. 股疝

B. 腹股沟直疝

C. 腹股沟斜疝

D. 脐疝

E. 白线疝

【答案】 C

21、 3岁男孩，生后半年即出现全身发绀，有蹲踞现象和活动后晕厥、抽搐发作。听诊胸骨左缘第3~4肋间闻及Ⅱ级收缩期杂音，肺动脉第2音减弱。

- A. 高渗葡萄糖
- B. 地西洋
- C. 吸氧
- D. 普萘洛尔（心得安）
- E. 地高辛

【答案】 D

22、 小儿急性肾小球肾炎起病时最典型症状是

- A. 尿闭
- B. 血尿
- C. 少尿
- D. 水肿
- E. 高血压

【答案】 B

23、 手术室某护士准备用2%戊二醛灭菌剂浸泡内镜，为达到防锈目的，该护士应该在戊二醛溶液里加入（ ）。

- A. 0.2%硝酸钠
- B. 0.3%硝酸钠
- C. 0.5%亚硝酸钠
- D. 0.2%亚硝酸钠

E. 0.3%碳酸氢钠

【答案】 C

24、患儿，10岁，体质差，易感冒，3天前突发高热，体温39~40℃，伴寒战、头痛，食欲差，左大腿下段肿痛明显，此患者首选的检查是（ ）。

A. 结核菌素实验

B. 肌肉活检

C. X线

D. 局部分层穿刺

E. 膝关节穿刺

【答案】 C

25、小儿易发生体液平衡紊乱的最主要原因是

A. 体液调节功能不完善

B. 神经系统发育不完善

C. 间质液比例较高

D. 体液占体重大

E. 肾浓缩、稀释功能差

【答案】 C

26、某医院护理部质控组运用PDCA的管理方法，实行护理质量控制，依据既定的质量标准定期到临床查找问题，分析原因，针对原因制定改进措施，实施并反馈，不断改进提高。该医院实行护理质量控制过程中的依据是（ ）。

A. 统计数据

B. 质量标准

- C. 个人观察
- D. 问卷调查
- E. 书面报告

【答案】 B

27、患者，女性，15岁。骑自行车时不慎跌倒，自觉外阴部胀痛难忍，最可能发生

- A. 处女膜破裂
- B. 小阴唇裂伤
- C. 大阴唇血肿
- D. 会阴体损伤
- E. 前庭大腺出血

【答案】 C

28、首先提出目标管理的是（ ）。

- A. 孔茨
- B. 德鲁克
- C. 巴纳德
- D. 西蒙
- E. 马斯洛

【答案】 B

29、患者，女性，26岁。初产妇，妊娠39周胎儿经阴道娩出后，立即出现多量阴道流血，色鲜红，持续不断。最可能的病因是

- A. 植入胎盘部分剥离

- B. 子宫收缩乏力
- C. 凝血功能障碍
- D. 软产道裂伤
- E. 胎盘滞留

【答案】 D

30、患者，男性，29岁，肺结核。护士处理其痰液及口鼻分泌物的正确方法是（ ）。

- A. 用纸盒纸袋盛装后焚烧处理
- B. 加入等量1%过氧乙酸作用20分钟进行消毒
- C. 日光下暴晒6小时
- D. 高压蒸汽灭菌
- E. 丢入双层黄色污物袋内

【答案】 A

31、血栓闭塞性脉管炎最常见的病变是位在（ ）。

- A. 下肢中小动静脉
- B. 上肢中小动静脉
- C. 髂-股深静脉
- D. 上腔静脉
- E. 下腔静脉

【答案】 A

32、分娩的主力是（ ）。

- A. 产妇向下屏气力量
- B. 膈肌收缩力
- C. 腹肌收缩力
- D. 子宫收缩力
- E. 肛提肌收缩力

【答案】 D

33、目前最佳的 SLE 筛选试验是（ ）。

- A. 皮肤狼疮带试验
- B. 抗核抗体检查
- C. 狼疮细胞检查
- D. 血清补体测定
- E. 毛细血管镜检查

【答案】 B

34、肝癌早期定位检查的首选方法是（ ）。

- A. B 超
- B. ERCP
- C. CT
- D. 磁共振
- E. 肝动脉造影

【答案】 A

35、患者男，65岁。有肝硬化病史5年。近1周食欲明显减退，伴呕吐腹泻，2天前出现尿量明显减少，每天200mL左右，血生化示：尿素氮11mmol/L。则最可能的诊断是（ ）。

- A. 感染
- B. 肝肾综合征
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肺综合征
- E. 门静脉血栓形成

【答案】 B

36、在健康教育评价过程中，由于偶然因素，个别被测试对象的某特征水平过高或过低，但在以后的测试中又恢复原有的实际水平的现象被称为（ ）。

- A. 时间因素
- B. 测试因素
- C. 回归因素
- D. 选择因素
- E. 失访

【答案】 C

37、各种原因所致的肾上腺皮质醇分泌增多引起的临床综合征称为（ ）。

- A. 阿-斯综合征
- B. 马方综合征
- C. 库欣综合征
- D. 肾病综合征
- E. 肝肾综合征

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495010020032011110>