

2024 湖北省浠水县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库（黄金题型）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

- A: 20.89, 800ml
- B: 12.69, 485ml
- C: 24.79, 950ml
- D: 22.19, 850ml

答案：B

2. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

- A: APTT
- B: ALT
- C: INR
- D: RBC

答案：A

3. 可减弱华法林抗凝作用的食物有

- A: 大蒜
- B: 洋葱
- C: 葡萄柚
- D: 韭菜

答案：D

4. 抗类风湿关节炎药物中,服用 4~8 周后起效的是

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 青霉胺
- C: 氯喹
- D: 来氟米特

答案: A

5. 患者,女,72 岁,有青霉素过敏史,主诉尿痛、尿频。尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml。诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 复方磺胺甲噁唑片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 莫西沙星片

答案: B

6. 即使某些眼疾患者适宜应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂。连续应用时间也不宜超过

- A: 10 天
- B: 7 天
- C: 5 天
- D: 3 天

答案: A

7. (2016 年真题) 患者,男,58 岁,患有高胆固醇血症,长期服用辛伐他汀 40mgqd,患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

- A: ALT

B: RBC

C: BUN

D: Hb

答案：A

8. 适用于绝经过渡期()

A: 单纯雌激素补充治疗

B: 雌孕激素连续联合用药

C: 雌孕激素序贯用药

D: 单纯孕激素补充治疗

答案：D

9. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 放射性肺炎

B: 过敏性肺炎

C: 细菌性肺炎

D: 免疫损伤肺炎

答案：C

10. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

B: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施

C: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

D: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片,不用补服 4 月 24 日的药片

答案: B

11. 药源性疾病是由药物诱发的疾病,是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

C: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

D: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

答案: B

12. 抗血小板药

A: 肝素

B: 氯吡格雷

C: 利伐沙班

D: 华法林

答案: B

13. 可与茶叶中的鞣酸结合产生沉淀,饮茶会影响其吸收的药物是

A: 硝苯地平

B: 硫酸亚铁

C: 对乙酰氨基酚

D: 地西泮

答案：B

14. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 肺炎链球菌
- B: 支原体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 衣原体

答案：C

15. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- B: 临床治疗方案
- C: 涂片、培养鉴定
- D: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：B

16. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

- A: 司可巴比妥中毒
- B: 苯巴比妥中毒
- C: 异戊巴比妥中毒
- D: 苯妥英钠中毒

答案：C

17. (常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 纳洛酮
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 谷胱甘肽

答案：C

18. 饮茶可减少其吸收的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 硫酸亚铁
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 去氨加压素

答案：B

19. 无治疗指征盲目补钙，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 无适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：D

20. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 泼尼松龙

答案：C

21. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：A

22. (2018 年真题) 患者, 男, 60 岁, 因上臂出现湿疹到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 10%樟脑软膏
- B: 利巴韦林软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：D

23. 下列药物中使用前无需皮试的是 ()

- A: 抗狂犬病血清注射剂
- B: 苄星青霉素注射剂
- C: 紫杉醇注射剂
- D: 抑肽酶注射剂

答案：C

24. 药师在接受护士用药咨询时, 应重点关注的内容是

- A: 药品经济学知识
- B: 注射剂的配制和滴注速度等
- C: 药物制剂的等效性
- D: 药品的生产厂商和批号

答案：B

25. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 1605 中毒
- B: 乐果中毒
- C: 巴比妥类中毒
- D: 3911 中毒

答案：C

26. 患者,女,72 岁,有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频,尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数 105cfu/m ,诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑片
- B: 阿奇霉素片
- C: 莫西沙星片
- D: 阿莫西林胶囊

答案：A

27. 促进尿酸排泄,用于痛风慢性期,应早餐后服用的药物是

- A: 枸橼酸氢钾钠
- B: 非布司他
- C: 拉布立酶
- D: 苯溴马隆

答案：D

28. 使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

- A: 位置标志明确
- B: 配备必备设备
- C: 适当隐私
- D: 环境舒适

答案：C

29. 在骨性关节炎治疗中，为减轻胃肠道反应，可选用的选择性 COX-2 抑制剂是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 萘普生
- D: 双氯芬酸

答案：B

30. 瘦肉精（克伦特罗）中毒时，可采用的解毒药是

- A: 乙酰胺
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氟马西尼
- D: 普萘洛尔

答案：D

31. 目前，临床用药的单剂量药盒主要应用于

- A: 门诊患者
- B: 自购药品患者
- C: 住院患者
- D: 家庭患者

答案：C

32. 可碱化尿液，用于代谢性酸中毒的是

- A: 氨基酸
- B: 蛋白质
- C: 乳酸钠
- D: 硫酸镁

答案：C

33. 以下联合用药中，依据"作用相加或增加疗效"机制的是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平
- B: 阿托品联用解磷定
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：B

34. 以下选项中，属于长效类巴比妥类镇静催眠药的是()。

- A: 苯巴比妥
- B: 异戊巴比妥
- C: 戊巴比妥
- D: 异丁巴比妥

答案：A

35. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

- A: 聚乙二醇粉剂
- B: 非洛地平缓释片
- C: 磷酸可待因糖浆
- D: 吲哚美辛胶囊

答案：A

36. 以下毒物一旦误服中毒，须用硫酸铜洗胃、导泻的是

- A: 香豆素类杀鼠药
- B: 地西泮中毒
- C: 杀鼠药磷化锌
- D: 可待因中毒

答案：C

37. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 慢性肾炎
- C: 中毒性肝炎
- D: 胃溃疡

答案：C

38. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的药学综合信息是

- A: 《药物信息手册》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《药物事实与比较》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案：C

39. 正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为():

- A: 3.8~6.1mmol/L
- B: 3.2~7.1mmol/L
- C: 1.8~6.5mmol/L
- D: 2.2~5.1mmol/L

答案：B

40. 治疗缺铁性贫血的首选药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 硫酸亚铁

答案：D

41. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

- A: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病
- B: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量
- D: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物

答案：A

42. 口服吐根糖浆催吐用于解救

- A: 三唑仑中毒
- B: 巴比妥中毒
- C: 磷化锌中毒
- D: 丙咪嗪中毒

答案：D

43. 写明稀释比例和使用时间，是指

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 医嘱清楚准确
- C: 修订医嘱及时沟通
- D: 实现个体化治疗

答案：A

44. 可主要引起淋巴细胞增多的疾病为

- A: 肾移植术后发生排斥反应
- B: 胃溃疡

C: 糖尿病

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：A

45. 服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

A: 维生素

B: 维生素

C: 泼尼松

D: 格列本脲

答案：D

46. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

A: 多沙唑嗪

B: 非那雄胺

C: 托特罗定

D: 坦索罗辛

答案：C

47. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 伪麻黄碱

C: 愈创木酚甘油醚

D: 苯海拉明

答案：A

48. 给药时间、给药途径或剂型错误，归属于

A: 管理缺失

B: 患者经济拮据

C: 操作失误

D: 产品缺陷

答案: C

49. (2020 年真题) 患者, 男, 66 岁, 2 型糖尿病, 长期口服二甲双胍, 格列美脲, 近日查空腹血糖 12.3mmol/L, 糖化血红蛋白 9.0%, 主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”, 关于该患者药物治疗方案的说法, 正确的是 ()

A: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射

B: 因采用一日多次胰岛素治疗, 格列美脲应停用

C: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用

D: 患者为 2 型糖尿病, 加用胰岛素一日 4 次方案不适宜

答案: B

50. 下列药品中, 不需要避潮湿贮存的是

A: 维生素 C 片剂

B: 维生素 C 注射液

C: 奥美拉唑肠溶片

D: 布洛芬颗粒剂

答案: B

51. 易受光线影响而变质的药品

A: 冰硼散

B: 氰化钾

C: 安乃近

D: 肝素

答案: D

52. 属于 5α 还原酶抑制剂的是 ()

- A: 氟他胺
- B: 度他雄胺
- C: 雌三醇
- D: 普适泰

答案: B

53. (2018 年真题) 患者, 男, 46 岁, 拟行肠道手术, 术前 1 天使用导泻药的方法是 ()

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 50%硫酸镁溶液口服
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 5%氯化钙注射液静脉滴注

答案: B

54. (2017 年真题) 过敏性皮炎常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 红细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案: A

55. 长期服用避孕药

- A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- C: 可使驾驶员出现定向力障碍
- D: 可导致驾驶员多尿或多汗

答案：C

56. 由美国卫生系统药师协会出版的《Handbook on Injectable Drug》袖珍本的中译本是

- A: 《Trissel 注射药物手册》
- B: 《注射药物手册》
- C: 《药品注射剂使用指南》
- D: 《Trissel 混合组分的稳定性》

答案：C

57. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 亚硝酸钠
- C: 碘解磷定
- D: 乙酰胺

答案：C

58. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选（）。

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 吗啡

答案：B

59. 易受光线影响而变质的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 头孢曲松钠

C: 复方甘草合剂

D: 阿卡波糖片

答案: A

60. 抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者，应评判为

A: 有禁忌证用药

B: 无正当理由超适应证用药

C: 联合用药不适宜

D: 过度治疗用药

答案: A

61. 对血管平滑肌选择性高，对心肌收缩力或心肌传导作用影响很小的是

A: 氨氯地平

B: 普萘洛尔

C: 硝酸甘油

D: 哌唑嗪

答案: A

62. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

A: 维拉帕米

B: 硝酸甘油

C: 呋塞米

D: 卡托普利

答案: D

63. 药物治疗管理 (MTM) 是由美国多家药师协会学会共同定义：通过重整患者的医嘱药物或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性。旨在提高患者的生命质量，目前我国药学服务行业也属于热门话题。下列人群中最需要提供药物治疗管理的是

- A: 湿疹患者
- B: 沙眼患者
- C: 糖尿病患者
- D: 肺炎患者

答案：C

64. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 年龄因素
- C: 遗传因素
- D: 性别因素

答案：B

65. 横纹肌溶解症是下列哪种降脂药的不良反应

- A: ACE I 类
- B: 弹性酶
- C: 烟酸及衍生物
- D: HMG-CoA 还原酶抑制剂

答案：D

66. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

- A: 根据儿童病情计算

- B: 根据儿童体重计算
- C: 根据儿童年龄计算
- D: 根据体表面积计算

答案：D

67. 人的体重指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高的平方 (m²)，中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

- A: ≥ 26
- B: < 18.5
- C: $18.5 \sim 23.9$
- D: ≥ 28

答案：D

68. 属于钙通道阻滞剂 (第 IV 类) 的抗心律失常药是

- A: 美西律
- B: 拉贝洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：D

69. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

- A: 维生素
- B: 维生素 C
- C: 维生素 A
- D: 复合维生素 B

答案：B

70. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 动脉注射
- B: 腹腔注射
- C: 膀胱灌注
- D: 腔内注射

答案：B

71. 恢复期

- A: 1 个月内
- B: 1~3 个月
- C: 2 周
- D: 1~6 个月

答案：D

72. 不属于常用缓泻药的作用机制的是

- A: 容积性
- B: 膨胀性
- C: 润湿性
- D: 润滑性

答案：C

73. 可卡因属于哪一类兴奋剂

- A: β 受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 精神刺激剂

答案：D

74. 2 型儿童糖尿病者宜首选 ()。

- A: 瑞格美脲
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：C

75. 患儿，男，12 岁，患有常年性过敏性鼻炎，药师推荐使用布地奈德鼻喷雾剂。关于用药剂量和使用方法，正确的是

- A: 每侧鼻孔 $64\mu\text{g}$ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$
- B: 每侧鼻孔 64μ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$
- C: 每侧鼻孔 $128\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $128\mu\text{g}$
- D: 每侧鼻孔 $128\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 $128\mu\text{g}$

答案：A

76. H

- A: 多潘立酮
- B: 法莫替丁
- C: 埃索美拉唑
- D: 铝碳酸镁

答案：B

77. 属于过敏介质阻释剂的是

- A: 曲尼司特
- B: 多索茶碱

C: 氨茶碱

D: 孟鲁司特

答案: A

78. 患者，女性，62 岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 华法林

B: 巴曲酶

C: 氯吡格雷

D: 肝素

答案: C

79. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

B: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

C: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

D: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

答案: B

80. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物不良反应的发生率增高。

A: 苯巴比妥

B: 维生素 B1

C: 磺胺异恶唑

D: 阿司匹林

答案: B

81. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是 ()。

- A: 流产或发育成正常胚胎
- B: 腭裂
- C: 骨骼发育异常
- D: 牙齿色素沉着

答案：A

82. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 羧甲司坦
- D: 苯丙哌林

答案：A

83. 脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

- A: 普通肝素
- B: 阿司匹林
- C: 阿替普酶
- D: 甘露醇

答案：A

84. 抗结核联合治疗方案中，可引起球后视神经炎不良反应的药物是 ()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 左氧氟沙星
- C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：D

85. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

A: 阿米卡星

B: 头孢哌酮舒巴坦

C: 亚胺培南西司他丁

D: 头孢拉定

答案：D

86. 适合餐前服用的是

A: 多潘立酮

B: 氟伐他汀

C: 奥利司他

D: 吲哚美辛

答案：A

87. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片依那普利的主要不良反应是

A: 横纹肌溶解症

B: 高钾血症

C: 出血

D: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/495214101114012033>