

2023-2024 年广西壮族自治区三江侗族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题王牌题库【突破训练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在治疗沙眼的药物中，对沙眼衣原体有强大的抑制作用的是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 金霉素眼膏
- C: 红霉素眼膏
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：A

2. 抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 过度治疗用药
- C: 无正当理由超适应证用药
- D: 有禁忌证用药

答案：D

3. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 葡萄糖酸锌口服液
- B: 感冒清热冲剂
- C: 维生素 C 片
- D: 头孢克洛干混悬剂

答案：D

4. 烫伤后药物选择不宜选用

A: 润湿烧伤膏

B: 京万红软膏

C: 破伤风

D: 甲紫

答案：D

5. 处方中"餐前给药"的外文缩写是

A: ac

B: qn

C: po

D: pc

答案：A

6. 属于处方正文的内容为

A: 开具日期

B: 临床诊断

C: 医疗机构名称

D: 用法用量

答案：D

7. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

A: 患者用药记录

B: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

C: 患者疾病发病时间

D: 采取措施干预不良反应的时间

答案：D

8. 青霉素较难在乳汁中出现的机制是

- A: 解离度大
- B: 呈弱碱性
- C: 在母体血浆中处于结合状态
- D: 呈弱酸性

答案：D

9. 黏液水肿性昏迷的治疗，首选药物为

- A: T
- B: L-T
- C: L-T
- D: T

答案：D

10. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 氯化钾
- B: 氯化钠
- C: 氯化铵
- D: 硫酸镁

答案：C

11. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

- A: 八面体蒙脱石

B: 莫沙必利

C: 地芬诺酯

D: 酚酞

答案: C

12. 能减轻眼部平滑肌及血管痉挛,改善局部微循环,缓解视疲劳的药物是 ()

A: 山莨菪碱滴眼液

B: 可的松滴眼液

C: 聚乙烯醇滴眼

D: 硫酸锌滴眼液

答案: A

13. 患者,男,46岁,拟行肠道手术,术前1天使用导泻药的方法是 ()

A: 50%葡萄糖注射液湿敷

B: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

C: 5%氯化钙注射液静脉滴注

D: 50%硫酸镁溶液口服

答案: D

14. 不属于处方前记内容的是 ()。

A: 患者姓名、性别、年龄

B: 医疗、预防、保健机构名称

C: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

D: 门诊或住院病历号、日期

答案: C

15. (2018 年真题) 下列药物中, 可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是 ()

- A: 银杏叶片
- B: 口服避孕药
- C: 叶酸
- D: 阿司匹林

答案: B

16. 正常情况下, 人血白细胞群体中占比例最小的分类细胞是

- A: 淋巴细胞
- B: 嗜酸性粒细胞
- C: 单核细胞
- D: 嗜碱性粒细胞

答案: D

17. 关于改善认知功能的药物治疗, 下列说法不正确的为

- A: 卡巴拉汀于早晨和晚上与食物同服
- B: 应用多奈哌齐时要监测胃出血
- C: 氯化铵抑制美金刚的排泄
- D: 帕罗西汀可使加兰他敏作用增强

答案: C

18. (用药与尿液检查异常) 氨丁三醇可能引起

- A: 尿液 pH 增高
- B: 尿胆红素
- C: 尿液隐血
- D: 尿蛋白

答案: A

19. 药学服务的对象

- A: 医务人员
- B: 护理人员
- C: 广大公众
- D: 血液透析者

答案：C

20. 蛇胆川贝液不宜联用的是

- A: 阿托品
- B: 可待因
- C: 氢氧化铝
- D: 苯巴比妥

答案：B

21. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 糖皮质激素
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 抗菌药物

答案：A

22. (2021 年真题) 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是 ()

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 甲巯咪唑

D: 阿托伐他汀

答案：D

23. 下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

A: 肝肾功能不全者

B: 需要重新选择药品或调整用药方案者

C: 药物治疗窗窄、需要做监测者

D: 应用特殊剂型者

答案：A

24. (单纯疱疹病毒的分型) 主要在幼年感染是()

A: HSV-IV 型

B: HSV- I 型

C: HSV-III 型

D: HSV- II 型

答案：B

25. 患者，女，72 岁，因为呼吸困难，心悸、乏力入院。查体：心率 32 次/分，心脏扩大，肝-颈静脉回流征阳性，肝脏肿大，双下肢对称性肿大。既往有心肌梗死及血管神经性水肿病史。实验室检查：血肌酐 200 $\mu\text{mol/l}$ ，血钾 2.5 $\mu\text{mol/l}$

A: 美托洛尔

B: 地高辛

C: 伊伐布雷定

D: 卡托普利

答案：B

26. 下列通用名与别名的组合中不是同一种药品的是 ()

- A: 桂利嗪与脑益嗪
- B: 氨甲苯酸与止血敏
- C: 醋酸氯己定与洗必泰
- D: 利可君与利血生

答案：B

27. 庆大霉素可引起

- A: 癫痫发作
- B: 再生障碍性贫血
- C: 锥体外系反应
- D: 听神经障碍

答案：D

28. 下列药品中易发生水解反应的是

- A: 头孢氨苄
- B: 肾上腺素
- C: 维生素
- D: 盐酸氯丙嗪

答案：A

29. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 药品贮存
- B: 特殊装置药品
- C: 药品有效期
- D: 特殊剂型用法

答案：A

30. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 乳酶生片
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 西地碘片
- D: 硫普罗宁片

答案: B

31. 通过直接阻断 α

- A: 利血平
- B: 哌唑嗪
- C: 硝苯地平
- D: 甲基多巴

答案: B

32. 利尿药呋达帕胺引起的主要不良反应是

- A: 高钾血症
- B: 多毛症
- C: 水肿
- D: 低钾血症

答案: D

33. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 静脉炎
- B: 过敏，白细胞减少
- C: 宜空腹服用
- D: 胃肠道反应

答案：D

34. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的为

- A: 与食物和药物相互作用小
- B: 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）
- C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- D: 需监测 INR

答案：D

35. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A: 给予糖皮质激素冲击治疗
- B: 停药，给予亚叶酸钙治疗
- C: 停药，水化，给予美司钠治疗
- D: 停药，给予糖皮质激素

答案：C

36. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品

- A: 合理性
- B: 新颖性
- C: 权威性
- D: 归因性

答案：A

37. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 肺炎型
- B: 胃肠型
- C: 神经型

D: 病毒型

答案: C

38. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $>342 \mu\text{mol/L}$

答案: B

39. 如万络（罗非昔布）撤市时发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍

A: 药品上市后风险评估

B: 发现与规避假、劣药流入市场

C: 药品上市前风险评估

D: 发现药品质量问题

答案: A

40. 人体贮存能量的形式为

A: 三酰甘油

B: 糖化血红蛋白

C: 高密度脂蛋白胆固醇

D: 胆固醇

答案: A

41. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5α 还原酶抑制剂是

A: 特拉唑嗪

- B: 氟伏沙明
- C: 阿夫唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：D

42. 服用保泰松、水杨酸钠可呈现

- A: 橘红至红色
- B: 黄色
- C: 红至黑色
- D: 白陶土便

答案：C

43. 用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（）

- A: 万古霉素
- B: 头孢哌酮
- C: 美罗培南
- D: 克拉霉素

答案：B

44. “以最低的药物成本，实现最好的治疗效果”体现选择治疗药物的

- A: 经济性
- B: 有效性
- C: 方便性
- D: 安全性

答案：A

45. 上市后药品再评价阶段属于

- A: III期临床试验

- B: IV 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案: B

46. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓后 24h?
- B: 溶栓后 3h?
- C: 溶栓后 12h?
- D: 溶栓后 1h?

答案: A

47. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

- A: 复杂部分性发作
- B: 简单部分性发作
- C: 失神发作
- D: 肌阵挛发作

答案: C

48. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 利血平
- B: 阿洛司琼
- C: 阿米替林
- D: 呋塞米

答案: C

49. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道感染, 处方如下:

- A: 质子泵抑制剂餐后服用
- B: 铋剂餐后服用
- C: 甲硝唑餐后服用
- D: 甲硝唑餐前服用

答案: C

50. 归属专业学术机构网站的是

- A: www.cmt.tom.cn
- B: www.merck.com
- C: [www.google](http://www.google.com)
- D: www.ashp.org

答案: D

51. 低致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用止吐治疗方案是

- A: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松
- C: 化疗前使用阿瑞吡坦, 化疗后需要继续使用止吐药
- D: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

答案: A

52. 作为退热药, 布洛芬的优势是

- A: 镇痛作用较强
- B: 对胃肠道的不良反应较轻

C: 可诱发变态反应

D: 具有解热镇痛消炎作用

答案: B

53. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案: A

54. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

A: 知识培训

B: 环境与流程的优化与持续改进

C: 科学发展

D: 管理规范到位

答案: B

55. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

A: 18 秒

B: 11 秒

C: 10 秒

D: 16 秒

答案: B

56. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 共济失调
- B: 口干
- C: 肾损害
- D: 便秘

答案：C

57. 可致急性肾衰竭、肾功能异常及肾小管损害的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 甲氨蝶呤
- C: 利巴韦林
- D: 阿洛司琼

答案：A

58. 属于 B 级的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 万古霉素
- C: 沙利度胺
- D: 葡萄糖

答案：A

59. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

- A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒
- B: 与血浆蛋白的结合率增加，使游离型药物减少
- C: 心、肝、肾及胃肠等主要器官的功能在不断下降
- D: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长

答案：B

60. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 胰岛素+二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：A

61. 可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于 2010 年 10 月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

- A: 芬特明
- B: 安非拉酮
- C: 奥利司他
- D: 西布曲明

答案：D

62. 解救氰化物中毒的是（）

- A: 亚硝酸钠
- B: 二巯丁二钠
- C: 纳洛酮
- D: 双复磷

答案：A

63. 影响人类寿命的因素中，医疗占

- A: 0.1
- B: 0.07
- C: 0.15
- D: 0.08

答案：D

64. 可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 氯氮平
- C: 胰岛素
- D: 阿司匹林

答案：A

65. 使用前应用原药进行皮试的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 注射用头孢曲松钠
- C: 注射用阿莫西林
- D: 左氧氟沙星片

答案：B

66. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

- A: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶
- B: 需要终身服药
- C: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状
- D: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

答案：A

67. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 40—200mg

B: 10—80mg

C: 10—20mg

D: 5—20mg

答案：C

68. 患者，男，70 岁，良性前列腺增生症病史 5 年，应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂特拉唑嗪治疗，可能导致的不良反应是

A: 体位性低血压

B: 尿潴留

C: 乳腺增生

D: 干咳

答案：A

69. 多数抗过敏药物慎用于（）

A: 前列腺增生老年患者

B: 胃溃疡患者

C: 高脂血症患者

D: 慢性鼻炎患者

答案：A

70. 脂肪乳用于急性肝损伤、急性胰腺炎、脂质肾病患者

A: 过度治疗用药

B: 超适应证用药

C: 无适应证用药

D: 有禁忌证用药

答案：D

71. 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是()

- A: 使用药片通用名
- B: 采用两种方式核对患者身份
- C: 双人核对
- D: 采用电子处方系统

答案：C

72. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

- A: 科学发展
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 管理规范到位
- D: 人员知识培训

答案：C

73. γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

- A: $\leq 30\text{U/L}$
- B: 男性 $11\sim 50\text{U/L}$
- C: $< 40\text{U/L}$
- D: $\leq 50\text{U/L}$

答案：B

74. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 辛伐他汀
- C: 磺胺类药物

D: 左旋多巴

答案：B

75. 对购药患者讲授安全用药常识是

A: 主动方式

B: 协商方式

C: 教育方式

D: 指令方式

答案：A

76. 巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A: 叶酸片

B: 苯妥英钠注射液

C: 硫酸亚铁片

D: 维生素 B12

答案：D

77. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

A: 萘甲唑啉鼻喷雾剂

B: 布地奈德鼻喷雾剂

C: 羟甲唑啉鼻喷雾剂

D: 麻黄碱滴鼻剂

答案：B

78. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 万古霉素对支原体无效
- B: 万古霉素使用频次不合理
- C: 万古霉素对大肠埃希菌无效
- D: 万古霉素可覆盖耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

答案：B

79. 治疗窗窄以及代谢存在较大个体差异的药物是（）

- A: 茶碱
- B: 地高辛
- C: 顺铂
- D: 苯妥英钠

答案：A

80. 长期应用苯二氮

- A: 后遗效应
- B: 戒断症状
- C: 毒性反应
- D: 首剂效应

答案：B

81. 属于新型抗凝药物的是

- A: 美托洛尔
- B: 达比加群酯
- C: 氯吡格雷

D: 胺碘酮

答案：B

82. 以下不同群中，白细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

A: 新生儿

B: 成人男性

C: 成人女性

D: 儿童

答案：A

83. 患者女 29 岁孕 25+6 周近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是（）

A: 口服，每次 5ml，一日 3 次

B: 快速静脉注射

C: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量

D: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量

答案：C

84. 阿米洛利及复方制剂

A: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

B: 可使驾驶员出现定向力障碍

C: 可导致驾驶员多尿或多汗

D: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

答案：C

85. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，宜选择的药物是（）

A: 比沙可啶

B: 东莨菪碱

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案：D

86. 关于药物作用相加或增加疗效的举例,磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶,甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶,二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断,抗菌作用增强,是属于

A: 作用于不同的靶位

B: 促进机体的吸收利用

C: 保护药品免受破坏

D: 延缓或降低抗药性

答案：A

87. (2021 年真题) 患者, 男, 59 岁, 诊断为 2 型糖尿病, 因口服降糖药疗效欠佳, 给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法, 错误的是 ()

A: 应警惕发生低血糖, 提醒患者随身携带木糖醇糖果

B: 使用前应缓慢摇匀, 确保给药剂量准确

C: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存

D: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存, 冷冻后不可再使用

答案：A

88. 患者, 男, 35 岁, 髋关节置换术后 7 天, 患者右侧下肢肿胀、疼痛, 抬高患肢后可好转。

A: 肝素

B: 利伐沙班

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 华法林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/495241143200012033>