

# 内科比武-内分泌系统知识理论考核

## 一、选择题

1. 激素不进入血液循环的分泌方式有 ( ) [单选题] \*

- A. 内分泌
- B. 旁分泌 ✓
- C. 自分泌
- D. 胞内分泌
- E. 神经分泌

2. 下列关于 OCTT 试验，错误的是 ( ) [单选题] \*

- A. 将无水葡萄糖溶解在温开水中，从第一口水开始计时，分别在 30、60、120/180 分钟抽取静脉血
- B. 试验前 3 日禁食热量高的糖类 ✓
- C. 试验应在早上 7-9 点开始进行
- D. 注意休息，避免剧烈体力活动和精神刺激
- E. 试验中如果出现恶心、呕吐、应终止试验

3. 产后出血所致垂体功能减退症最早的症状为 ( ) [单选题] \*

- A. 无乳 ✓
- B. 闭经
- C. 性征退化
- D. 生育能力丧失

4. 腺垂体功能减退症患者最早出现的临床表现是 ( ) [单选题] \*

A. 肾上腺皮质功能减退

B. 性腺功能减退

C. 甲状腺功能减退

D. 生长激素不足✓

5. 单纯性甲状腺肿的主要病因是 ( ) [单选题] \*

A. 甲状腺素分泌过多

B. 食物中含碘量不足✓

C. 遗传因素

D. 长期营养不良

E. 长期服用雌激素

6. 王女士, 65岁, 肺癌病史1年, 3天前出现了声音嘶哑, 考虑肿瘤压迫 ( ) [单选题] \*

A 迷走神经

B. 喉返神经✓

C 副交感神经

D 臂丛神经

7. 引起甲状腺功能亢进症发病的主要因素是 ( ) [单选题] \*

A 自身免疫✓

B 病毒感染

C 理化因素

D 过度疲劳

E 手术创伤

8. 最常见的甲状腺功能亢进症是 ( ) [单选题] \*

- A.碘甲亢
- B.自主性高功能甲状腺结节
- C.滤泡性甲状腺癌
- D.Graves 病✓

9. 甲亢术后发生危象的主要原因是 ( ) [单选题] \*

- A、术后出血
- B、精神紧张
- C、术前准备不充分✓
- D、术中牵拉
- E、感染

10. 甲状腺功能亢进患者消化系统一般不出现的表现为 ( ) [单选题] \*

- A、易饥多食
- B、肝脏肿大
- C、体重锐减
- D、营养不良
- E、便秘✓

11. 甲亢的高代谢综合征临床表现是 ( ) [单选题] \*

- A,多食易饥，体重下降✓
- B.神经过敏，多言好动
- C.心悸，胸闷
- D.周期性瘫痪
- E.女性月经减少或闭经

12. 下列关于甲亢临床表现的叙述，错误的是甲状腺弥漫性肿大（ ）[单选题] \*

- A.心悸伴心慌
- B.消瘦、体重减轻
- C.精神萎靡。嗜睡✓
- D.两手颤动

13. 下列症状，哪项是甲状腺机能亢进性的特殊表现（ ）[单选题] \*

- A、胫前粘液水肿✓
- B、多食善饥
- C、心动过速
- D、神经过敏
- E、月经过少

14. 毛某，女，30岁，自述全身乏力、怕热、心慌、每日大便4-5次。护理查体发现病人心率118次/分，情绪激动，目光炯炯有神，甲状腺二度肿大、质软、局部可闻及杂音，眼球微突。最可能的诊断是（ ）  
[单选题] \*

- A.单纯型甲状腺肿大
- B.甲状腺功能亢进症✓
- C.甲状腺肿瘤
- D.肠炎
- E.心律失常

15. 女性，27岁，心慌、多汗，饭量增加却消瘦1个月来院就诊。查体：甲状腺2度肿大，右上极可闻及血管杂音。在询问病史及体检时，下列哪项是最不可能出现的（ ）[单选题] \*

- A.月经过多✓

B.水肿脉

C.突眼

D.手额

E.易怒

16. 与甲状腺功能亢进症表现无关的是 ( ) [单选题] \*

A.甲状腺肿大

B.浸润性突眼

C.表情淡漠

D.肌病

E.心动过缓✓

17. Graves 病患者甲状腺肿大的特征性表现是 ( ) [单选题] \*

A.弥漫性

B.对称性

C.无压痛

D.质地软

E.上极触及震颤✓

18. 甲亢的心血管系统特征性表现是 ( ) [单选题] \*

A.心悸气促

B.心律失常

C.睡眠时心率仍增快

D.脉压增大✓

E.心尖部第一心音亢进

19. 下列不属于甲亢单纯性突眼的是 ( ) [单选题] \*

A. 双侧多不对称 ✓

B. 瞬目减少

C. 上眼睑挛缩，眼裂增宽

D. 眼向下看时，上眼睑不能下落

E. 眼向上看时，前额皮肤不能皱起

20. 某病人，女，30岁，甲亢，行双侧甲状腺次全切除，术后12小时病人出现高热，脉速(每分钟达120次以上)，烦躁不安，其原因可能是 ( ) [单选题] \*

A 肺炎

B 甲状腺危象 ✓

C 双侧喉返神经损伤

D 伤口内血肿，压迫气管

E 甲状旁腺被误切

21. 符合甲状腺危象的表现是 ( ) [单选题] \*

A. 体温 37°C

B. 便秘

C. 反应迟钝

D. 颜面水肿

E. 心律 140 次/分 ✓

22. 患者女性，45岁，因甲状腺功能亢进症3年，一直服药治疗。昨天因家人在某事故中严重受伤后受到刺激，出现烦躁不安、心悸，伴高热，体温40.5°C入院。该患者可能出现了什么情况 ( ) [单选题] \*

A. 焦虑症

B.心功能不全

C.甲状腺危象✓

D.甲状腺毒性心脏病

23. 甲状腺功能亢进症良性突眼的原因主要是 ( ) [单选题] \*

A、球后组织有细胞浸润

B、球后组织有水肿

C、眼外肌水肿变性

D、上眼睑肌的痉挛和回缩✓

E、球后脂肪组织增生

24. 甲亢术后呼吸困难和窒息多发生于术后的时间 ( ) [单选题] \*

A 12 小时内

B 24 小时内

C 36 小时内

D 48 小时内✓

E 72 小时内

25. 甲状腺手术后最危急的并发症为 ( ) [单选题] \*

A.误咽

B.手足抽搐

C.声音嘶哑

D.出血

E.呼吸困难✓

26. 甲状腺切除声音嘶哑的原因是 ( ) [单选题] \*

A.喉上神经内支损伤

B.受伤神经外支损伤

C.单侧喉返神经损伤✓

D.双侧喉返神经损伤

E.甲状旁腺损伤

27. 甲状腺术后病人饮水时不断呛咳，有可能损伤了（ ）[单选题] \*

A、一侧喉返神经

B.观侧唯返神经

C、喉上神经内支✓

D.喉上神经外支

E、甲状旁腺

28. 下列何种原因不至于诱发甲状腺危象（ ）[单选题] \*

A.感染

B.停用抗甲状腺药物近 1 周✓

C.未准备充分的甲状腺次全切除术

D.做其他部位的大手术

29. 甲状腺激素分泌过多症候群不包括（ ）[单选题] \*

A.食欲亢进

B.体重减轻

C.怕热多汗

D.甲状腺肿大✓

30. 一般人甲状腺摄  $^{131}\text{I}$  率增高，且高峰前移，提示其诊断为（ ）[单选题] \*



A.地方性甲状腺肿

B.Graves 病✓

c.亚急性甲状腺炎

D.慢性淋巴细胞型甲状腺炎

31. 检测甲状腺功能最敏感的实验室检查是 ( ) [单选题] \*

A.血清甲状腺激素的测定

B.促甲状腺激素的测定✓

C.TRH 兴奋试验

D.T3 抑制试验

32. 甲亢病人应用抗甲状腺药物改用维持量后一般还须治疗 ( ) [单选题] \*

A.1-2 周

B.2-3 个月

C.4-6 个月

D.1 年半-2 年✓

33. 甲状腺危象的防止中，为了抑制甲状腺激素的合成首选的药物是 ( ) [单选题] \*

A.甲硫咪唑

B.糖皮质激素

C.丙硫氧嘧啶✓

D.大剂量普萘洛尔

34. 基础代谢率的常用公式为(B)[单选题] \*

A 基础代谢率=脉率 X 脉压-111✓

C.基础代谢率=(脉率+脉压)-111 C 基础代谢率=(脉率-脉压)-111

D 基础代谢率=(脉率-脉压)×111 E 基础代谢率=(脉率+脉压)+111

35. 放射性  $^{131}\text{I}$  治疗甲亢时，最主要的并发症是（ ） [单选题] \*

A. 粒细胞缺乏症

B. 突眼恶化

C. 甲状腺功能减退 ✓

D. 甲亢危象

E. 甲状腺癌

36. Graves 病患者用抗甲状腺药物治疗初始阶段约需（ ） [单选题] \*

A. 1-2 个月 ✓

B. 2-3 个月

C. 1-1.5 年

D. 2 周

E. 2 年

37. 下列抗甲状腺药哪一种可抑制 T4 在周围组织中转化为 T3 （ ） [单选题] \*

A. 甲基硫氧嘧啶

B. 甲亢平

C. 丙硫氧嘧啶 ✓

D. 他巴唑

E. 碳酸锂

38. 预防甲亢术后甲状腺危象的关键在于（ ） [单选题] \*

A. 术后使用镇静剂

B. 加强术后护理

C.术前使基础代谢率降至正常✓

D.术后使用镇痛剂

E.术时使用全身麻醉

39. 甲亢危象患者药物治疗首选 ( ) [单选题] \*

A 甲巯咪唑

B 卡比马唑

C.甲基硫氧嘧啶

D 丙基硫氧嘧啶✓

E 普萘洛尔

40. 碘化物治疗甲状腺危象的主要作用机制是 ( ) [单选题] \*

A.使有机碘形成减少

B.使增生的甲状腺缩小

C.抑制已合成的甲状腺激素释放入血✓

D.促进甲状腺激素的合成与释放

E.减少甲状腺激素的生成

41. 女性，35岁，诊甲亢后即行甲状腺次全切手术，术后病人出现高热，心率160次/分，烦躁不安，

大汗淋漓，腹泻，针对这一病情，最完善的治疗方案是 ( ) [单选题] \*

A.抗甲状腺药物，强心药，镇静剂，抗生素

B.抗甲状腺药物，强心药，镇静剂， $\alpha$ 受体阻滞剂

C.大剂量抗甲状腺药物，糖皮质激素，镇静剂

D.大剂量丙基硫氧嘧啶，大量复方碘溶液，糖皮质激素， $\alpha$ 受体阻滞剂✓

E.大量复方碘溶液，糖皮质激素， $\alpha$ 受体阻滞剂，强心

42. 女性，28岁，妊娠5个月合并甲亢，药物治疗首选（ ）[单选题] \*

A.MM

B.TH

C.PTU✓

D.MTU

E.CMZ

43. 下列指导浸润性突眼病人减轻眼部症状的方法中，错误的是（ ）[单选题] \*

A、0.5%氢化可的松眼液滴眼

B、给予高枕卧位

C、限制钠盐的摄入

D、每天做眼球向上运动，锻炼眼肌✓

E、甲基纤维素

44. 浸润性突眼的防治，不正确的是（ ）[单选题] \*

A.限制钠盐摄入

B.平卧休息✓

C.利尿剂的适量应用

D.早期应用泼尼松 10~20 mg,每天3次

E.加盖眼罩防角膜损伤

45. 甲亢患者饮食指导不妥的是（ ）[单选题] \*

A.鼓励多饮水

B.避免进食含碘丰富的食物

C.禁食浓茶咖啡

D.增加食物中粗纤维的摄入✓

E.高热量高蛋白饮食

46. 应用抗甲状腺药物的病人，护士应特别注意病人是否出现（ ）[单选题] \*

A.皮肤瘙痒

B.剥脱性皮炎

C.药物性肝炎

D.咽痛、高热✓

E.电解质紊乱

47. 抗甲状腺药物最常见的副作用是（ ）[单选题] \*

A、甲状腺机能低下

B、皮肤过敏

C、白细胞减少✓

D、肝功能损害

E、消化道症状.

48. 甲状腺功能减退症患者发生贫血的原因应除外（ ）[单选题] \*

A.血红蛋白合成障碍

B.铁吸收障碍

C.叶酸吸收障碍

D.铁の利用障碍✓

E.自身免疫病导致的恶性贫血

49. 皮质醇增多症病人如出现腹胀、四肢无力应首先考虑（ ）[单选题] \*

A.低血钾

B.低血钙

C.低血压

D.低血糖✓

E.低血

E.甲状腺自身抗体的测定

50. 原发性肾上腺皮质功能减退症病人的饮食原则为 ( ) [单选题] \*

A.高热量、高蛋白、高钠、限水

B.高热量、高蛋白、低钠、限水

C.高热量、高蛋白、高钠、多进水✓

D.高热量、高蛋白、低钠、多进水

51. 甲状腺手术后三天，病人出现手足抽搐，以下措施不正确的是 ( ) [单选题] \*

A.给予葡萄糖酸钙静脉注射

B.给予碳酸氢钠注射✓

C.给予镇静和解痉药物.

D.告知病人忌食瘦肉蛋类和乳品

52. 某男性病人，36岁，甲状腺大部分切除术后7小时，病人烦躁不安，呼吸困难，发绀，颈部肿胀，

敷料有渗血。应立即采取的护理措施是 ( ) [单选题] \*

A.拆线敞开伤口✓

B.气管插管

C.吸痰和给氧

D.气管切开

E.注射止血剂

53. 甲状腺大部分切除术后发生呼吸困难和窒息与下列哪项因素无关 ( ) [单选题] \*

A. 手术创伤的应激诱发的危象 ✓

B. 切口内出血压迫气管

C. 气管软化塌陷

D. 喉头水肿

E. 双侧喉返神经损伤所致声带麻痹

54. 下列各项中，不是甲状腺大部切除术后常见并发症的是 ( ) [单选题] \*

A. 切口出血

B. 声音嘶哑或窒息

C. 进食时出现误咽或呛咳

D. 甲状腺功能低下 ✓

E. 手足抽搐

55. 抽取胰岛素时，通常用的注射器规格是 ( ) [单选题] \*

A. 1ml ✓

B. 2ml

C. 5ml

D. 10ml

E. 20ml

(以下三题共用病例)男性，18岁。因多饮多尿伴消瘦乏力1月来院就诊。空腹血糖 16.2mmol/L,空腹胰岛素水平 0.1uIU/ml,诊断为一型糖尿病

56. 明确诊断后应采取下列哪项治疗方案 ( ) [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495332021024011101>