

外科护理模拟试题库含答案

1、丹毒的临床表现哪项是错误的()

- A、 起病急,可有寒战高热
- B、 局部鲜红,压之退色,边界清楚
- C、 局部呈烧灼样痛,压痛不明显
- D、 水肿明显,后期化脓
- E、 多发生在小腿及面部

答案: D

2、五年治愈率的概念是

- A、 肿瘤切除后五年未复发的病人,占切除总数%
- B、 肿瘤切除后五年,病人健在的,占切除总数%
- C、 肿瘤切除后五年,局部未复发,但有远方转移,占切除总数%
- D、 肿瘤切除后五年,无远方转移,但局部发生结节,所占%
- E、 肿瘤切除五年未来复查的

答案: A

3、防止烧伤脓毒症的关键是

- A、 正确处理创面
- B、 应用有效抗生素
- C、 全身支持疗法
- D、 严格消毒隔离措施
- E、 暴露疗法

答案: D

4、关于放疗病人的皮肤护理,以下不正确的是

- A、 教育病人穿宽松、柔软和吸湿性强的内衣
- B、 照射部位可使用肥皂清洗
- C、 照射部位不可任意涂抹药膏
- D、 照射部位避免冷热刺激和日光直射
- E、 照射部位皮肤脱屑时,勿撕脱

答案: B

5、手术过程中,若无菌区布单沾湿应:()

- A、 去除沾湿布单
- B、 更换无菌巾
- C、 覆盖无菌巾
- D、 消毒剂涂擦
- E、 以上都不对

答案：C

6、手术前一般准备不包括()

- A、 皮肤准备
- B、 胃肠道准备
- C、 药物过敏试验
- D、 术前用药
- E、 健康教育

答案：E

7、术后呕吐处理哪项是错误的()

- A、 防止呕吐物误咽,并做好口腔护理
- B、 肌肉注射阿托品
- C、 有脱水、电解质紊乱应给予纠正
- D、 详细记录呕吐物量及性质
- E、 注射吗啡止吐

答案：E

8、体内调节酸碱平衡,起作用最快的是:()

- A、 缓冲系统
- B、 肺
- C、 肾
- D、 细胞内外离子交换
- E、 肝

答案：A

9、麻醉前准备不包括()

- A、 进行心理护理
- B、 了解病人各系统功能
- C、 纠正病人生理功能紊乱
- D、 麻醉用具及药物的准备
- E、 手术区备皮

答案：E

10、术后腹壁切口裂开腹腔脏器膨出体外应采取的护理措施()

- A、 蝶形胶布粘合
- B、 立即缝合
- C、 绷带包扎
- D、 无菌纱布覆盖并包扎
- E、 平卧床上,不活动,等待自然愈合

答案：D

11、交界性肿瘤的特征是

- A、 良性肿瘤位于两个器官交界处
- B、 良性肿瘤来源于两种组织
- C、 形态上属良性,但生长呈浸润,切除后易复发
- D、 良性肿瘤偶有远处转移
- E、 包膜不完整的良性肿瘤

答案：C

12、为避免手术病人术中呕吐及腹胀,应于()

- A、 术前 6 小时禁食、禁水
- B、 术前 12 小时禁食、不限制饮水
- C、 术前 12 小时禁食、4 小时禁水
- D、 术前 24 小时禁食、4 小时禁水
- E、 术前 24 小时禁食、12 小时禁水

答案：C

13、AFP 可明显增高的肿瘤是

- A、 肝癌
- B、 乳癌
- C、 肺癌
- D、 胃癌
- E、 结肠癌

答案：A

14、诊断浅表脓肿的可靠方法是()

- A、 局部压痛
- B、 波动试验
- C、 体温升高
- D、 局部疼痛
- E、 局部红肿

答案：B

15、气性坏疽清创后,手术室消毒应用:()

- A、 紫外线灯照射
- B、 新洁尔灭喷洒
- C、 臭氧消毒
- D、 福尔马林熏蒸
- E、 乳酸消毒

答案：D

16、某急性肠梗阻病人, 40 岁, 男性, 口渴, 尿少, 眼球下陷, 脉速, 血压 12/8.0kPa(90/60mmHg), 请估计其脱水性质和程度()

- A、 中度等渗性脱水
- B、 中度高渗性脱水
- C、 中度低渗性脱水
- D、 重度高渗性脱水
- E、 重度低渗性脱水

答案：B

17、静脉注射高浓度钾主要危险是()

- A、 静脉疼痛和血栓
- B、 静脉炎
- C、 呼吸麻痹、窒息
- D、 软瘫
- E、 突然心跳停止

答案：E

18、酸碱中毒是指()

- A、 体内碱储备过多
- B、 酸或碱的积聚或丧失
- C、 血糖大于或小于正常值
- D、 血钾浓度的升高或降低
- E、 血液 pH 大于或小于正常值

答案：B

19、吸入麻醉前应用阿托品的目的是()

- A、 减少腹胀
- B、 防止支气管痉挛
- C、 增加麻醉药物的效果
- D、 减少呼吸道分泌物
- E、 拮抗麻醉药毒性作用

答案：D

20、手术进行中哪项操作不妥()

- A、 术者或助手需要器械, 应由洗手护士递给
- B、 切开胃肠或胆道空腔内脏前四周垫纱布保护腹腔
- C、 无菌区的布单有沾湿时应加铺盖无菌单
- D、 作皮肤切开及缝合前需用 2.5%碘酒再涂擦消毒皮肤

E、 手术者或助手应按常规位置站好

答案：D

21、中心静脉压是指()

A、 左心房压力

B、 右心房压力

C、 右心房及上、下腔静脉压

D、 肘正中静脉压力

E、 股静脉压力

答案：B

22、烧伤暴露疗法的优点,不包括

A、 便于创面的用药

B、 便于病人的活动

C、 便于观察创面的变化

D、 避免换药的痛苦

E、 利于创面的干燥

答案：B

23、对严重烧伤、大出血、休克患者采用静脉输液治疗的目的是()

A、 补充水分及电解质

B、 补充营养, 供给热量

C、 输入药物, 治疗疾病

D、 增加循环血量, 改善微循环

E、 改善心脏功能

答案：D

24、女性病人, 56岁。患颈痈8天后, 突然又出现寒战高热, 10天后于臀部发现波动明显的肿块, 应考虑并发为()

A、 败血症

B、 菌血症

C、 脓血症

D、 毒血症

E、 脓毒血症

答案：C

25、能被组织吸收的缝线是()

A、 尼龙线

B、 羊肠线

C、 蚕肠线

- D、 丝线
- E、 马尾线

答案： B

26、 严重脓性指头炎临床表现, 下列哪项错误()

- A、 搏动性疼痛, 下垂加重
- B、 肿胀及皮肤苍白
- C、 夜间疼痛加重
- D、 无全身症状
- E、 可发生指骨坏死

答案： D

27、 1. 吴某, 26 岁。因足癣搔抓破溃后感染, 感染灶近侧出现一条红线, 韧而有压痛, 伴有畏寒、发热。应考虑是()

- A、 局部脓肿
- B、 丹毒
- C、 急性蜂窝织炎
- D、 急性淋巴管炎
- E、 局部过敏

答案： D

28、 在伤口的近侧出现“红线”, 硬而有压痛, 通常是()

- A、 网状淋巴管炎
- B、 浅部静脉炎
- C、 浅部淋巴管炎
- D、 深部淋巴管炎
- E、 急性蜂窝组织炎

答案： C

29、 静脉输入 10%氯化钾溶液时, 哪项是错误的:()

- A、 尿少者不宜给钾
- B、 液体含钾浓度一般不超过 3%
- C、 成人静脉滴入速度每分钟不宜超过 40~60 滴
- D、 每日补钾总量 2~3g 可满足生理需要
- E、 对低钾病人补钾量一般不超过 6~8 克/日

答案： B

30、 给胃癌病人作直肠指检时发现盆腔内有硬结节, 疑为转移灶, 此种转移属于

- A、 直接转移

- B、 淋巴转移
- C、 血液转移
- D、 种植转移
- E、 以上都不是

答案： D

31、 下列哪种局麻药最适用于局部浸润麻醉()

- A、 0.5%~1%普鲁卡因
- B、 1%~2%丁卡因
- C、 2%~4%利多卡因
- D、 硫喷妥钠
- E、 氯胺酮

答案： C

32、 成人, 男, 因胃溃疡住院手术, 术前顾虑重重, 怀疑是否需要手术, 又怕麻醉后不能苏醒, 除诊断“焦虑”外, 下列哪项应作为护理诊断?()

- A、 精神不安
- B、 知识缺乏
- C、 不合作
- D、 潜在并发症
- E、 自我调节不佳

答案： B

33、 李某, 上午在全麻下行二尖瓣置换术未醒, 测血压、 脉搏的间隔时间应为()

- A、 5~10 分钟
- B、 15~30 分钟
- C、 30~60 分钟
- D、 60 分钟
- E、 90 分钟

答案： B

34、 有传染性需隔离的外科感染性疾病是()

- A、 疔
- B、 疖
- C、 丹毒
- D、 淋巴管炎
- E、 蜂窝织炎

答案： C

35、休克抑制期(重度)估计成人失血量为()

- A、 800ml 以上
- B、 1000ml 以上
- C、 1200ml 以上
- D、 1400ml 以上
- E、 1600ml 以上

答案： E

36、烧伤病人的急救转送, 不正确的是

- A、 先抗休克, 平稳后再转送
- B、 远途转送, 途中持续输液
- C、 为稳定病情, 转送时给冬眠药物
- D、 汽车转送时, 病人头后足前卧位
- E、 抬病人上下楼时, 头朝下方

答案： C

37、严重感染时应用抗菌药物的最佳途径是()

- A、 口服
- B、 皮下
- C、 肌肉
- D、 静脉
- E、 分次静脉

答案： E

38、为防止麻醉时引起呕吐, 一般手术前禁食、禁饮的时间是()

- A、 4 小时禁食, 2 小时禁饮
- B、 6 小时禁食, 4 小时禁饮
- C、 8 小时禁食, 6 小时禁饮
- D、 10 小时禁食, 4 小时禁饮
- E、 12 小时禁食, 4~6 小时禁饮

答案： E

39、病人麻醉前准备, 下列哪项是错误的()

- A、 高血压病人应降压治疗
- B、 严重贫血者少量多次输血
- C、 纠正水电解质平衡失调
- D、 有活动性出血的病人待失血补足后, 才能施行手术
- E、 心衰者抗心衰

答案： A

40、代谢性酸中毒最突出的表现是()

- A、 感觉迟钝
- B、 心率加快
- C、 血压下降
- D、 头痛、头晕、嗜睡
- E、 呼吸深快,呼气有酮味

答案: E

41、对腰麻后头痛的的预防措施是:()

- A、 给预防性止痛药
- B、 给镇静剂
- C、 静脉输液
- D、 麻醉后去枕平卧 6-8 小时
- E、 针刺疗法

答案: D

42、对于被特殊细菌污染而毛保留价值的物品,最彻底的灭菌万法是()

- A、 煮沸消毒灭菌法
- B、 燃烧灭菌法
- C、 高压蒸气灭菌法
- D、 过氧乙酸浸泡法
- E、 日光曝晒法

答案: C

43、气性坏疽的预防治疗中,下列哪种方法错误()

- A、 病变区作广泛、多处切开
- B、 病人中毒严重,危及生命时,可考虑截肢
- C、 高压氧疗法
- D、 单独用四环素族或青霉素
- E、 首先彻底清创,加用大剂量青霉素、四环素

答案: D

44、新生儿坏疽皮下已有明显漂浮感,局部处理应是()

- A、 热敷
- B、 外敷抗生素
- C、 在脓肿明显处切开排脓
- D、 作多处小切口引流脓液
- E、 抽出脓液

答案: C

45、患者, 男性, 50 岁, 无吸烟史和肺部疾病史, 全麻下行肠道手术。术后麻醉未清醒, 呼吸时出现鼾声, 此时应先采取的措施是()

- A、 观察病情
- B、 气管插管
- C、 环甲膜穿刺
- D、 托起病人下颌
- E、 吸痰, 注射阿托品

答案: D

46、低渗性脱水时, 体液的容量改变为()

- A、 细胞外液正常, 细胞内液减少
- B、 细胞外液减少, 细胞内液正常
- C、 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少
- D、 细胞外液轻度减少, 细胞内液显著减少
- E、 细胞外液、内液按比例减少

答案: C

47、由于水摄入不足, 尿量及比重可出现下列哪种情况?()

- A、 尿量减少, 比重低
- B、 尿量减少, 比重增加
- C、 尿量正常, 比重正常
- D、 尿量增加, 比重高
- E、 无尿

答案: A

48、”(单选题)在对失水病人进行护理估计时, 以下哪项说明”体液不足”: ()”

- A、 去枕平卧时颈静脉充盈
- B、 半坐位时静脉充盈超过锁骨上 2cm
- C、 手下垂 5 秒内静脉未充盈
- D、 手抬高至肩, 静脉在 5 秒内仍未排空
- E、 皮肤有凹陷水肿

答案: C

49、患者男性, 45 岁, 在野外工作时足底不慎被锈钉刺伤, 出现全身肌肉强直性收缩, 阵发性痉挛, 来急诊就诊, 考虑可能为破伤风。对破伤风患者的治疗和护理, 下列措施正确的是()

- A、 呼吸道隔离
- B、 不需要住单人房间, 避免水、声、光、风的刺激

- C、 咽肌和呼吸肌痉挛不能用镇静剂控制时, 应使用面罩给氧
- D、 医务人员接触患者时, 戴口罩帽子, 可不戴手套
- E、 可肌内注射青霉素治疗

答案: A

50、 女性, 成人, 拟行阑尾切除术, 在腰麻开始后不久, 收缩压从麻醉前 14. 7KPa 下降至 11. 7KPa。 应从静脉输液中加入下列何种药物

- A、 间羟胺
- B、 麻黄碱
- C、 肾上腺素
- D、 多巴胺
- E、 去甲肾上腺素

答案: B

51、 危险三角区的疖, 首要的护理问题潜在并发症()

- A、 脓毒症
- B、 菌血症
- C、 毒血症
- D、 休克
- E、 颅内海绵体静脉窦炎

答案: E

52、 烧伤病人的急救转送, 不正确的是

- A、 先抗休克, 平稳后再转送
- B、 远途转送, 途中持续输液
- C、 为稳定病情, 转送时给冬眠药物
- D、 汽车转送时, 病人头后足前卧位
- E、 抬病人上下楼时, 头朝下方

答案: C

53、 低渗性脱水早期尿量变化是()

- A、 尿量减少
- B、 尿量略增或不变
- C、 尿比重增高
- D、 尿少而比重低
- E、 管型和蛋白尿

答案: B

54、 对重度等渗性脱水病人, 大量输入等渗盐水治疗可导致()

- A、 心力衰竭

- B、 血镁过低
- C、 血钠过高
- D、 血钾过低
- E、 血氯过高

答案： C

55、 面部危险三角区疔肿的危害是()

- A、 易引起面部蜂窝织炎
- B、 易侵犯上颌窦
- C、 易引起颅内化脓性感染
- D、 感染溃破影响面容
- E、 易引起唇痈

答案： C

56、 气性坏疽的预防治疗中, 下列哪种方法错误()

- A、 病变区作广泛、 多处切开
- B、 病人中毒严重, 危及生命时, 可考虑截肢
- C、 高压氧疗法
- D、 单独用四环素族或青霉素
- E、 首先彻底清创, 加用大剂量青霉素、 四环素

答案： D

57、 男性病人, 45 岁。 腰麻注药后, 先感胸闷, 继而心慌、 烦躁、 恶心、 呕吐, 血压下降, 随后呼吸困难, 首先考虑为()

- A、 中毒反应
- B、 过敏反应
- C、 注药过快
- D、 剂量过大
- E、 平面过高

答案： E

58、 全身化脓性感染作血细菌培养, 其最佳采血时间是()

- A、 寒战、 高热时
- B、 高热间歇时
- C、 空腹时
- D、 输入抗菌药物时
- E、 输入抗生素后

答案： A

59、 全身麻醉患者完全清醒的标志是()

- A、 眼球活动
- B、 呼吸加快
- C、 呻吟、转动
- D、 睫毛反射恢复
- E、 正确回答问题

答案： E

60、 失血性休克补充血容量应首选()

- A、 全血
- B、 平衡盐液
- C、 低分子右旋糖酐
- D、 10%葡萄糖溶液
- E、 5%碳酸氢钠

答案： B

61、 新生儿破伤风细菌入侵的途径是()

- A、 脐部
- B、 呼吸道
- C、 消化道
- D、 皮肤
- E、 胎盘

答案： A

62、 手术人员手臂刷洗消毒后, 手臂应保持的姿势是()

- A、 手臂向上高举
- B、 手臂自然下垂
- C、 胸前拱手姿势
- D、 手臂向前伸
- E、 双手放置背后

答案： C

63、 感染局部病灶已形成脓肿, 最有效的治疗方法是()

- A、 患部制动
- B、 外敷药物
- C、 局部热敷
- D、 局部理疗
- E、 手术切开引流

答案： E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495341210311011103>