

药剂科三基练习题（含参考答案）

1、患者，男性，47岁。一小时前因左侧腰背部剧烈疼痛，难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，急来院门诊。尿常规检查：可见红细胞。B型超声波检查：肾结石。欲止痛，患者宜采用

- A、阿托品
- B、哌替啶
- C、吗啡
- D、阿托品联合吗啡
- E、阿托品联合哌替啶

答案：E

2、允许凭执业医师处方零售的药品有

- A、麻醉药品片剂
- B、第一类精神药品
- C、第二类精神药品
- D、放射性药品
- E、麻醉药品注射剂

答案：C

3、下列说法错误的是

- A、哌唑嗪不适于慢性心衰的长期治疗
- B、硝普钠长期应用可致硫氰化物毒性反应
- C、肼屈嗪，长期应用可以导致红斑狼疮样综合症
- D、巯甲丙脯酸为血管紧张素转换酶抑制药
- E、硝普钠需静脉注射

答案：A

4、与药品相关的医疗纠纷原因包括

- A、用药差错
- B、不合理用药
- C、超出说明书规定用药
- D、药品质量
- E、以上都是

答案：E

5、在下列抗组胺药物中，从事驾驶、高空作业或操作精密仪器等人员，工作前禁止服用的是

- A、特非那定
- B、氯雷他定

- C、氯苯那敏
- D、依巴斯汀
- E、阿司咪唑

答案：C

6、患有抑郁症的高血压病人不宜选用

- A、尼卡地平
- B、普萘洛尔
- C、胍苯哒嗪
- D、利血平
- E、可乐定

答案：D

7、吗啡无下列哪种不良反应

- A、颅内压增高
- B、胆囊内压力增高
- C、腹泻
- D、抑制消化液分泌
- E、恶心呕吐

答案：C

8、可降低双香豆素抗凝作用的药物是

- A、阿司匹林
- B、广谱抗生素
- C、苯巴比妥
- D、氯贝丁酯
- E、保泰松

答案：C

9、下列哪种化学品不属于第一类易制毒化学品

- A、麻黄碱及麻黄浸膏等麻黄类物质
- B、麦角酸
- C、麦角新碱
- D、麦角胺
- E、樟脑酊

答案：E

10、以下有关注射液配伍问题的叙述中，正确的是

- A、某些药厂生产的头孢哌酮与葡萄糖注射液配伍产生沉淀
- B、注射剂的配伍变化受注射剂组成、工艺、浓度、室温等多种因素影响

- C、氯霉素注射液溶媒含乙醇、甘油等，加入葡萄糖注射液中，可析出沉淀
- D、两性霉素 B 与 pH4.2 以上葡萄糖注射液混合液 pH 在 6.6 以上不会产生沉淀
- E、苯妥英钠注射剂中加入稳定剂碳酸钠，与含 Ca、Mg 的注射剂配伍则产生沉淀

答案：B

11、根据时间药理学的理论，糖皮质激素隔日疗法的给药时间为

- A、上午 8 时
- B、中午 12 时
- C、下午 4 时
- D、晚上 8 时
- E、凌晨 4 时

答案：A

12、真菌性脑膜炎首选药

- A、氟康唑
- B、咪康唑
- C、两性霉素 B
- D、青霉素 G
- E、庆大霉素

答案：C

13、首过消除影响药物的

- A、作用强度
- B、持续时间
- C、肝内代谢
- D、药物消除
- E、肾脏排泄

答案：A

14、以下有关酶诱导作用的叙述中，最正确的是

- A、口服安替比林后饮酒呈现双硫仑反应
- B、苯妥英合用利福平，显示苯妥英毒性
- C、咖啡因合用氨鲁米特，显示咖啡因毒性
- D、甲苯磺丁脲合用巴比妥，降血糖作用减弱
- E、抗凝血药合用扑米酮，抗凝作用增强，可导致出血

答案：D

15、下列抗菌药物中，用于四联疗法治疗幽门螺杆菌感染的不是

- A、甲硝唑
- B、庆大霉素
- C、克拉霉素
- D、阿莫西林
- E、氨苄西林

答案：B

16、《处方管理办法》规定，保存期满的处方销毁须经

- A、医疗机构负责人批准
- B、县以上卫生行政部门批准、登记备案
- C、县以上食品药品监督管理局批准、登记备案
- D、县以上监察管理部门批准、登记备案
- E、医疗、预防、保健机构或药品零售企业的主管部门批准、登记备案

答案：A

17、应用胰岛素控制血糖的糖尿病患者，一般就餐时间是在注射胰岛素后

- A、5~10min
- B、10~15min
- C、15~20min
- D、15~30min
- E、20~30min

答案：D

18、长期应用地西洋可产生耐受性，其特点是

- A、催眠作用的耐受性产生较快，而抗焦虑作用的耐受性产生很慢
- B、抗焦虑作用的耐受性产生较快，而催眠作用的耐受性产生很慢
- C、催眠作用不产生耐受性，而抗焦虑作用产生耐受性
- D、抗焦虑作用不产生耐受性，而催眠作用产生耐受性
- E、催眠作用及抗焦虑作用的耐受性同时产生

答案：E

19、下列哪种毒物急性中毒呼气、呕吐物及体表气味为蒜臭味？

- A、有机磷农药、无机磷及其化合物
- B、水合氯醛
- C、乙醇、甲醇及其他醇类化合物
- D、氰化物及含氰苷果核仁
- E、丙酮、氯仿

答案：A

20、丙戊酸钠的严重毒性是

- A、肝功能损害
- B、再生障碍性贫血
- C、抑制呼吸
- D、口干、皮肤干燥
- E、低血钙

答案：A

21、栓剂中主药的重量与同体积基质重量的比值称

- A、分配系数
- B、真密度
- C、酸价
- D、置换价
- E、粒密度

答案：D

22、以下有关单剂量配发的适用范围的叙述中，不正确的是

- A、患者所需服用的各种药品
- B、按一次剂量单独包装
- C、借助分包机用铝箔或塑料袋热合密封
- D、患者所需服用的各种稳定的固体制剂
- E、外包装上面标有药名、剂量、剂型、适应证、用量、注意事项等

答案：A

23、处方点评门诊急诊处方的抽样率不少于总处方量的()

- A、1%，且每月点评处方绝对数不应少于 100 张
- B、2%，且每月点评处方绝对数不应少于 100 张
- C、1‰，且每月点评处方绝对数不应少于 100 张
- D、1‰，且每月点评处方绝对数不应少于 200 张
- E、2‰，且每月点评处方绝对数不应少于 100 张

答案：C

24、属于肾上腺素受体激动药的平喘药物是

- A、沙美特罗
- B、胆茶碱
- C、酮替芬
- D、布地奈德
- E、曲安西龙

答案：A

25、有机磷酸酯类中毒的解救宜选用

- A、阿托品
- B、胆碱酯酶复活药
- C、足量阿托品+胆碱酯酶复活药
- D、阿托品+新斯的明
- E、毛果芸香碱+新斯的明

答案：C

26、通过阻断血管紧张素Ⅱ受体而治疗慢性心功能不全的药物是

- A、地高辛
- B、氨力农
- C、卡托普利
- D、美托洛尔
- E、氯沙坦

答案：E

27、异烟肼不具备的优点

- A、疗效高
- B、口服方便
- C、性质稳定
- D、毒性小
- E、无肝毒性

答案：E

28、关于中草药的采收原则，以下哪种说法不正确（ ）

- A、全草、茎枝及叶类药物大多在夏秋季节采集
- B、根和根茎类药材的采收季节一般在早春及深秋
- C、花类药物多在花未开放的花蕾时期或刚开时候采集
- D、果实类药物一般应在果实成熟时采集
- E、树皮和根皮类药物通常是在秋冬间剥取

答案：E

29、因注射肝素过量引起的出血宜选用何种药物

- A、氨基己酸注射液
- B、氨甲苯酸注射液
- C、酚磺乙胺注射液
- D、维生素 k1 注射液
- E、硫酸鱼精蛋白注射液

答案：E

30、根据卫生部 38 号文件《抗菌药物临床应用指导原则》（2015 年版），下列药物中不在手术预防用抗菌药物使用范围内的是（ ）

- A、头孢呋辛
- B、甲硝唑
- C、去甲万古霉素
- D、头孢唑肟

答案：D

31、关于哌替啶药理作用叙述中正确的是

- A、镇痛镇静作用较吗啡弱
- B、可引起便秘，并有止泻作用
- C、对妊娠末期子宫，有抗催产素作用
- D、不扩张血管，不引起体位性低血压
- E、提高胆道压力作用较吗啡强

答案：A

32、以下有关药源性疾病的危害的叙述中，不正确的是

- A、可致突变、癌变和畸形等
- B、可侵及人体的各个脏器和系统
- C、绝大多数可以自然减轻症状或痊愈
- D、早发现和及时治疗可以减轻症状或痊愈
- E、若不能及时发现或治疗抢救措施不力，可能造成不可逆性损害、致残，甚至死亡

答案：C

33、以下所述妊娠期不同阶段中，药物对胚胎的分化与组织器官形成的干扰最大的是

- A、妊娠 14 天起到妊娠 1 个月
- B、妊娠 20 天起到妊娠 3 个月
- C、妊娠 14 周后到妊娠 6 个月
- D、妊娠 6 个月到妊娠 9 个月
- E、产前

答案：B

34、以下有关影响新生儿口服给药吸收的因素的叙述中，不正确的是

- A、胃排空达 6~8h
- B、刚出生的足月新生儿胃液接近中性
- C、出生后左右其胃液仍接近中性
- D、生后 24~48h 胃液 pH 值下降至 1~3，然后又回升到 6~8

E、随着胃黏膜的发育，胃酸分泌才逐渐增多，4周后达成人水平

答案：E

35、灭菌制剂的验证内容不包括

- A、灭菌工艺
- B、药液过滤
- C、灌装工艺
- D、净化环境验证
- E、清洁验证

答案：E

36、现代药不包括

- A、中成药、化学药品
- B、抗生素、生化药品
- C、动物、植物和矿物药
- D、中药提取物、抗生素
- E、生化药品、中成药和毒性药品

答案：C

37、制定《处方管理办法》的目的是为了

- A、加强处方教育、调剂、使用的规范化管理
- B、提高处方质量、促进合理用药、保障患者用药安全
- C、减少工作差错、保障患者生命安全
- D、促进药品分类管理
- E、保证《药品管理法》的实施

答案：B

38、《处方管理办法》规定，处方格式由三部分组成，其中正文部分包括

- A、以Rp或R标示，分列药品名称、组分、数量、用法
- B、处方编号，Pp或R标示，分列药品名称、数量、用法用量
- C、处方编号，以Rp或R标示，临床诊断、分列药品名称、规格、用量
- D、以Rp或R标示，分列药品名称、规格、数量、用法用量
- E、临床诊断，以Rp或R标示，分列药品名称、数量、用法用量

答案：D

39、普萘洛尔的药理作用是

- A、增加冠状动脉血流量
- B、降低心肌收缩力
- C、加速心脏传导
- D、降低呼吸道阻力

E、增加糖原分解

答案：B

40、普萘洛尔对心脏最严重的不良反应不包括

A、心动过缓

B、诱发心衰

C、血压下降

D、心脏停搏

E、阵发性心动过速

答案：E

41、维生素 B12用于治疗的疾病是

A、缺铁性贫血

B、慢性失血性贫血

C、再生障碍性贫血

D、恶性贫血

E、地中海贫血

答案：D

42、执业药师资格考试属于

A、职业资格准入考试

B、主管药师资格认定考试

C、检验药学专业技术人员综合知识的考试

D、选拔负责药品质量岗位的专业技术人才的考试

E、为生产、经营企业考核质量管理人员的考试

答案：A

43、有关喹诺酮类性质和用途的叙述，错误的是

A、萘啶酸为本类药物的一代，仅用于尿路感染，其作用弱

B、吡哌酸对尿路感染有效外，用于肠道感染及中耳炎

C、三代该类药物的分子中均含氟原子

D、环丙沙星属于三代喹诺酮类抗菌药物

E、本类药物可以代替青霉素 G用于上呼吸道感染

答案：E

44、序贯试验的最大优点是

A、不需对照

B、节省人力、物力

C、不需随机

D、慢性病患者试验周期短

、适合重症患者

答案：B

45、在 β -内酰胺类抗生素中肾毒性较强的是

- A、苯唑西林
- B、阿莫西林
- C、头孢噻吩
- D、头孢噻肟
- E、青霉素 G

答案：C

46、抗心绞痛药物的主要目的是

- A、减慢心率
- B、缩小心室容积
- C、扩张冠脉
- D、降低心肌耗氧量
- E、抑制心肌收缩力

答案：D

47、关于雌激素的药理作用，不正确的是

- A、参与形成月经周期
- B、促进乳汁分泌
- C、促进二性征和性器官的发育成熟
- D、影响水盐代谢
- E、较大剂量时抑制排卵

答案：B

48、治疗深部真菌感染的首选药物是

- A、特比萘芬
- B、氟胞嘧啶
- C、咪康唑
- D、两性霉素 B
- E、酮康唑

答案：D

49、以下哪类药物一般情况下应当进行血药浓度监测

- A、抗癫痫药
- B、强心苷类药物
- C、氨基糖苷类抗菌药以及万古霉素、去甲万古霉素
- D、茶碱类药物

、以上全是

答案：E

50、原因不明的哮喘急性发作首选

- A、氨茶碱
- B、麻黄碱
- C、吗啡
- D、异丙肾上腺素
- E、肾上腺素

答案：A

51、哌唑嗪的降压机制是

- A、兴奋突触前膜 α 受体
- B、阻断突触后膜 α 受体
- C、兴奋突触后膜 α 受体
- D、阻断突触前膜 α 受体
- E、兴奋突触后膜 α 受体和突触前膜 α 受体

答案：B

52、具有首过效应的抗心律失常药为

- A、胺碘酮
- B、异丙吡胺
- C、溴苌铵
- D、异搏定
- E、恩卡尼

答案：D

53、医疗机构按照有关规定，对本机构执业医师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训。执业医师经考核合格后取得这两类药品的

- A、处方权
- B、使用权
- C、调剂权
- D、使用资格
- E、开具处方资格

答案：A

54、解热镇痛药用于解热一般不超过3日的主要原因是

- A、以免引起肝、肾损伤
- B、以免引起胃肠道的损伤
- C、特异体质者用后可能发生皮疹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496003001030010230>