

全科医学住院医师：神经内科测试题三

1、填空题 强直一阵挛发作之癫痫在发作时瞳孔（ ），角膜反射（ ）。

正确答案：扩大；消失

2、填空题 治疗三叉神经痛的首选药物为（ ）。

正确答案：卡马西平

3、单选 男性，18岁学生，不（江南博哥）出门怕见人，不去上课，纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了，难看了。说班上的同学都讥笑他，出门就感觉别人在说他，别人的眼光看他时很特别，能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他，父母不是亲生的，曾说要去做亲子鉴定。该患者的精神症状中不存在（ ）。

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 幻想性错觉

正确答案：D

4、填空题 脑电图检查对（ ）的诊断最有价值。

正确答案：癫痫

5、填空题 优势半球额下回受损可出现（ ）性失语。

正确答案：运动

6、单选 引起单瘫病变部位是（ ）。

- A. 大脑皮质
- B. 内囊
- C. 脑干
- D. 脊髓
- E. 腰膨大

正确答案：A

7、问答题 试述多发性神经病的概念及常见病因。

正确答案：多发性神经病（Polyneuropathy）是四肢对称性感觉障碍、下运动神经元瘫痪和 / 或自主神经功能障碍的临床综合征。根据原发受损部位可分为：神经轴索变性、节段性脱髓鞘和神经元病变。本病可由多种原因引起，多为全身性疾病所致。

（1）远端轴索病：多数多发性神经病属于此型，病因可为：药物、化学品、有机磷、重金属和白喉毒素中毒，慢性酒精中毒，代谢障碍性疾病引起的营养缺乏等。

（2）髓鞘病：包括吉兰-巴雷综合征，慢性炎症性脱髓鞘性神经病，白喉、某些副肿瘤及副蛋白血症及各种遗传病如异染性脑白质营养不良、Krabbe 病和 ChatcotMarie-Tooth 遗传性运动感觉神经病 1 型和 2 型（CMT1、CMT3）等。

(3) 神经元病：主要损害脊髓前角细胞或后根神经节细胞，如遗传性运动感觉神经病 2 型、维生素 B 诱发神经病及某些副肿瘤综合征等。

8、单选 患者如有感觉性共济失调是因为（ ）。

- A. 视觉障碍
- B. 前庭耳蜗刺激
- C. 浅感觉障碍
- D. 听觉障碍
- E. 深感觉发生障碍

正确答案：E

9、问答题 列表说明上运动神经元瘫痪和下运动神经元瘫痪的鉴别诊断要点。

上运动神经元和下运动神经元瘫痪鉴别诊断要点		
	上运动神经元瘫痪 (中枢性瘫痪)	下运动神经元瘫痪 (周围性瘫痪)
瘫痪分布	以整个肢体为主(单瘫、偏瘫、截瘫)	以肌群为主
肌张力	增高	减低
腱反射	增强	减低或消失
病理反射	阳性	阴性
肌萎缩	无或轻度废用性萎缩	明显
肌电图检查	神经传导速度正常，无失神经电位	神经传导速度异常，有失神经电位

正确答案：

10、问答题 试述意识障碍及其程度。

正确答案：①嗜睡：为意识障碍的早期表现。病人精神萎靡，表情淡漠，常持续处于睡眠状态，但能被唤醒，勉强配合检查及简单回答问题，停止刺激即又入睡。

②浅昏迷：仍有无意识的自发动作，对疼痛刺激有躲避反应及痛苦表情，但不能回答问题或执行简单的命令。角膜反射、瞳孔对光反射、咳嗽反射、吞咽反射、腱反射均无明显改变。

③中度昏迷：自发动作很少，对强烈疼痛刺激有躲避反应，角膜反射、光反射、咳嗽反射、吞咽反射及腱反射减弱。

④深昏迷：自发动作完全消失，对任何刺激均无反应，各种反射均消失，巴彬斯基征继续存在或消失。

11、单选 女性，30 岁，4 小时前跌伤后昏迷 5 分钟，清醒后步行回家。1 小时前因剧烈头痛，呕吐 3 次来诊。查体：昏迷，P64 次 / 分，BP180/90mmHg，R18 次 / 分，左瞳 3mm，右瞳 2mm，右侧下肢肌力 III 级。 应立即采取的检查方法是（ ）。

- A. 脑电图
- B. 脑血管造影
- C. 头部 CT
- D. 眼底检查

E. 心电图

正确答案：C

12、单选 顶叶中央后回是（）。

A. 嗅觉中枢

B. 视觉中枢

C. 听觉中枢

D. 皮质运动中枢

E. 皮质感觉中枢

正确答案：E

13、问答题 试述急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病的概念和临床诊断要点。

正确答案：急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病

（acuteinflammatorydemyelinatingpolyradiculoneuropathy）又称吉兰-巴雷（Guillain-Barré）综合征，是迅速进展而大多可恢复的运动性神经病。主要病变是周围神经广泛的炎症性脱髓鞘。本病的临床诊断根据是

①病前1~4周有感染史；

②急性或亚急性起病，四肢对称性弛缓性瘫痪；

③可有颅神经损害，常有脑脊液蛋白-细胞分离现象；④肌电图检查F波或H反射延迟或消失，神经传导速度减慢。

14、问答题 试述脑出血的临床表现。

正确答案：脑出血的临床表现主要包括：

①好发于50~70岁，多有高血压病史。

②常于活动、精神紧张或体力劳动时突然发病，症状在数分钟至数小时达高峰。

③50%病人出现剧烈头痛，常见呕吐，血压明显增高。

④神经系统的局灶性定位症状和体征明显，依出血部位和出血量不同而异，基底节、丘脑、内囊出血引起轻偏瘫是常见的早期症状。

⑤10%病例可出现痫性发作，常为局灶性。

⑥重症者迅速转入意识模糊或昏迷。

15、填空题 紧张性头痛系由于长期紧张、焦虑或疲劳所致的颈部（）持久性收缩，肌肉血液循环障碍和缺血。

正确答案：肌肉

16、单选 特发性失神发作首选（）。

A. 丙戊酸钠

B. 卡马西平

C. 乙琥胺

D. 苯妥英钠

E. ACTH

正确答案：C

17、名词解释 命名性失语

正确答案：命名性失语：选择性命名障碍，多以描述物品功能代替说不出的词，语言理解及复述基本正常，病变累及优势半球颞中回后部或颞枕交界区。

18、单选 急性脊髓炎患者 7 天后，双下肢完全瘫痪伴大小便失禁，骶部皮肤小片无痛性红肿区，无溃破，无发热。 最适宜的骶部皮肤治疗为（）。

- A. 全身应用抗生素
- B. 加大地塞米松量
- C. 留置导尿管
- D. 局部麻醉后清创
- E. 温水轻揉，涂以 3.5% 安息香酊

正确答案：E

19、问答题 试列表比较缺血性和出血性脑血管病的鉴别诊断要点。

正确答案：

缺血性和出血性脑血管病的鉴别				
	缺血性脑血管病		出血性脑血管病	
	脑血栓形成	脑栓塞	脑出血	SAH
发病年龄	多在 60 岁以上	青壮年多	55~65 岁	各年龄组均有
常见病因	动脉粥样硬化	风湿性心脏病	高血压及动脉硬化	动脉瘤、动静脉畸形
起病状态	多在安静时发病	静态变动态时发病	多在活动时发病	多在活动时发病
起病缓急	较缓	最急（秒）	急（小时）	急（分）
昏迷	较轻	少、短暂	深而持续	少、短暂、较浅
血压	正常或增高	多正常	明显增高	正常或增高
头痛	无	少有	有	剧烈
呕吐	少见	少见	多见	多见
偏瘫	多见	多见	多见	无
颈强直	无	无	可有	明显
脑脊液	多正常	多正常	均匀一致血性	洗肉水样
脑 CT	低密度区	低密度区	高密度区	蛛网膜下腔高密度影

20、填空题 MG 主要临床特征是受累肌肉连续收缩后发生严重无力甚至瘫痪，经短期休息后又可好转，因此症状呈现出（）的波动性变化。

正确答案：晨轻暮重

21、填空题 额桥束损害可产生对侧肢体（）。

正确答案：共济失调

22、填空题 按 0~5 级分级法检查时，病人的肢体能对抗地心引力而抬离床面，但不能对抗阻力者，肌力为（）级。

正确答案：3

23、填空题 原裂前方的部分称为（），在进化上出现较晚，故又称旧小脑。

正确答案：小脑前叶

24、问答题 脑电图检查有何意义？

正确答案：脑电图是借助电子放大技术，将脑部自发性生物电位放大 100 万倍描记于纸上。脑电图检查可发现脑部的弥漫性或局限性损害。对癫痫、脑炎、脑瘤及脑血管疾病等有一定的诊断价值，特别对癫痫诊断帮助尤大。癫痫病人可有异常脑电活动，如出现棘波、尖波，棘-慢复合波，尖-慢复合波或爆发性节律等病理波。

25、问答题 列表说明缺血性和出血性脑血管病的鉴别。

缺血性和出血性脑血管病的鉴别诊断				
	缺血性脑血管病		出血性脑血管病	
	脑血栓形成	脑栓塞	脑出血	蛛网膜下腔出血
发病年龄	多在 60 岁以上	青壮年多	55~65 岁	各年龄组均有
常见病因	动脉粥样硬化	风湿性心脏病	高血压及动脉硬化	动脉瘤、血管畸形、动脉硬化
起病时状态	多在安静时	不定	多在活动时	多在活动时
起病缓急	较缓(日)	最急(秒)	急(小时)	急(分)
昏迷	较轻	少、短暂	深而持续	少、短暂、较浅
头痛	无	少有	有	剧烈
呕吐	少见	少见	多见	多见
血压	正常或增高	多正常	明显增高	正常或增高
偏瘫	多见	多见	多见	无
颈强直	无	无	多有	多明显
脑脊液	多正常	多正常	血性、压力高	血性压力高
CT 检查	脑内低密度区	脑内低密度区	脑内高密度区	蛛网膜下腔可见高密度影

正确答案：

26、填空题 AIDS 中枢神经系统机会性感染（）、（），病毒感染和细菌感染。

正确答案：脑弓形虫病；新型隐球菌性脑膜炎

27、填空题 肝豆状核变性又称 wilson 病，是一种常染色体隐性遗传的（）代谢障碍性疾病。

正确答案：铜

28、填空题 额中回后部有侧视中枢，病损时两眼向病灶（）侧同向斜视，刺激性病损两眼向病灶（）侧同向斜视。

正确答案：同；对

29、问答题 试述脑出血的病因和发病机制。

正确答案：

病因：主要是高血压和动脉硬化（85%左右）。其他少见的病因有：脑血管畸形、脑动脉瘤、血液病、脑动脉炎、抗凝治疗、淀粉样血管病、肿瘤侵袭血管壁破裂出血等。发病机制：持续高血压和脑内小动脉硬化使出血部位的血管发生玻璃样变而形成微小动脉瘤；加之脑内动脉外膜不发达，无外弹力层，中层肌细胞少，管壁较薄，大脑中动脉与其所发出的深穿支一豆纹动脉呈直角。因此当劳累用力或情绪改变等因素使血压骤然升高时，易致动脉破裂出血。

30、单选 某中年人，童年生活受挫折，个性克制，情绪压抑，经常焦虑、抑郁，又不善于宣泄，过分谨慎，强求合作调和。他的行为模式最容易患的躯体疾病是（）。

- A. 冠心病
- B. 脑出血
- C. 慢性结肠炎
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 癌症

正确答案：E

参考解析：C型行为性格的人如果长期处于孤独、矛盾或抑郁情况下，患癌症的机率较高。

31、单选 当某一感官处于功能状态时，另一感官出现幻觉，此现象是（）。

- A. 功能性幻觉
- B. 内脏性幻觉
- C. 假性幻觉
- D. 反射性幻觉
- E. 原始性幻觉

正确答案：D

参考解析：反射性幻觉是指当某一感官处于功能活动状态时，出现涉及另一感官的幻觉。

32、填空题 短暂性脑缺血发作是指脑血管病损所致短暂的局灶性脑功能障碍。症状突起又迅速消失，一般持续数分钟至数十分钟，并在（）小时内缓解，不留任何后遗症。

正确答案：24

33、问答题 简述MG的诊断及治疗要点。

正确答案：MG的诊断及治疗要点：

（1）诊断：

- ①起病隐袭，首发症状多为一侧或双侧眼外肌麻痹，重者眼球运动明显受限，瞳孔括约肌一般不受累。
- ②受累肌肉呈病态疲劳，连续收缩后发生严重无力甚至瘫痪，短期休息后可好转，晨轻暮重。
- ③多累及眼外肌及其他颅神经支配的肌肉、四肢及躯干肌，一般平滑肌和膀胱

括约肌均不受累。

④疲劳试验。

⑤高滴度. AChR-Ab。

⑥神经重复低频刺激阳性。

⑦抗胆碱酯酶药物试验。

(2) 治疗:

①抗胆碱酯酶药物: 新斯的明、吡啶斯的明等。

②病因治疗. A. 肾上腺皮质类固醇类. B. 免疫抑制剂; C. 血浆置换; D. 免疫球蛋白. E. 胸腺切除。

34、单选 患者, 男性, 58 岁, 进行性人格改变和智能减退 2 年。患者于 2 年前开始缓慢出现人格改变, 性格变得内向、孤僻和吝啬, 并出现记忆力减退, 对刚发生的事情不能记忆。近来出现幻听和幻视。查体发现精神抑郁, 注意力涣散, 记忆力、定向力和计算力均减退, 行动迟缓。其他未见神经系统定位体征。头颅 MRI 发现脑萎缩, 脑室系统扩大。 本患者应考虑 ()。

- A. 血管性痴呆
- B. 阿尔茨海默病
- C. 路易体痴呆
- D. Pick 病
- E. 多系统萎缩

正确答案: B

35、单选 患者, 女, 25 岁, 工人。发热、腹部不适、疲乏、恶心、食欲不振、尿色变黄 6 天。体检发现巩膜中度黄染, 肝肋下 2cm 可扪及, 质软, 无明显触痛。周围血液 RBC $4.0 \times 10^{12} / L$, WBC $8.3 \times 10^9 / L$, Hb $138 g / L$, 血清 ALT $740 U / L$, 总胆红素 $84 \mu mol / L$ 。 该病例最可能的诊断是 ()。

- A. 急性胆道感染
- B. 钩体病
- C. 恙虫病
- D. 病毒性肝炎
- E. 败血症

正确答案: D

36、填空题 AIDS 继发性中枢神经系统肿瘤: () 瘤, Kaposi 肉瘤。

正确答案: 淋巴

37、单选 特发性大发作首选 ()。

- A. 丙戊酸钠
- B. 卡马西平
- C. 乙琥胺
- D. 苯妥英钠
- E. ACTH

正确答案: A

38、单选 小脑病变出现 ()。

- A. 跨阈步态
- B. 醉汉步态
- C. 慌张步态

- D. 剪刀样步态
- E. 划圈样步态

正确答案：B

39、单选 阿尔茨海默病的早期症状主要为（）。

- A. 性格改变
- B. 记忆减退
- C. 情绪急躁易怒
- D. 幻觉
- E. 妄想

正确答案：B

参考解析：近记忆障碍为首发及最明显的症状。

40、单选 女性，35岁，35分钟前自汽车上跌下，左枕部着地，伤后昏迷不醒，枕部头皮挫伤，双瞳孔散大，对光反射弱，四肢强直，双下肢病理征阳性。在急诊室输20%甘露醇250ml后，左瞳孔缩小。进一步急救措施是（）。

- A. 左侧颞肌下减压
- B. 右侧颞肌下减压
- C. 枕部开颅减压术
- D. 右额开颅血肿清除
- E. 左额开颅血肿清除

正确答案：B

参考解析：患者左枕部外伤后出现双侧瞳孔散大，说明病人已出现脑疝。经脱水治疗后，左侧瞳孔缩小，结合左枕着地，说明损伤在右侧，应手术治疗行右侧颞肌下减压。

41、单选 皱额不能（）。

- A. 动眼神经损害
- B. 外展神经损害
- C. 三叉神经损害
- D. 面神经损害
- E. 舌下神经损害

正确答案：D

42、单选 延髓外侧面（）。

- A. 大脑前动脉供血
- B. 大脑后动脉供血
- C. 大脑中动脉供血
- D. 基底动脉供血
- E. 椎动脉供血

正确答案：E

43、填空题 癫痫持续状态的药物治疗时应首选（）。

正确答案：静脉注射安定

44、单选 关于谵妄病人的说法，正确的是（）。

- A. 会发生冲动行为但不会有自伤
- B. 常有恐怖性的视幻觉
- C. 主要是意识范围障碍
- D. 不会产生被害妄想
- E. 突然变得安静，说明病情可能加剧

正确答案：B

参考解析：患者常因此产生紧张、恐惧的情绪反应。

45、单选 女性，64岁，右侧轻偏瘫2天，血压180/120mmHg，头CT左基底区小低密度灶。诊断为（）。

- A. 腔隙性脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 高血压脑病
- D. 壳核出血
- E. 脑栓塞

正确答案：A

46、填空题 MS治疗药物有（）、 α -干扰素、免疫球蛋白和免疫抑制剂。

正确答案：皮质醇激素

47、问答题 试述多发性硬化的概念和治疗方法。

正确答案：多发性硬化是一种中枢神经系统脱髓鞘疾病，起病常在成年早期，具有一种迁延的、不规则的、有时是每况愈下的病程，但倾向于阵发性地复发和缓解。由于脑和脊髓内存在着多灶的脱髓鞘斑，临床表现常为分布广泛的神经系统功能缺失。由于本病病因未明，至今尚无特殊疗法。下列治疗方案可取：

- （1）休息：发作期应卧床休息，以免加剧。
- （2）免疫抑制剂：泼尼松每日40~60mg口服或ACTH每日40~80U静脉或肌肉注射。其他免疫抑制剂如环磷酰胺、硫唑嘌呤和抗淋巴细胞球蛋白等无甚裨益。
- （3）康复治疗：对瘫痪的肢体进行功能训练。
- （4）对症措施：如痉挛、尿急、尿失禁等的处理。

48、问答题 试述急性脊髓炎的临床表现。

正确答案：（1）病前常有上呼吸道感染症状，或有疫苗接种史。

（2）急性起病，较早出现脊髓休克，即损害平面以下肢体瘫痪，肌张力降低，腱反射消失，病理反射不能引出。

（3）损害平面以下传导束型感觉障碍和大小便障碍。

（4）腰椎穿刺检查，脑脊液压力不高，白细胞数正常或稍增高，以淋巴细胞为主。一般无椎管梗阻现象，一即奎氏试验通畅。

49、问答题 试述Alzheimer病的临床表现和主要治疗方法。

正确答案：（1）临床表现：Alzheimer 病（AD. 是发生在老年期的中枢神经系统变性疾病. 是痴呆最常见的病因，其临床特点为：

①一般隐袭起病，持续、进行性发展的智能衰退，病程 5~10 年。

②早期显著的情景性记忆障碍，先近记忆障碍，随后远记忆受损、时间及地点定向障碍。

③认知障碍和视空间功能障碍，表现为掌握新知识、运用语言及社交能力下降，理解和判断能力下降，口语量减少，找词困难，算错账，付错钱，迷路等。

④可出现人格改变和精神障碍。

⑤早期一般无神经科的阳性体征，晚期出现锥体系和锥体外系的体征如动迟缓、肌强直、震颤、屈曲体姿等。

⑥头部 MRI 发现海马、内嗅皮层萎缩。

（2）治疗方法：目前尚无特殊治疗。一般选用乙酰胆碱酯酶（ACHE. 抑制剂安理申（Aricept）、艾斯能以及谷氨酸受体拮抗剂美金刚以改善认知功能。亦可选用脑血液循环促进剂和脑细胞代谢激活剂治疗，如二氢麦角碱、银杏叶提取物、尼莫地平、吡拉西坦（脑复康）、二甲磺酸阿米三嗪 / 阿吗碱（都可喜）等。

50、填空题 三叉神经痛患者口角、鼻翼、颊部和舌部为敏感区，轻触即可诱发，称为“（ ）”。

正确答案：扳机点

51、单选 肝素、双香豆素（ ）。

- A. 脑保护剂
- B. 抗凝治疗
- C. 溶栓治疗
- D. 血液稀释疗法
- E. 脑代谢活化剂

正确答案：B

52、填空题 MS 临床特征是（ ）的多发性和（ ）上的多发性。

正确答案：病灶部位；时间

53、单选 女性，30 岁，4 小时前跌伤后昏迷 5 分钟，清醒后步行回家。1 小时前因剧烈头痛，呕吐 3 次来诊。查体：昏迷，P64 次 / 分，BP180/90mmHg，R18 次 / 分，左瞳 3mm，右瞳 2mm，右侧下肢肌力 III 级。 应立即采取的急救措施是（ ）。

- A. 应用促苏醒剂
- B. 应用降血压药
- C. 亚低温治疗
- D. 严密观察病情变化
- E. 静滴甘露醇，同时作开颅准备

正确答案：E

54、单选 谵妄综合征的主要特征为（）。

- A. 意识障碍昼轻夜重
- B. 幻觉
- C. 注意涣散
- D. 记忆减退
- E. 错觉

正确答案：A

参考解析：谵妄是一组表现为急性、一过性、广泛性的认知障碍，尤以意识障碍为主要特征。因急性起病、病程短暂、病变发展迅速，故又称急性脑综合征。意识障碍有明显的昼夜节律改变，表现为昼轻夜重。

55、填空题 皮质延髓束受损出现（）反射亢进等脑干病理征。后期伴有强哭、强笑呈现典型的真、假球麻痹并存表现。

正确答案：下颌

56、单选 进行性肌营养不良表现为（）。

- A. 四肢无力，血钾减低
- B. 四肢无力，脑脊液蛋白细胞分离
- C. 四肢无力，手套、袜套样感觉障碍
- D. 四肢无力，休息后减轻，活动后加重
- E. 四肢无力，肩胛带、骨盆带萎缩

正确答案：E

57、单选 供应枕叶血液的血管是（）。

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑后动脉
- C. 大脑前动脉
- D. 椎动脉
- E. 基底动脉

正确答案：B

58、单选 颅内压增高的三大主征是（）。

- A. 头痛、视力下降、恶心
- B. 头痛、偏瘫、抽搐
- C. 偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍
- D. 血压升高、脉搏变快、呼吸变快
- E. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿

正确答案：E

参考解析：头痛、呕吐、视神经乳头水肿为颅内压增高的三主征。

59、单选 关于急性脑血管病的病因，下列何者是不正确的（）。

- A. 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化

- B. 脑栓塞最常见的病因是风心病合并房颤或其他的心源性栓子脱落
- C. 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
- D. 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
- E. 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化

正确答案：C

参考解析：这道题是记忆题，考核学生对急性脑血管病的病因的了解与掌握。常见的错误：C 以外的其他任何选项，错选 E 者多见。错误辨析：基础知识掌握不准确。本题考查的是急性脑血管病的最常见病因。脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化；脑栓塞最常见的病因是心源性的栓子脱落；脑血栓形成和短暂性脑缺血发作最常见的病因是动脉粥样硬化，动脉炎也是脑血栓的病因，但不是最常见病因；先天性颅内动脉瘤是蛛网膜下腔出血的最常见病因。要点：正确理解和掌握急性脑血管病的病因。

60、问答题 三叉神经痛可采用哪些方法治疗？

正确答案：（1）抗癫痫药治疗：①卡马西平（CarbamazepinE.：为首选药，开始 0.1g，每天 3 次，以后每天增加 0.1g，直到疼痛停止，最大剂量不超过 1.0g / d，疼痛停止后逐渐减量，采用出最小有效维持量。②苯妥英钠：开始用 0.1g，每天 3 次，无效每天可增加 0.05g，数天后加至每天 0.6 克。有些病例，卡马西平合并苯妥英钠比单独用好。③以上两药无效，可试用氯硝西泮（clonazepam）6~8mg / d 口服。

（2）其他药物治疗：如巴氯芬及大剂量（1000~3000 μg）维生素 B 肌肉注射均可使用。哌咪清治疗顽固性三叉神经痛疗效优于卡马西平。

（3）封闭疗法。

（4）经皮半月神经节射频电凝疗法。

（5）手术治疗。

61、单选 男性，68 岁，查体示心底部有舒张期哈气样杂音，以胸骨右缘第 2 肋间最响，第二心音亢进，血压 170/90mmHg，胸片提示主动脉增宽扭曲，心影靴形，最可能的诊断是（）。

- A. 先天性心脏病，二叶式主动脉瓣
- B. 风湿性主动脉瓣关闭不全
- C. 主动脉粥样硬化，主动脉瓣关闭不全
- D. 肺动脉高压，相对肺动脉瓣关闭不全
- E. 高血压性心脏病

正确答案：C

62、填空题 三叉神经痛严重者伴有面部肌肉的反射性抽搐，口角牵向患侧，称为（）。

正确答案：痛性抽搐

63、单选 男性，58 岁，高血压病史，左偏身痛觉减退 1 周来诊，头 CT 示右基底核小低密度灶（0.5cm）。诊断为（）。

- A. 腔隙性脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 高血压脑病
- D. 壳核出血
- E. 脑栓塞

正确答案：A

64、问答题 简述急性脊髓炎的诊断要点。

正确答案：急性脊髓炎的诊断要点：

- (1) 病前感染史和急性起病。
- (2) 症状：运动障碍、感觉障碍和自主神经功能障碍。
- (3) 体征：脊髓休克，病变以下感觉消失和大小便潴留。
- (4) 辅助检查：脑脊液、肌电图、脊髓 MRI。

65、填空题 MS 的可能是遗传易感个体与（）因素作用而发生的自身免疫过程。

正确答案：环境

66、问答题 试述短暂性脑缺血发作的临床特征和意义。

正确答案：短暂性脑缺血发作（TIA）的临床表现根据缺血部位和范围不同而多种多样，但有共同的临床特征：

- ①发作突然。
- ②持续时间短暂，发作持续数分钟或十余分钟后缓解，最长不超过 24 小时。
- ③恢复完全，一般不遗留神经功能缺损。
- ④常反复发作，每次发作症状相似，提示每次发作均涉及相同的某一动脉供应的脑功能区。近期频繁 TIA 是脑醒死的高危因素。

67、单选 思维破裂是（）。

- A. 联想结构障碍
- B. 联想速度障碍
- C. 联想数量障碍
- D. 联想自主性障碍
- E. 联想形式障碍

正确答案：A

68、单选 多用于精神分裂症的药物是（）。

- A. 吩噻嗪类药物
- B. 抑制 5-HT 再摄取的药物
- C. 苯二氮䓬类药物
- D. 锂盐
- E. 卡马西平

正确答案：A

参考解析：

吩噻嗪类药物如氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪、氟奋乃静、甲硫哒嗪等，用于精神分裂症。

69、单选 幻觉的定义是（）。

- A. 对客观事物的错误感受
- B. 对客观事物的歪曲
- C. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- D. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E. 缺乏客观刺激时的思维过程

正确答案：C

参考解析：幻觉是一种虚幻的感知，是在客观现实中并不存在某种事物的情况下，病人却感知有所存在。

70、多选 病毒性脑膜炎常见的症状是（）。

- A. 发热
- B. 头痛
- C. 脑膜刺激征
- D. 全身中毒症状
- E. 严重的脑实质受损的症状

正确答案：A, B, C, D

71、单选 优势半球额叶损害引起（）。

- A. 运动性失语
- B. 失读
- C. 命名性失语
- D. 痛觉缺失
- E. 体象障碍

正确答案：A

72、单选 一帕金森病患者，服用“美多巴”1 年余，近 1 周开始出现阵发性行动迟缓、肢体震颤加重，多于中午、晚上服药前出现。关于该病描述不正确的是（）。

- A. CT 可见大脑皮质萎缩
- B. 铜蓝蛋白降低
- C. 角膜可见 K—F 环
- D. 血清铜水平降低
- E. 24 小时尿铜降低

正确答案：E

73、多选 原发性癫痫的特点是（）。

- A. 病年龄较小
- B. 脑内未发现器质性病变
- C. 以全面性发作为主

D. 以部分性发作为主

E. 因大脑半球病变引起的癫痫发作

正确答案：A, B, C, D

74、问答题 试述蛛网膜下腔出血的病因。

正确答案：蛛网膜下腔出血的病因以先天性颅内动脉瘤最常见。脑血管畸形及高血压脑动脉硬化次之。其他较少见的病因还有：脑基底异常血管网症（烟雾病）、各种感染引起的动脉炎、肿瘤破坏血管、血液疾病、结缔组织疾病等。部分病例原因未明。

75、单选 癫痫（）。

A. 用抑制胆碱能活性药物

B. 不宜用抑制胆碱能活性药物和增强多巴胺活性的药物

C. 用增强多巴胺活性的药物

D. 用丙戊酸钠或卡马西平

E. 用抑制胆碱能活性药物和增强多巴胺活性的药物

正确答案：D

76、填空题 延髓外侧综合征又称小脑下后动脉综合征，常见于（）动脉闭塞或部分梗死所致。

正确答案：小脑下后

77、填空题 PD 临床以静止性（）、运动迟缓、肌（）和姿势步态异常为主要特征。

正确答案：震颤；强直

78、问答题 简述脊髓小脑性共济失调（SCA）的临床表现。

正确答案：脊髓小脑性共济失调（SCA）的临床表现：高度的异质性，各亚型表现相似，又有各自特点，但相互重叠。常染色体显性遗传家族史，有早现遗传现象；多最早出现下肢共济失调，表现为醉汉步态、站立不稳，逐渐波及上肢，双手笨拙意向性震颤，甚至发音困难、吟诗状语言等，查体可见有眼球震颤、指鼻不准、Romberg 征阳性、跟膝胫试验不准、肌张力障碍、腱反射亢进、病理征（如 Babinski 征）阳性、深感觉及本体感觉消失等；甚至病程中可逐渐出现痴呆、肌肉萎缩、眼外肌麻痹等。

79、单选 颞叶内侧面钩回是（）。

A. 嗅觉中枢

B. 视觉中枢

C. 听觉中枢

D. 皮质运动中枢

E. 皮质感觉中枢

正确答案：A

80、单选 急性脊髓炎患者 7 天后，双下肢完全瘫痪伴大小便失禁，骶部皮肤小片无痛性红肿区，无溃破，无发热。该骶部小片病变最可能是早期的（）。

A. 丹毒

- B. 疱疹
- C. 褥疮
- D. 骨髓炎
- E. 结核

正确答案：C

81、单选 关于精神分裂症的临床特点，错误的是（）。

- A. 多数在青壮年发病
- B. 自知力丧失
- C. 联想障碍，妄想、幻觉是重要的早期表现
- D. 偏执型是最常见类型
- E. 病程多迁延，预后不佳

正确答案：C

参考解析：精神分裂症在临床划分为几个亚型，单纯型则以阴性症状为临床特征。

82、单选 男，30岁，约一年时间孤僻、寡言，近期由于被上级批评后出现失眠，不上班并紧闭门窗，声称有人监视自己，在家中不敢谈话，说家中已被安装窃听器，公安局也要逮捕自己，不吃妻子做的饭食，认为妻子已同他人合伙在饭菜中放了毒药，因此殴打妻子。除药物治疗外要注意的是（）。

- A. 说服病人放弃怀疑
- B. 外出旅行、疗养
- C. 防止发生意外
- D. 更换工作单位
- E. 请上级、同事改变对病人的态度

正确答案：C

83、问答题 简述AD的诊断要点。

正确答案：AD的诊断要点：

- （1）多于65岁以后隐匿起病。
- （2）症状：记忆障碍、认知障碍、精神障碍。
- （3）体征：无感觉障碍和锥体束征。
- （4）辅助检查：CSF多正常，EEG可有广泛慢波，CT和MRI检查可见侧脑室扩大和脑沟增宽，尤其是额颞叶，MRI冠状切面可显示海马萎缩。

84、单选 闭眼困难（）。

- A. 动眼神经损害
- B. 外展神经损害
- C. 三叉神经损害
- D. 面神经损害
- E. 舌下神经损害

正确答案：D

85、单选 45 岁男性，经理，送来急诊，自述半小时前突然感到气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗，认为生命垂危，要求紧急处理。近 1 个月来这种情况发生过 3 次，每次持续 0.5~1 小时，发病间隙期一切正常，发病与饮食无明显关系。最适宜的急诊处理是（）。

- A. 输入葡萄糖
- B. 输入氧气
- C. 暗示治疗
- D. 抗癫痫药
- E. 安定注射

正确答案：E

86、单选 引起双下肢痉挛性瘫病变部位是（）。

- A. 大脑皮质
- B. 内囊
- C. 脑干
- D. 胸髓
- E. 腰膨大

正确答案：D

87、单选 对麦角胺咖啡因无效的偏头痛可用（）。

- A. 非甾体药物（吲哚美辛）
- B. 发作早期给麦角胺咖啡因
- C. 5-羟色胺受体激动剂
- D. 普萘洛尔、苯噻啶等药物
- E. 皮质类固醇

正确答案：C

88、填空题 周围性面神经瘫痪病变在茎乳孔内鼓索神经近端，可有（）味觉的减退或消失。

正确答案：舌前 2 / 3

89、填空题 SAH 患者需要绝对卧床（）周，避免一切可引起血压及颅压增高的诱因。

正确答案：4~6

90、单选 不常发作但很强烈的偏头痛应用（）。

- A. 非甾体药物（吲哚美辛）
- B. 发作早期给麦角胺咖啡因
- C. 5-羟色胺受体激动剂
- D. 普萘洛尔、苯噻啶等药物
- E. 皮质类固醇

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496132001240010132>