

2024 年广西壮族自治区忻城县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库（有一套）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性（）

- A: 环磷酰胺
- B: 巯嘌呤
- C: 纳武利尤单抗
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

2. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 红霉素
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

3. 治疗良性前列腺增生症宜选用

- A: 托特罗定
- B: 尼莫地平
- C: 坦洛新
- D: 利血平

答案：C

4. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A: 维生素 C
- B: 鱼精蛋白
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

答案：B

5. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

- A: 头孢克洛
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢替安
- D: 头孢吡肟

答案：A

6. (2017 年真题) 眼部病毒感染宜选用 ()

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 氯霉素滴眼剂

答案：A

7. 属于 β_2 受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 乙酰胆碱
- C: 福莫特罗
- D: 孟鲁司特

答案：C

8. 与其他抗结核病药联合应用的是

- A: 链霉素
- B: 奈替米星
- C: 庆大霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

9. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

- A: 成人初始剂量 25~50 μg ，一日 1 次
- B: 可用于呆小病的治疗
- C: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰
- D: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

答案：C

10. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案,正确的是()

- A: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染
- B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- D: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗

答案：B

11. 患者，女性，62 岁，有高血压病史 14 年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 维拉帕米
- D: 尼莫地平

答案：C

12. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

- A: 胆汁
- B: 肝
- C: 脑
- D: 肺

答案：C

13. 可使人体对维生素 B

- A: 丙磺舒
- B: 糖皮质激素
- C: 异烟肼
- D: 雌激素

答案：A

14. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案：D

15. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺素的生物合成
- B: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- C: 抑制 Na^+-K^+ 泵
- D: 抑制碘泵

答案：A

16. 聚乙二醇 4000 可用于

- A: 成人及 1 岁以上儿童（包括 1 岁）便秘
- B: 果糖不耐受儿童
- C: 炎症性肠病患者
- D: 哺乳期便秘

答案：D

17. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 埃索美拉唑
- C: 硝苯地平缓释片

D: 克拉霉素

答案：B

18. 组胺 H

A: 消化性溃疡

B: 失眠

C: 肠激惹综合征

D: 变态反应性疾病

答案：A

19. (2018 年真题) 患者, 女, 28 岁, 因 “多汗、心慌、消瘦、易怒半月余” 就诊, 实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高, TSH 降低, 甲状腺 I 度肿大, 心率 92 次/分, 诊断为 “甲状腺功能亢进症” 简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg, 一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg, 日 3 次。患者 1 月后复查, FT3 和 FT4 恢复正常, 但出现膝关节疼痛。

A: 哺乳期妇女禁用甲巯咪唑

B: 哺乳期妇女应停止甲亢的治疗

C: 哺乳期妇女禁用普萘洛尔

D: 哺乳期妇女可选用丙硫氧嘧啶

答案：D

20. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游, 出发前, 准备选购以下治疗腹泻的药物备用, 包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺, 小檗碱。

A: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

B: 口服补液盐使用方便、价格低廉, 发生腹泻时如能口服, 应尽早使用

C: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

D: 口服补液盐是复方制剂，I、II 代表不同的配方

答案：A

21. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

A: 绦虫病

B: 蛲虫病

C: 疟疾

D: 蛔虫病和蛲虫病

答案：D

22. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

A: 呋塞米

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 甘露醇

答案：C

23. 溶栓药的使用禁忌证不包括

A: 月经期间

B: 既往有出血性脑卒中史

C: 活动性内脏出血

D: 1 年内有缺血性脑卒中或脑血管事件

答案：A

24. 临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

C: 地高辛

D: 洋地黄毒苷

答案：C

25. 治疗勃起功能障碍药的是

A: 他达拉非

B: 氯地孕酮

C: 达那唑

D: 左炔诺孕酮

答案：A

26. 利那洛肽为泻药的作用机制是

A: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

B: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

C: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

D: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

答案：D

27. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

A: 地高辛

- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：A

28. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

- A: 慢性胃炎
- B: 骨髓功能抑制者
- C: 心肝肾功能严重障碍者
- D: 妊娠期妇女

答案：A

29. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性

- A: 卡莫司汀
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 巯嘌呤

答案：B

30. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 四氢叶酸
- B: 叶酸
- C: 维生素 B
- D: 硫酸亚铁

答案：D

31. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A: 氯丙嗪
- B: 阿司匹林
- C: 地西泮
- D: 硫喷妥钠

答案：C

32. 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是

- A: 抗生素相关性腹泻
- B: 红人综合征
- C: 肌肉震颤
- D: 急性溶血性贫血

答案：A

33. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 可作为术后预防呕吐的常规用药
- B: 对化疗所致的呕吐有效
- C: 对泌乳素的分泌无影响
- D: 无心脏不良反应

答案：C

34. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 磺胺甲唑
- C: 呋喃妥因
- D: 甲氧苄啶

答案：D

35. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是 ()

- A: 兴孢他啶
- B: 阿莫西林
- C: 磺胺嘧啶
- D: 林可霉素

答案：C

36. 可用于骨和关节感染的药物是 ()

- A: 青霉素
- B: 万古霉素
- C: 林可霉素
- D: 四环素

答案：C

37. 可引起胃肠道出血的是 ()

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：A

38. 预防急性肾功能衰竭可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：D

39. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

- A: 地芬诺酯
- B: 酚酞
- C: 莫沙必利
- D: 双八面体蒙脱石

答案：A

40. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

- A: 维拉帕米
- B: 美托洛尔
- C: 地尔硫革
- D: 胺碘酮

答案：D

41. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 肌酸激酶
- B: 乳酸脱氢酶
- C: 碱性磷酸酶
- D: 尿淀粉酶

答案：A

42. （2016 年真题）可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

- A: 硫酸镁
- B: 乳酸钠
- C: 氯化钾
- D: 谷氨酸

答案：B

43. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 恩替卡韦
- B: 金刚烷胺
- C: 更昔洛韦
- D: 阿昔洛韦

答案：A

44. 乙胺丁醇的抗结核杆菌作用原理是

- A: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- B: 抑制分枝菌酸合成
- C: 抑制蛋白质合成
- D: 抑制 RNA 多聚酶

答案：A

45. 大剂量碘剂

- A: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- B: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- C: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：C

46. 应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时，可应用的急救药物是()

- A: 维生素 K
- B: 维生素 B
- C: 维生素 K
- D: 维生素 K

答案：D

47. 属于长效 β_2 受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 特布他林
- C: 噻托溴铵
- D: 福莫特罗

答案：D

48. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是

- A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- B: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍
- C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- D: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案：D

49. 对视网膜的功能起重要作用的是

- A: 视黄醇
- B: 视黄酸
- C: 视黄醛
- D: 维生素 A

答案：D

50. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

- A: 依那普利
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 米力农

答案：A

51. 维生素 C 可使其代谢降低，作用增加的是

- A: 丙磺舒
- B: 雌激素
- C: 异烟肼
- D: 糖皮质激素

答案：D

52. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP2E1
- B: CYP2C19
- C: CYP1A2
- D: CYP2D6

答案：B

53. 长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用()

- A: 高血钾
- B: 满月脸
- C: 溃疡或出血穿孔

D: 肾上腺皮质萎缩

答案：A

54. (2017 年真题) 服用后可能导致口中有氨味、舌苔、大便呈灰黑色的药物是 ()

A: 硫糖铝

B: 奥美拉唑

C: 枸橼酸铋钾

D: 西咪替丁

答案：C

55. 以下不属于强心苷的禁忌证的是 ()

A: 预激综合征伴心房颤动或扑动

B: 室性心动过速、心室颤动

C: 梗阻性肥厚型心脏病

D: 慢性收缩性心力衰竭

答案：D

56. 利多卡因的电生理作用错误的是 ()

A: 缩短 APD

B: 显著减慢传导

C: 降低自律性

D: ERP 相对延长

答案：B

57. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

。

- A: 长期口服给药
- B: 短期口服给药
- C: 注射给药
- D: 注射与口服并用

答案：B

58. 可减弱吲达帕胺降压作用的是

- A: 拟交感药
- B: 胺碘酮
- C: 考来烯胺
- D: 多巴胺

答案：A

59. 单纯疱疹病毒感染的首选药是

- A: 金刚烷胺
- B: 碘苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 干扰素

答案：C

60. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- D: 直接补充胰岛素

答案：A

61. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血清铁蛋白
- B: 血小板数量
- C: 网织红细胞计数
- D: 血红蛋白测定

答案：B

62. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 低氯性碱中毒机会增加
- B: 耳毒性增加
- C: 引起电解质紊乱的概率增加
- D: 利尿作用减弱

答案：B

63. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

- A: 伯氨喹
- B: 乙胺嘧啶
- C: 青蒿素
- D: 奎宁

答案：B

64. 影响骨和牙齿生长的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 左氧氟沙星

D: 四环素

答案：D

65. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 ()

A: 四环素可的松眼膏剂

B: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

C: 1%硫酸阿托品眼膏剂

D: 2%后马托品眼膏剂

答案：C

66. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: G0 期

B: M 期

C: G1 期

D: S 期

答案：D

67. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

A: 硝苯地平

B: 绒促性素

C: 米非司酮

D: 噻嘧啶

答案：B

68. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

A: 氯苯那敏

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 多潘立酮

答案: B

69. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

A: 帕洛诺司琼

B: 劳拉西泮

C: 甲氧氯普胺

D: 氯丙嗪

答案: A

70. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

A: 头孢曲松

B: 头孢哌酮

C: 阿米卡星

D: 替考拉宁

答案: D

71. 竹红菌甲素属于

A: 肾上腺皮质激素类

B: 其他光敏剂

C: 重金属元素及其化合物

D: 补骨脂素及其衍生物

答案: B

72. 治疗可能引起中枢神经系统毒性，包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作，故不应用于治疗脑膜炎的是

- A: 美罗培南
- B: 厄他培南
- C: 西司他丁
- D: 亚胺培南

答案：D

73. 使用时可引起单抗药综合征的是

- A: 曲妥珠单抗
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 阿那曲唑

答案：A

74. 唑类抗真菌药()

- A: 两性霉素
- B: 氟康唑
- C: 特比萘芬
- D: 阿莫罗芬

答案：B

75. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

- A: 服药后第 3 个月
- B: 服药后第 4 周
- C: 服药后第 6 个月
- D: 服药后第 2 周

答案：B

76. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 噻氯匹定
- D: 华法林

答案：D

77. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

- A: 20%甘露醇
- B: 奥布卡因
- C: 碘苷
- D: 阿托品

答案：C

78. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

- A: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- B: 洋地黄毒苷
- C: 地高辛
- D: 毛花苷丙（西地兰 C）

答案：B

79. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

- A: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用
- B: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应
- C: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

D: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

答案：A

80. 抗骨吸收作用由弱到强排列正确的是

A: 阿仑膦酸钠

B: 氯屈膦酸二钠

C: 依替膦酸二钠

D: 帕米膦酸二钠

答案：B

81. 单纯餐后血糖升高的首选治疗药物是()

A: 二甲双胍

B: 格列本脲

C: 阿卡波糖

D: 格列齐特

答案：C

82. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

A: 鱼精蛋白

B: 葡萄糖酸钙

C: 维生素 K

D: 氨基己酸

答案：D

83. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 5-HT

B: 5-HT

C: 每日化疗前，应用 5-HT

D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案：C

84. 冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

A: 150~300mg

B: 25~50mg

C: 75~150mg

D: 10~25mg

答案：B

85. 作用优于磺酰脲类，适用餐后血糖升高的治疗药是

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 格列本脲

D: 格列齐特

答案：B

86. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

A: 维生素 K1

B: 鱼精蛋白

C: 葡萄糖酸钙

D: 氨甲苯酸

答案：A

87. (2021 年真题) 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/496144101101011030>