

禹城市中医院招聘试题及解析

说明：本题库收集历年及近期考试真题，全方位的整理归纳备考之用。

一、单项选择题（在下列每题四个选项中只有一个是符合题意的，将其选出并把它的标号写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。）

1、腹部绞痛、患者辗转不安伴呕吐，应首先考虑（ ）。

- A、幽门梗阻
- B、泌尿道结石
- C、肾炎
- D、肝癌

【答案】B

【解析】泌尿道结石患者常表现为肾绞痛与血尿，在结石引起绞痛发作以前，患者没有任何感觉，由于某种诱因，突然出现一侧腰部剧烈的绞痛，并向下腹及会阴部放射，伴有腹胀、恶心、呕吐、程度不同的血尿。根据题干中患者的表现，因首先考虑泌尿道结石。故选B。

2、肉芽组织在组织损伤修复过程中的作用包括（ ）。

- A、抗感染和保护创面
- B、分解、液化坏死物
- C、填补伤口及组织缺损
- D、机化或包裹坏死、血栓及异物

【答案】ACD

【解析】肉芽组织由新生薄壁的毛细血管以及增生的成纤维细胞构成，并伴有炎细胞浸润，肉眼表现为鲜红色，颗粒状，柔软湿润，形似鲜嫩的肉芽故而得名。肉芽组织在组织损伤修复过程中有以下重要作用：（1）抗感染保护创面；（2）填补创口及其他组织缺损；（3）机化或包裹坏死、血栓、炎性渗出物及其他异物。故选ACD。

3、葡萄糖在体内代谢时，通常不会转变发生的化合物是（ ）。

- A、乙酰乙酸
- B、胆固醇
- C、脂肪酸
- D、丙氨酸

【答案】A

【解析】乙酰乙酸属于酮体，酮体由脂肪酸 β 氧化生成的乙酰CoA转变生成，葡萄糖分解产生的乙酰CoA不能用于生成酮体。故选A。

4、能分泌生长激素的腺体（ ）。

- A、腮腺
- B、甲状腺
- C、胸腺
- D、腺垂体

【答案】D

【解析】腺垂体：可分泌激素，分泌的激素有：生长激素、催乳素、黑色细胞刺激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、卵泡刺激素和黄体生长素。

5、S-R 变异是指（）。

- A、抗原变异
- B、毒力变异
- C、芽胞变异
- D、菌落变异

【答案】D

【解析】细菌的菌落主要有光滑（S）型和粗糙（R）型两种。S 型菌落表面光滑、湿润、边缘整齐。细菌经人工培养多次传代后，菌落表面粗糙、干燥、边缘不整，即从光滑型变为粗糙型，称之为 S-R 变异。本题常见错误是选毒力变异和抗原变异，是认为 S-R 变异可以导致细菌的毒力和抗原发生改变，这是对的，但不是 S-R 变异的特征性表现。

6、为诱导免疫耐受，投与免疫抑制剂的最好时间是（）。

- A、二次免疫应答中
- B、几乎与抗原同时投与
- C、接种抗原前一周
- D、注射抗原后一周

【答案】B

【解析】考查要点：建立免疫耐受。常见错误：选接种抗原前一周。接种抗原前一周，机体尚未接触抗原，没有免疫应答，当然不会产生“诱导免疫耐受”。免疫抑制剂的作用是抑制 T 细胞活化过程中 IL-2 基因的转录，所以应同抗原一起投与。

7、硫酸镁中毒最早出现的是（）。

- A、呼吸加快
- B、尿量减少
- C、呼吸减慢
- D、膝反射消失

【答案】D

【解析】注射硫酸镁可以抑制中枢及外周神经系统，使骨骼肌、心肌和血管平滑肌松弛，从而发挥肌松作用

和降压作用。但是硫酸镁注射的安全范围很窄，血镁过高即可抑制延髓呼吸中枢和血管运动中枢，引起呼吸抑制、血压骤降和心脏骤停。肌腱反射消失是呼吸抑制的先兆。中毒后可用氯化钙或葡萄糖酸钙注射液解救。故选D。

8、淋巴结实质的皮质部包括（）

- A、淋巴小结
- B、副皮质区
- C、被膜下淋巴窦
- D、小梁周窦

【答案】ABCD

【解析】淋巴结实质分为皮质和髓质两部分。皮质位于被膜下方，由浅层皮质、副皮质区及皮质淋巴窦构成。浅层皮质含淋巴小结及薄层弥散淋巴组织，主要分布在B细胞区。副皮质区位于淋巴结皮质的深层，为成片的弥散淋巴组织，主要由T细胞聚集而成，又称胸腺依赖区。皮质淋巴窦包括被膜下淋巴窦和小梁周窦。故选ABCD。

9、根据神经元的功能和突起多少分类，数量最多的神经元是（）

- A、中间神经元，多极神经元
- B、感觉神经元，假单极神经元
- C、运动神经元，双极神经元
- D、中间神经元，假单极神经元

【答案】A

【解析】人的中间神经元，占神经元总数的99%以上，主要为多极神经元。

10、人们对科学研究进程中出现的新现象产生好奇感，这种情感属于（）

- A、道德感
- B、美感
- C、理智感
- D、认识

【答案】C

【解析】理智感是人在认识活动过程中，对认识活动成就进行评价时所产生的情感体验。理智感是在人的认识和实践活动中产生和发展起来的，同时它推动人的认识和实践活动，是人们探索追求真理的强大动力。故选C。

11、人们对科学研究进程中出现的新现象产生好奇感，这种情感属于（）

- A、道德感
- B、美感
- C、理智感

D、认识

【答案】C

【解析】理智感是人在认识活动过程中，对认识活动成就进行评价时所产生的情感体验。理智感是在人的认识和实践活动中产生和发展起来的，同时它推动人的认识和实践活动，是人们探索追求真题的强大动力。故选C。

12、肾栓塞的栓子多来自（）。

- A、上肢动脉的血栓脱落
- B、肠系膜静脉的血栓脱落
- C、下肢静脉的血栓脱落
- D、腹主动脉的附壁血栓脱落

【答案】D

【解析】这是一道理解记忆题，考核学生对血栓好发部位及栓子运行途径的综合理解。常见错误：选下肢静脉的血栓脱落，认为血栓最常发生于静脉，其中以下肢静脉最多见，其栓子脱落可引起栓塞，但忽略了下肢静脉的血栓栓子主要引起肺动脉栓塞。正确答案是腹主动脉的附壁血栓脱落。腹主动脉血栓常发生于腹主动脉粥样硬化时，血栓脱落后引起其分支肾动脉栓塞。肠系膜静脉血栓脱落主要栓塞于肝内的门

13、下列哪种疾病与HLA-B27抗原显著相关（）。

- A、重症肌无力
- B、结缔组织病
- C、系统性红斑狼疮
- D、强直性脊柱炎

【答案】D

【解析】强直性脊柱炎的发病与HLA-B27有明显相关性。

14、诊断急性心肌梗死常用的血清酶为（）

- A、肌酸激酶
- B、肌酸激酶同工酶
- C、乳酸脱氢酶
- D、碱性磷酸酶

【答案】ABC

【解析】临床上判断一个患者是否发生了急性心肌梗死，不仅要靠临床症状、心电图的变化，而且要看血清酶有无相应的变化。目前临床常测定的心肌酶有肌酸激酶及其同工酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶， α 羟丁酸脱氢酶、肌红蛋白。故选ABC。

15、从总的方面来说，患者享有的保密权有两大内容（）。

- A、为自己保密和向自己保密

- B、疾病情况和治疗决策
- C、躯体缺陷和心理活动
- D、个人隐私和家庭隐私

【答案】A

【解析】医疗保密权利包括为患者保密和对患者保密。对患者而言是为自己保密和向自己保密。故

16、心肌纤维呈（）。

- A、长梭形
- B、短梭形
- C、长柱状，有分支
- D、短柱状，有分支

【答案】D

【解析】心肌细胞也称心肌纤维，是有横纹的短柱状细胞，多数有分支，借分支连接成网，心肌细胞间的连接结构称闰盘。故选D。

17、个体面对应激源，通过各种适当的行为和心理对策来消除紧张状态，称为（）

- A、解脱
- B、应对
- C、压抑
- D、超脱

【答案】B

【解析】个体面对威胁性的应激源，通过各种适当的心理和行为对策来消除或缓解个体的紧张状态称之为应对。故选B。

18、（）是临床医疗服务的首要道德职责。

- A、防病治病
- B、救死扶伤
- C、实行社会主义人道主义
- D、全心全意为人民身心健康服务

【答案】B

【解析】救死扶伤是临床医疗服务的首要道德职责，即所有临床医务人员都应把病人的生命和健康放在第一位，为病人谋利益。故选B。

19、（）是临床医疗服务的首要道德职责。

- A、防病治病
- B、救死扶伤
- C、实行社会主义人道主义

D、全心全意为人民身心健康服务

【答案】B

【解析】救死扶伤是临床医疗服务的首要道德职责，即所有临床医务人员都应把病人的生命和健康放在第一位，为病人谋利益。故选B。

20、心理咨询基本技巧包含下列哪几项（）

A、共情

B、真诚

C、积极关注

D、移情

【答案】ABCD

【解析】心理咨询的技巧包含很多，其作用是通过晤谈达到帮助来访者自我成长的目的。其中包括尊重、共情、真诚、积极关注、移情和反移情。故选ABCD。

21、产后出血是分娩期的严重并发症，导致产后出血最常见的原因是（）

A、胎盘滞留

B、宫缩乏力

C、软产道裂伤

D、凝血功能障碍

【答案】B

【解析】子宫收缩乏力、胎盘因素（胎盘滞留、胎盘植入、胎盘部分残留）软产道裂伤及凝血功能障碍是产后出血的主要原因。这些原因可共存、相互影响或互为因果。其中，子宫收缩乏力是产后出血最常见的原因。故选B。

22、小剂量碘剂用于（）

A、甲状腺危象

B、甲状腺功能亢进

C、甲状腺功能亢进的术前准备

D、单纯甲状腺肿

【答案】D

【解析】不同剂量的碘对甲状腺功能可产生不同的作用。小剂量碘是合成甲状腺激素的原料，用于预防和治疗单纯性甲状腺肿。故选D。

23、下列可使用食品添加剂的情形有（）

A、便于食品的生产、加工、包装运输或贮藏

B、保持婴幼儿食品本身的营养价值

C、保持食品的质量和稳定性，改进其感官特性

D、作为某些特殊膳食食用食品的必要配料或成分

【答案】ABCD

【解析】食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。营养强化剂、食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内。在以下情况下可使用食品添加剂：(1) 保持或提高食品本身的营养价值；(2) 作为某些特殊膳食食用食

24、下列哪项不属于传染病流行病学资料内容 ()

A、年龄、性别

B、热型

C、发病季节

D、卫生习惯

【答案】B

【解析】传染病流行病学资料内容包括年龄、性别，卫生习惯，预防接种史，发病季节等。

25、形成条件反射的重要条件是 ()

A、要有适当的无关刺激

B、无关刺激与非条件刺激在时间上多次结合

C、大脑皮质必须健全

D、要有非条件刺激强化

【答案】B

【解析】条件反射形成的关键是无关刺激与非条件刺激在时间上多次结合，使无关刺激转变为条件刺激，这个过程称为强化。一旦条件刺激形成，条件反射建立宣告完成。故**选B**。

26、下列哪种细菌在溶菌酶作用下发生溶菌现象 ()

A、葡萄球菌

B、变形杆菌

C、沙门菌

D、大肠埃希菌

【答案】A

【解析】葡萄球菌可在溶菌酶作用下发生溶菌现象。

27、关于原发型肺结核，下列哪项阐述是错误的 ()

A、结核菌初次侵入机体，在肺内形成病变

B、原发综合征包括原发病灶、淋巴管炎和肺门淋巴结炎

C、病灶好发于胸膜下通气良好的部位

D、原发病灶吸收慢

【答案】D

【解析】原发性肺结核多见于儿童，青年和成人有时也可见。为原发结核感染所引起的病症，好发于上叶下部和下叶上部或中部靠近肺边缘的部位。原发综合征包括肺内原发灶、淋巴管炎和胸内肿大的淋巴结。

28、从总的方面来说，患者享有的保密权有两大内容（）

- A、为自己保密和向自己保密
- B、疾病情况和治疗决策
- C、躯体缺陷和心理活动
- D、个人隐私和家庭隐私

【答案】A

【解析】医疗保密权利包括为患者保密和对患者保密。对患者而言是为自己保密和向自己保密。故

29、关于传染病的病原学检查，下列不正确的是（）

- A、病毒分离一般需用细胞培养
- B、标本的采集应尽量于病程的早期阶段进行
- C、立克次体可以通过血培养分离
- D、从血液或骨髓涂片中可检出疟原虫

【答案】C

【解析】立克次体需经动物接种或细胞培养才能分离出来。

30、无脉电活动所出现的心律如为宽QRS波时，可见于下列何种情形（）

- A、重度低体温症
- B、老年患者的心脏停搏前心电
- C、重度高钾血症
- D、以上皆是

【答案】D

【解析】以上均可见无脉电活动，心率为宽QRS波。

31、临床治疗的伦理原则有（）

- A、生命至上原则
- B、有效原则
- C、自主原则
- D、择优原则

【答案】ABCD

【解析】临床治疗伦理原则包含生命至上、有效原则、自主原则和择优原则。故

32、下列关于恶性肿瘤特点的叙述，正确的有（）

- A、多数为局部生长

- B、可通过血液、淋巴途径向远处转移
- C、晚期多伴有恶液质
- D、多数有完整包膜，易于手术切除

【答案】BC

【解析】恶性肿瘤发展较快，呈浸润性生长，瘤细胞四周蔓延侵入周围组织的间隙、管道、空腔等处，并破坏邻近器官和（或）组织。恶性肿瘤一般无包膜，与周围组织分界不清。固定、不能推动，表面高低不平，质脆，肿瘤中央可缺血、坏死、表面溃烂、出血。瘤体表面可呈菜花样。故选C。

33、急性肺脓肿最具特征的症状是（）

- A、畏寒高热
- B、呼吸困难
- C、咳嗽伴咯血
- D、咳大量脓臭痰

【答案】D

【解析】急性肺脓肿患者，常咳大量脓臭痰及坏死组织，每日可达300~500ml。臭痰多系厌氧菌感染所致。

34、对呼吸窘迫综合征的治疗采用（）

- A、无控制性给氧
- B、呼气末正压给氧
- C、鼻导管持续高浓度给氧
- D、高压氧疗

【答案】B

【解析】呼吸窘迫综合征的发病机制目前认为是肺泡上皮、肺泡毛细血管损伤，表面活性物质减少或消失，肺泡内透明膜形成，从而引起氧合障碍，导致顽固性低氧血症。所以纠正缺氧为刻不容缓的重要措施。一般认为，一旦ARDS诊断确立，应尽早进行机械通气。由于一般的氧疗方法对ARDS疗效均差，所以呼气末正压（PEEP）给氧是首选的措施。对于一般肺炎病人的氧疗原则是根据患者具体缺氧的状况来决定。如面

35、日本血吸虫病病理变化最显著的部位是（）

- A、肝脏和结肠
- B、肺
- C、结肠
- D、脑

【答案】A

【解析】常见错误：选答“肝脏”和“结肠”是日本血吸虫病病理损害的器官之一，选答其中一个都不全面。要点：日本血吸虫主要寄生于肠系膜下静脉与直肠痔上静脉内。虫卵沉积于肠壁黏膜下层，随门静脉血流至肝脏分支，故病变以肝脏和结肠最显著。

36、诊断伤寒肠热症用（）

- A、神奈川试验
- B、外斐试验
- C、锡克试验
- D、肥达试验

【答案】D

【解析】肥达试验为用于协助诊断肠热症的血清学试验。

37、焦痂和溃疡见于（）

- A、登革热
- B、败血症
- C、钩端螺旋体病
- D、恙虫病

【答案】D

【解析】焦痂和溃疡是恙虫病的特征性体征。血液白细胞增多，异型淋巴细胞增多。血小板减少多见于流行性出血热。腓肠肌压痛是钩端螺旋体病的特征性体征。

38、治疗军团感染的首选药是（）

- A、青霉素G
- B、四环素
- C、红霉素
- D、头孢类

【答案】C

【解析】红霉素属于大环内酯类抗生素，主要是通过抑制细菌蛋白质的合成来发挥抗菌作用，其抗菌谱较窄，对大多数G⁺菌（如金黄色葡萄球菌、链球菌）抗菌作用强，对部分G⁻菌（脑膜炎奈瑟菌、嗜肺军团菌）高度敏感。对肺炎支原体、衣原体、立克次体也有抑制作用。故选。

39、神经-骨骼肌接头处的化学递质是（）

- A、肾上腺素
- B、多巴胺
- C、乙酰胆碱
- D、血管活性肠肽

【答案】C

【解析】运动神经纤维的末梢与骨骼肌细胞接触的部位称神经骨骼肌接头，由接头前膜、接头后膜和接头间隙构成。运动神经有冲动传来时，末梢释放乙酰胆碱，与接头后膜上的N₂受体结合，引起骨骼肌细胞产生动作电位而兴奋收缩。故选C。

40、风湿病的病变中最具特征性病变是（）

- A、皮下风湿小体
- B、心肌内风湿小体（Aschoff小体）
- C、心外膜纤维素性炎
- D、风湿性心内膜炎

【答案】B

【解析】风湿病主要侵犯结缔组织，以形成风湿小体为其病理特征。肉芽肿性心肌炎或心肌间质Aschoff小体形成是风湿病较为特殊具有特征性的病变，并提示有风湿活动。因此，在风湿病中最具诊断意义的病变是Aschoff小体。Aschoff小体就是风湿小体。故选B。

41、屈髋关节的肌（）

- A、半腱肌
- B、小腿三头肌
- C、股四头肌
- D、胫骨前肌

【答案】C

【解析】屈髋关节的肌有髂腰肌，股直肌，阔筋膜张肌和缝匠肌，其中股四头肌由股直肌、股中肌、股外肌和股内肌组成。

42、能够释放再聚集 Ca^{2+} 的是（）。

- A、终末池
- B、肌动蛋白
- C、横小管
- D、肌钙蛋白

【答案】A

【解析】位于横小管两侧的肌浆网扩大成环行扁囊称终末池。

43、哪项关于阻塞性肺气肿出现的病理生理改变是错误的（）

- A、残气占肺总量的百分比增加
- B、生理无效腔气量增大
- C、肺内动静脉分流
- D、动态及静态肺顺应性降低

【答案】D

【解析】并发阻塞性肺气肿后，早期，闭合容积增大，动态肺顺应性降低，但静态肺顺应性增加；最大通气量和时间肺活量减低；此后，肺组织弹性减退，肺泡持续扩大，残气占肺总量的百分比增加；随着肺气肿的日益加重，肺泡周围的毛细血管受肺泡膨胀的挤压而退化，使肺毛细血管大量减少，肺泡间的血流减少，肺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496232034013010224>