专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-2024年吉林省龙井市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题大全【完整版】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.医生、护士和药师对新购入药品的知识缺乏培训，归属于

A：患者经济拮据

B：操作失误

C：管理缺失

D：产品缺陷

答案：C

2.延缓或降低抗药性的联合用药是

A：硫酸阿托品联用吗啡

B：普萘洛尔联用硝苯地平降血压

C：磷霉素联用其他抗菌药物

D：头孢哌酮／舒巴坦复方制剂

答案：C

3.治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

A：顺铂

B：苯妥英钠

C：地高辛

D：茶碱

答案：D

4.在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

A：药物重整

B：药学干预

C：处方审核

D：药物评价

答案：A

5.属于血管紧张素Ⅱ受体阻断剂的抗高血压药是

A：厄贝沙坦

B：卡托普利

C：氨氯地平

D：比索洛尔

答案：A

6.可加重痴呆及认知功能受损的是

A：地西泮

B：异丙嗪

C：H

D：氯苯那敏

答案：C

7.配制青霉素输液的适宜溶媒是()

A：0.9%氯化钠注射液

B：低分子右旋糖酐注射液

C: 复方氯化钠注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

8.多晒太阳、防跌倒，最适合于

A: 焦虑障碍

B: 糖尿病

C: 骨质疏松

D: 高血压

答案：C

9.从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

A: 可杜绝投诉事件

B: 可使患者获得有关用药指导

C: 可提高公众对药师的认知度

D: 是药师实施药学服务的基础

答案：A

10.属于HIV整合酶抑制剂的是

A: 雷特格韦

B: 阿巴卡韦

C: 洛匹那韦

D: 奈韦拉平

答案：A

11.运动员参赛时禁用的药品是

A: 雷尼替丁

B: 人促红素

C: 多潘立酮

D: 氨氯地平

答案：B

12.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

B: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至2～4.5小时

C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

答案：C

13.关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

A: 成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较

B: 成本效用方法不能对不同疾病间进行比较

C: 最小成本法不能对不同疾病间进行比较

D: 成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较

答案：B

14.对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选（）

A: 辛伐他汀

B: 阿司匹林

C: 华法林

D: 巴曲酶

答案：B

15.如果ACEI引起干咳可

A：停用ACEI或减量

B：慎用甲基多巴

C：给予硫酸亚铁

D：联用他汀类

答案：C

16.患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该ADR的因果关系评价结果是（）。

A：肯定

B：很可能

C：可能无关

D：可能

答案：B

17.毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

A：巴比妥

B：硫喷妥钠

C：异戊巴比妥

D：苯巴比妥

答案：C

18.（2017年真题）患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A：双氯芬酸钠

B: 对乙酰氨基酚

C: 美洛昔康

D: 尼美舒利

答案：B

19.使血液黏度增加、血容量增多，引起高血压的药物是

A: 咖啡因

B: 重组人促红细胞生成素

C: 伪麻黄碱

D: 糖皮质激素

答案：B

20.患者，男，45岁，临床诊断肝内胆管梗阻。下列指标最可能出现的是

A: γ 一谷氨酰转移酶升高

B: 肌酸激酶降低

C: 血肌酐降低

D: 白蛋白升高

答案：A

21.用药期间禁止饮酒，否则可能引起眩晕、倦怠、嗜睡、视物不清等“双硫仑样反应”的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 卡马西平

C: 头孢哌酮

D: 左氧氟沙星

答案：C

22.血红蛋白(HGB)正常参考区间是

A：(15.0～20.0)×

B：(4.0～10.0)×10

C：180～220g/L

D：170～200g/L

答案：D

23.（2019年真题）患者，男，65岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

A：羧甲司坦

B：乙酰半胱氨酸

C：氨溴索

D：右美沙芬

答案：D

24.易引湿的药物是()。

A：胃蛋白酶

B：硫酸镁

C：硝酸甘油

D：青霉素

答案：A

25.雷尼替丁

A：可导致驾驶员多尿或多汗

B：可使驾驶员视物模糊或辨色困难

C：可使驾驶员出现定向力障碍

D：可使驾驶员出现眩晕和幻觉

答案：C

26.（2021年真题）治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

A：氯吡格雷

B：依诺肝素钠

C：达比加群酯

D：尿激酶

答案：A

27.适用于哺乳期女性避孕，推荐于正常月经周期的前5天给药的是

A：口服左炔诺孕酮(1.5mg)

B：口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮0.35mg)

C：短效复方口服避孕药

D：甲羟孕酮150mg肌内注射

答案：D

28.包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

A：二级文献

B：研究论文

C：三级文献源

D：药学网络

答案：A

29.患者，女，28岁，妊娠27周，头晕3天。入院查体：血压160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。

A：硫酸镁注射液

B：葡萄糖酸钙注射液

C: 甲氧氯普胺注射液

D: 尼莫地平注射液

答案：A

30.饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A: 复合营养素

B: 钙剂

C: 中草药制剂

D: 复合维生素

答案：D

31.其含量用生育酚当量表示的是

A: 维生素A

B: 维生素D

C: 维生素B

D: 维生素E

答案：D

32.属于脂溶性维生素的是

A: 维生素

B: 维生素B1

C: 维生素

D: 维生素B12

答案：C

33.泡腾片的使用正确的是

A: 100～150ml凉开/温水中浸泡

B: 150～200ml冷水中浸泡

C：幼儿可自行服用

D：50～100ml热水中浸泡

答案：A

34.烟酸类

A：辛伐他汀

B：考来烯胺

C：阿昔莫司

D：吉非贝齐

答案：C

35.可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

A：氯苯那敏

B：阿司匹林

C：东莨菪碱

D：阿米洛利

答案：D

36.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A：他汀类药物能有效降低TC和LDLC，其主要不良反应是头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等

B：稳定性心绞痛患者，合并高血压、糖尿病、心力衰竭的患者可选用卡托普利、依那普利等药物

C：阿司匹林是常用药，主要不良反应为胃肠道出血或阿司匹林过敏

D: 发作时可含服作用较快的硝酸酯制剂，首次服用硝酸甘油时，应注意可能发生直立性低血压

答案：A

37.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A: 30ml，晚餐时一次服用

B: 30ml，早餐时一次服用

C: 每次10ml，每日三次，餐后给药

D: 每次10ml，每日三次，餐前给药

答案：B

38.抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄（）

A: 维拉帕米

B: 氢氯噻嗪

C: 美托洛尔

D: 依那普利

答案：D

39.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A: 维生素B

B: 维生素K

C: 乙酰胺

D: 阿托品

答案：B

40.孕妇使用四环素可使胎儿牙齿黄染、牙釉质发育不全，骨生长障碍，发生的时间是

A: 妊娠4～9个月

B: 妊娠5个月后

C: 妊娠3个月内

D: 妊娠2个月后

答案：B

41.通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是

A: 硝苯地平

B: 赖诺普利

C: 呋塞米

D: 缬沙坦

答案：A

42.（2017年真题）因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

A: 可卡因

B: 人促红素

C: 哌替啶

D: 甲睾酮

答案：B

43.急诊处方一般不超过几日

A: 1日常用量

B: 7日常用量

C: 3日常用量

D: 15日常用量

答案：C

44.患者，男，58岁，高血压病史5年；吸烟史40年，日均40支。2小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅CT检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A: 华法林片3mgqdpo

B: 阿司匹林肠溶片100mgqdpo

C: 氯吡格雷片75mgqdpo

D: 阿司匹林肠溶片300mgqdpo

答案：B

45.胶囊剂的注意事项是

A: 用后应漱口

B: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

C: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

D: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

答案：C

46.胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A: 美托洛尔

B: 特拉唑嗪

C: 维生素C

D: 阿仑膦酸钠

答案：D

47.利尿脱水急速降低体重的兴奋剂是

A: 甲睾酮

B: 苯丙胺

C: 呋塞米

D: 阿托品

答案：C

48.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 稳定型心绞痛

B: 冠状动脉粥样硬化型心脏病

C: 无症状型心肌缺血型

D: 非ST段抬高型心肌梗死

答案：D

49.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 社区获得性肺炎

B: 肺气肿

C: 急性支气管炎

D: 肺结核

答案：C

50.易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物

A: 环磷酰胺

B: 紫杉醇

C: 阿霉素

D: 氟尿嘧啶

答案：D

51.1U维生素A相当于

A: 0.03μg维生素A

B: 3μg维生素A

C: 0.3μg维生素A

D: 30μg维生素A

答案：C

52.以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是

A：尿素

B：苯甲酸

C：特比萘芬

D：依沙吖啶

答案：C

53.患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 坏血病

B: 智障

C: 脑瘫

D: 佝偻病

答案：D

54.（2016年真题）患者，女，35岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是20天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是（）。

A: 牙齿色素沉着

B: 流产或发育成正常胚胎

C: 腭裂

D: 骨骼发育异常

答案：B

55.下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

A: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

B: 需要终身服药

C: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶

D: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

答案：C

56.乙型肝炎病毒e抗体为

A：为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

B：不能抑制HBV的增殖，可反映肝细胞受到HBV侵害后的一项指标

C：不能抑制HBV的增殖，出现在HBsAg转阴之后，证明人体对HBsAg有一定的免疫清除率的指标

D：乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

答案：C

57.当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供NPC的比例是

A：100kcal：1gN

B：150kcal：1gN

C：NPC5：5

D：NPC7：3

答案：C

58.下述"药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的"中，不正确的是

A：减少急性加重的程度

B：排痰化痰

C：预防和控制症状

D：减少急性加重的频次

答案：B

59.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A：应适当减轻体重

B：注意关节保暖

C：遵医嘱，不得自行增加剂量

D：疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

答案：D

60.以下毒物中，误服中毒、须用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A：有机磷杀虫药

B：苯丙胺

C：苯二氮

D：瘦肉精

答案：A

61.（2017年真题）下列关于烫伤救治措施的说送正确的是（）

A：Ⅰ度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

B：烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

C：可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

D：创面及时外涂甲紫溶液预防感染

答案：A

62.抑制5-a还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

A：非那雄胺

B：前列康

C：黄酮哌酯

D：特拉唑嗪

答案：A

63.可引起血清尿素氮增高的是

A：肾衰竭

B：严重肝病

C：胃溃疡

D：急性胰腺炎

答案：A

64.药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

A：高尚的职业道德

B：良好的教育背景

C：药历制订、修改

D：交流沟通能力

答案：D

65.伪膜性肠炎

A：白细胞增多

B：真菌

C：红细胞

D：上皮细胞

答案：D

66.患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A：有条件的应测定药物血液浓度

B：定期监测肝功能

C：遵从联合治疗原则

D：长期规律用药

答案：C

67.伴发OAB的前列腺增生症治疗药物索利那新的不良反应是

A：心动过缓

B：加重闭角型青光眼

C：体位性低血压

D：性功能障碍

答案：B

68.属于 β 受体阻断剂的是

A：美托洛尔

B：乙酰胆碱

C：福莫特罗

D：异丙托溴铵

答案：A

69.《药物事实与比较》属于

A：药品不良反应

B：药物相互作用

C：药品标准

D：药物综合信息

答案：D

70.保钾利尿剂

A：阿米洛利

B：阿利吉仑

C：依普利酮

D：雷米普利

答案：A

71.（2016年真题）患者，男，45岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是（）。

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 速克感冒片

C: 维C银翅片

D: 速感宁胶囊

答案：A

72.蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

A: 阿托品

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 辅酶Q

答案：D

73.粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 米泔水样

B: 暗红果酱色

C: 白陶土便

D: 柏油便，黑色有光泽

答案：B

74.质子泵抑制剂

A: 埃索美拉唑

B: 铝碳酸镁

C: 法莫替丁

D: 多潘立酮

答案：A

75.典型结核病的临床表现错误的是

A：乏力

B：高热

C：食欲减退

D：咳嗽

答案：B

76.可引起局部组织萎缩

A：地塞米松粘贴片

B：硼酸甘油

C：氯己定

D：甲硝唑含漱制剂

答案：A

77.患者，女，38岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力2日；查体：神清、气稍促，心律95bpm，律齐，体温39．1℃，血压110／70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A：120mg

B：80mg

C：60mg

D：100mg

答案：D

78.患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的NSAID类药物是

A：吲哚美辛
B：塞来昔布
C：布洛芬
D：双氯芬酸
答案：B

79.药师审核后判定为合理处方，应该
A：调配处方并发药
B：拒绝调配处方
C：拒绝调配处方，并依照有关规定报告
D：拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预
答案：A

80.属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺D2受体的促胃肠动力药是
A：甲氧氯普胺
B：昂丹司琼
C：多潘立酮
D：莫沙必利
答案：C

81.临床急需70%乙醇400ml，问需取95%乙醇的体积是
A：280ml
B：295ml
C：290ml
D：285ml
答案：B

82.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 尚不确定的信号

B: 驳倒的信号

C: 部分确认的信号

D: 确认的信号

答案：A

83.（2021年真题）患者,男,45岁,因消化不良（上腹饱胀,餐后明显）来药店咨询。下列说法错误的是（）

A: 可用助消化药对症治疗

B: Hp感染是引起消化不良的常见原因

C: 进餐时不要摄入过多的液体

D: 应除外器质性疾病

答案：B

84.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高160cm，体重70kg;白细胞8.0×10

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 非诺贝特

D: 辛伐他汀

答案：A

85.在治疗痛风时，应用排尿酸药过程中，应多饮水，一日尿量宜保持在

A: 500ml以上

B: 1500ml 以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/497012004160010024