专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-2024年吉林省龙井市《执业药师之西药学专业二》资格考试内部题库（预热题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.与卡比马唑合用应谨慎的是

A：放射性碘

B：糖皮质激素

C：甲状腺素

D：丙硫氧嘧啶

答案：A

2.用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病的降糖药物是

A：格列本脲

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：罗格列酮

答案：C

3.可用于治疗肝性脑病的药物是

A：多库酯钠

B：番泻叶

C：利那洛肽

D：欧车前

答案：C

4.（2020年真题）患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A: 双氯芬酸

B: 华法林

C: 氯吡格雷

D: 奥美拉唑

答案：B

5.选择性抑制COX-2的是

A: 吲哚美辛

B: 阿司匹林

C: 塞来昔布

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

6.（2017年真题）抑制细菌核酸合成（）

A: 利福喷丁

B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

C: 头孢米诺

D: 头孢吡肟

答案：A

7.作用广泛，主要用于急性心衰，不宜作为心衰常规治疗的药物是

A: 洋地黄毒苷

B: 米力农

C: 地高辛

D: 多巴胺

答案：D

8.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A: 氟康唑对曲霉菌有效

B: 氟康唑是肝药酶诱导剂

C: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量

D: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染

答案：D

9.用于肝病的氨基酸制剂的是()

A: 赖氨酸注射液

B: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

C: 复方氨基酸注射液(20AA)

D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：C

10.青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

A: Ⅰ型变态反应

B: Ⅲ型变态反应

C: Ⅳ型变态反应

D: Ⅱ型变态反应

答案：A

11.属于M胆碱受体阻断剂的平喘药是()

A：噻托溴铵

B：茶碱

C：沙美特罗

D：孟鲁司特

答案：A

12.可用肝病的氨基酸制剂是

A：复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

B：复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）

C：复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液

D：复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

答案：B

13.关于钙通道阻滞剂(CCB类)药物的说法错误的是()

A：CCB类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

B：CCB类主要扩张小动脉,对小静脉和毛细血管作用较小,可导致下肢或脚踝水肿

C：红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

D：对既往有脑卒中病史的老年高血压患者,优先选择CCB类降压药

答案：A

14.用于治疗妊娠期妇女子痫和先兆子痫的首选药物是

A：依那普利

B：硫酸镁

C：丙戊酸钠

D：普萘洛尔

答案：B

15.（2015 年真题）长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充（）。

A: 维生素 A 和维生素 D

B: 维生素 C 和烟酸

C: 维生素 E 和叶酸

D: 维生素 B 和维生素 K

答案：D

16.属于叶酸类抗代谢类药物的是

A: 吉西他滨

B: 甲氨蝶呤

C: 长春瑞滨

D: 巯嘌呤

答案：B

17.属于棘白菌素类的是

A: 特比萘芬

B: 制霉菌素

C: 氟胞嘧啶

D: 卡泊芬净

答案：D

18.袢利尿药发挥利尿的作用点是

A: Na+-K+-2Cl⁻同向转运子

B: Na+-Cl⁻共转运子

C: 碳酸酐酶

D: 磷酸二酯酶

答案：A

19.代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性()

A: 氟尿嘧啶

B: 环磷酰胺

C: 纳武利尤单抗

D: 巯嘌呤

答案：B

20.可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 红霉素

B: 他莫昔芬

C: 氯丙嗪

D: 维生素C

答案：B

21.30岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 尽量选择三价铁

B: 注意预防铁负荷过重

C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

D: 选择适宜的病期、疗程和监测

答案：A

22.（2019年真题）患者，男，67岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是（）

A: 急性溶血性贫血

B: 红人综合征

C: 抗生素相关性腹泻

D: 肌肉震颤

答案：A

23.关于铂类药物的描述，下列说法错误的是

A: 细胞增殖周期非特异性抑制剂

B: 广谱抗肿瘤药物

C: 顺铂是结、直肠癌的首选药之一

D: 作用机制是破坏DNA的结构和功能

答案：C

24.复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

A: 含有过敏原

B: 静脉滴注速度过快

C: 患者的个体差异

D: 含有的氨基酸种类太多

答案：B

25.患者，男，56岁。有糖尿病病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl。

A: 皮下注射

B: 舌下含服

C: 静脉注射

D: 口服

答案：C

26.（2020年真题）主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A：吲哚美辛

B：对乙酰氨基酚

C：塞来昔布

D：阿司匹林

答案：B

27.（2019年真题）镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

A：糖尿病

B：癫痫

C：低蛋白血症

D：重症肌无力

答案：D

28.溶栓药的使用禁忌证不包括

A：活动性内脏出血

B：既往有出血性脑卒中史

C：月经期间

D：1年内有缺血性脑卒中或脑血管事件

答案：C

29.与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

A：吗氯贝胺

B：氯硝西泮

C：苯巴比妥

D：丙戊酸钠

答案：A

30.多柔比星与 β 受体阻滞药合用，可能()
A: 导致坏死性结肠炎
B: 增加心脏毒性
C: 易产生沉淀
D: 增加肝毒性
答案：B

31.妨碍铁剂在肠道吸收的物质是()
A: 食物中的高磷、鞣酸等
B: 枸橼酸钠
C: 维生素 C
D: 食物中的半胱氨酸
答案：A

32.属于 α1 受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是()
A: 西地那非
B: 他达拉非
C: 坦洛新
D: 度他雄胺
答案：C

33.适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是
A: 蒿甲醚
B: 双氢青蒿素
C: 奎宁
D: 乙胺嘧啶

答案：B

34.以下药物中，不属于眼用局麻药的是()

A：奥布卡因

B：阿托品

C：丁卡因

D：利多卡因

答案：B

35.（2018年真题）适应症仅应用于治疗失眠的药物是（）

A：佐匹克隆

B：氟西汀

C：地西泮

D：苯巴比妥

答案：A

36.高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

A：环吡酮胺

B：阿莫罗芬

C：特比萘芬

D：制霉菌素

答案：A

37.铂类化合物

A：丝裂霉素

B：喜树碱类

C：顺铂

D: 环磷酰胺

答案：C

38.属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

A: 他莫昔芬

B: 氟他胺

C: 阿那曲唑

D: 炔雌醇

答案：B

39.下列何药对心房颤动无治疗作用

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

答案：B

40.下列哪种药物长期使用将引起药物性鼻炎()

A: 减鼻充血药

B: 肥大细胞膜稳定剂

C: 糖皮质激素

D: 抗组胺药

答案：A

41.（2015年真题）治疗侵袭性曲霉菌病首选（）。

A: 氟胞嘧啶

B: 氟康唑

C: 伏立康唑

D: 灰黄霉素

答案：C

42.属于免疫调节型氨基酸注射液的是()

A: 复方氨基酸注射液(18AA)

B: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

C: 复方氨基酸注射液(20AA)

D: 赖氨酸注射液

答案：B

43.吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、舒尼替尼的主要代谢酶是

A: CYP2C9

B: CYP1A1

C: CYP3A4

D: CYP1A2

答案：C

44.首选用于伤寒、副伤寒的是()

A: 克林霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素B

D: 氯霉素

答案：D

45.主要抑制凝血ⅡⅡa和Ⅹa因子的抗凝血药是()。

A: 依诺肝素

B: 水蛭素

C: 磺达肝葵钠

D: 阿哌沙班

答案：B

46.可导致视神经炎的抗结核药师

A: 利福平

B: 利福喷丁

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：D

47.维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

A: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

B: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

D: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

答案：B

48.与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

A: 酚酞

B: 聚乙二醇 4000

C: 乳果糖

D: 开塞露

答案：A

49.可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 他莫昔芬

B: 红霉素

C: 维生素 C

D: 氯丙嗪

答案：A

50.金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加肾毒性

B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

C: 可增加抗胆碱不良反应的危险

D: 增加锥体外系不良反应的风险

答案：B

51.存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 泼尼松

C: 奥沙利铂

D: 吉西他滨

答案：C

52.抗胆碱M受体药的药理作用不包括

A: 解除毛细血管痉挛

B: 扩张支气管

C: 抑制腺体分泌

D: 收缩胃肠平滑肌

答案：D

53.现有调脂药中降低LDL作用最强的一类药是

A: 胆固醇吸收抑制剂

B: 胆汁酸结合树脂

C: 他汀类药物

D: 抗氧化剂

答案：C

54.强效（使 LDL-ch 水平降低≥50%）的他汀类调血脂药

A: 依折麦布

B: 小剂量氟伐他汀

C: 大剂量阿托伐他汀

D: 小剂量阿托伐他汀

答案：C

55.β-内酰胺类抗生素的抗菌机制是

A: 抑制蛋白质合成的全过程

B: 影响叶酸代谢

C: 抑制细菌细胞壁的合成

D: 影响胞浆膜的通透性

答案：C

56.下述不属于水溶性维生素的是

A: 维生素

B: 维生素 B

C: 维生素 C

D: 维生素 B

答案：A

57.患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A: 治疗肝硬化

B：预防消化道出血

C：治疗胃溃疡

D：缓解腹胀

答案：C

58.烷化剂

A：环磷酰胺

B：顺铂

C：丝裂霉素

D：喜树碱类

答案：A

59.关于地高辛的说法不正确的是

A：减慢心率

B：加强心肌收缩力

C：减慢传导

D：激动Na

答案：D

60.肝素过量可选用的拮抗药是()

A：氨基己酸

B：鱼精蛋白

C：维生素K

D：葡萄糖酸钙

答案：B

61.对钙及骨矿物质具有极强的吸附性，主要分布在骨骼中发挥疗效的药物是()

A：氯屈膦酸二钠
B：阿仑膦酸钠
C：帕米膦酸二钠
D：依替膦酸二钠
答案：A

62.属于一线抗结核分枝杆菌的药物是
A：异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
B：异烟肼、利福平、莫西沙星
C：莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
D：异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸
答案：A

63.目前治疗肺孢子菌病首选的药物是
A：复方磺胺甲噁唑
B：卡泊芬净
C：氨曲南
D：特比萘芬
答案：A

64.氢氯噻嗪的药理作用是()
A：抑制远曲小管Na
B：抑制近曲小管的碳酸酐酶活性
C：提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
D：与醛固酮受体结合
答案：A

65.治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

A: 氨苯蝶啶
B: 氢氯噻嗪
C: 螺内酯
D: 阿米洛利
答案：C

66.治疗慢性室性心律失常的药物是()
A: 维拉帕米
B: 美西律
C: 胺碘酮
D: 奎尼丁
答案：B

67.属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常药物的是()
A: 奎尼丁
B: 胺碘酮
C: 普罗帕酮
D: 普鲁卡因胺
答案：B

68.（2021年真题）患者，男，48岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗6天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是（）
A: 重组人促红素
B: 维生素K1
C: 维生素B12
D: 重组链激酶

答案：B

69.碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

A：苯巴比妥

B：丙戊酸钠

C：卡马西平

D：拉莫三嗪

答案：B

70.属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：氟他胺

B：阿那曲唑

C：他莫昔芬

D：炔雌醇

答案：B

71.奥美拉唑主要用于治疗

A：消化不良

B：恶心、呕吐

C：慢性便秘

D：胃溃疡

答案：D

72.金刚烷胺与阿托品合用

A：增加肾毒性

B：增加锥体外系不良反应的风险

C：可增加抗胆碱不良反应的危险

D：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

答案：C

73.（2016年真题）应用高剂量的β2受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

A：低镁血症

B：高钙血症

C：低钙血症

D：低钾血症

答案：D

74.患者，男，56岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

A：杂环氨基酸

B：支链氨基酸

C：芳香族氨基酸

D：脂肪族氨基酸

答案：B

75.（2019年真题）患者，男，34岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是（）

A：溴吡斯的明

B：山莨菪碱

C：酚妥拉明

D：多潘立酮

答案：B

76.痛风缓解期(关节炎症控制后1～2周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

A：布洛芬

B：别嘌醇

C：秋水仙碱

D：泼尼松龙

答案：B

77.眼底散瞳检查宜选用

A：托吡卡胺滴眼剂

B：拉坦前列素滴眼剂

C：氯霉素滴眼剂

D：碘苷滴眼剂

答案：A

78.下述药物中长期使用易产生耐受性的药物是

A：磷酸二酯酶抑制剂

B：白三烯受体阻断剂

C：M受体拮抗剂

D：β

答案：D

79.治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

A：碘苷滴眼液

B：利巴韦林滴眼液

C：四环素可的松眼膏

D：更昔洛韦滴眼液

答案：C

80.下列药物中不属于降压药的是()

A: 左旋多巴
B: 肼屈嗪
C: 利血平
D: 阿利克仑
答案：A

81.具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类伐物是()
A: 甘精胰岛素注射液
B: 预混胰岛素注射液
C: 普通胰岛素注射液
D: 精蛋白锌胰岛素注射液
答案：A

82.（2021年真题）属于细胞血凝索抑制剂的抗流感病毒药物是（）
A: 法匹拉书
B: 博洛昔韦
C: 奥司他韦
D: 阿比多尔
答案：D

83.多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是
A: 多柔比星
B: 柔红霉素
C: 表柔比星
D: 吡柔比星
答案：C

84.下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A：非诺贝特

B：依折麦布

C：盐酸

D：瑞舒伐他汀

答案：B

85.维生素A的适应证不包括

A：甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

B：夜盲症

C：角膜软化

D：干眼病

答案：A

86.治疗金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎及关节感染的首选药是

A：大环内酯类

B：氨基糖苷类

C：头孢菌素类

D：林可霉素类

答案：D

87.对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌均有强大抗菌活性的药物是()

A：亚胺培南

B：克拉维酸

C：氨曲南

D：阿莫西林

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/497012011160010024