

## 护理三级规范化培训结业理论考试精选题库 2923 至 3174 题

2923. 某孕妇妊娠 10 周，2 h 前出现阵发性腹痛且逐渐加重，阴道流血量增多。妇科检查：宫颈口已扩张，可见胎囊堵于宫口。该孕妇目前的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

**【答案】** B

2924. 某孕妇妊娠 10 周，2 h 前出现阵发性腹痛且逐渐加重，阴道流血量增多。妇科检查：宫颈口已扩张，可见胎囊堵于宫口。应采取的治疗原则是

- A. 卧床休息，禁止性生活
- B. 每日肌注黄体酮
- C. 尽早使胚胎组织排出
- D. 应用止血药物
- E. 应用抗生素

**【答案】** C

2925. 某孕妇妊娠 10 周，2 h 前出现阵发性腹痛且逐渐加重，阴道流血量增多。妇科检查：宫颈口已扩张，可见胎囊堵于宫口。其主要的护理问题是

- A. 营养失调
- B. 有滞产的危险
- C. 有产后出血的危险
- D. 有产后感染的危险
- E. 有新生儿窒息的危险

【答案】D

2926. 某孕妇妊娠 10 周，2 h 前出现阵发性腹痛且逐渐加重，阴道流血量增多。妇科检查：宫颈口已扩张，可见胎囊堵于宫口。该孕妇分娩方式的选择应根据

- A. 胎方位与胎产式
- B. 羊水量与性质
- C. 胎盘功能、胎儿大小与宫颈成熟度
- D. 胎盘位置与先露高低
- E. 孕妇全身状况的评估

【答案】C

2927. 药物流产适用于

- A. 妊娠 49 天以前
- B. 妊娠 10 周内
- C. 妊娠 10~14 周

D. 妊娠 15~24 周

E. 妊娠 14~28 周

**【答案】A**

2928. 负压吸宫术流产适用于

A. 妊娠 49 天以前

B. 妊娠 10 周内

C. 妊娠 10~14 周

D. 妊娠 15~24 周

E. 妊娠 14~28 周

**【答案】B**

2929. 依沙丫啶引产术适用于

A. 妊娠 49 天以前

B. 妊娠 10 周内

C. 妊娠 10~14 周

D. 妊娠 15~24 周

E. 妊娠 14~28 周

**【答案】D**

2930. 钳刮术流产适用于

A. 妊娠 49 天以前

B. 妊娠 10 周内

C. 妊娠 10~14 周

D. 妊娠 15~24 周

E. 妊娠 14~28 周

**【答案】C**

2931. 宫颈癌的早期症状

- A. 下腹剧痛
- B. 月经量增多
- C. 接触性出血
- D. 白带增多
- E. 不孕症

**【答案】C**

2932. 子宫肌瘤主要临床表现是

- A. 下腹剧痛
- B. 月经量增多
- C. 接触性出血
- D. 白带增多
- E. 不孕症

**【答案】B**

2933. 胎儿窘迫的主要表现是

- A. 胎心音改变
- B. 胎动异常
- C. 胎位异常
- D. 羊水浑浊
- E. 羊水过少

【答案】 ABDE

2934. 选择性子宫动脉栓塞及插管化疗后护理要点包括

- A. 教会患者轴向翻身的方法及床上解小便的方法
- B. 每天交接班时观察足背动脉搏动情况及双下肢的温度、颜色
- C. 注意观察压疮情况
- D. 严格遵医嘱给化疗药，注意速度
- E. 双下肢制动

【答案】 ABCDE

2935. 葡萄胎清宫术护理要点

- A. 建立有效的静脉通路
- B. 小手术，不用配血
- C. 术中观察患者有无面色苍白、出冷汗、口唇发绀
- D. 术后观察阴道出血及腹痛情况
- E. 出院指导应采用药物避孕

【答案】 ACD

2936. 妊娠合并心脏病最危险的3个时期是\_\_\_\_\_、分娩期和产后3天。

【答案】 妊娠32~34周

2937. 心功能III级可以哺乳，但应避免劳累。

- A. 正确
- B. 错误

**【答案】** B

2938. 子宫内膜癌对化疗敏感，属化疗敏感性肿瘤。

A. 正确

B. 错误

**【答案】** B

2939. 胎盘早剥一旦确诊，必须及时根据病情严重程度以及胎儿情况采取剖宫产或经阴道分娩终止妊娠。

A. 正确

B. 错误

**【答案】** A

2940. 年龄 50 岁以上，肥胖、高血压、糖尿病、绝经晚等因素均为子宫内膜癌的高危因素。

A. 正确

B. 错误

**【答案】** A

2941. 避孕

**【答案】** 指采用药物、器具或是利用妇女的生殖生理特点，帮助有性生活的育龄妇女暂时避免受孕。

2942. HELLP 综合征

**【答案】** HELLP 综合征是妊娠期高血压疾病的严重并发症，本病以溶血、肝酶升高及血小板减少为特点，常危及母儿生命。

2943. 分娩机制指

【答案】胎儿先露部为适应骨盆各平面的不同形态，被动地进行一系列的适应性转动，并以其最小径线通过产道的全过程

2944. 新婚夫妇欲半年后受孕，应选择最佳的避孕方法是

- A. 阴茎套
- B. 安全期避孕
- C. 口服避孕药
- D. 宫内节育器
- E. 皮下埋植避孕

【答案】A

2945. 对妊娠合并心脏病妇女产褥期的健康指导，正确的是

- A. 心功能Ⅱ～Ⅲ级可母乳喂养
- B. 产后24小时内应绝对卧床休息
- C. 产后48小时内应下地活动
- D. 需绝育者，一般在产后42天左右施行输卵管结扎术
- E. 母乳喂养的产妇，常规不用抗生素

【答案】B

2946. 外阴阴道假丝酵母菌病常见的易感人群为

- A. 老年妇女
- B. 幼女
- C. 围绝经期妇女
- D. 妊娠期妇女
- E. 哺乳期妇女

**【答案】D**

2947. 无排卵性功血的临床特点中，错误的陈述是

- A. 月经周期紊乱，经期长短不一
- B. 出血量时多时少
- C. 多在停经数周或数月后大量出血，不易自止
- D. 亦有表现为长时间少量出血
- E. 一般伴有腹痛

**【答案】E**

2948. 滴虫性阴道炎患者白带的典型改变是

- A. 呈脓性，有恶臭味
- B. 呈稀薄泡沫状
- C. 呈白色豆渣状
- D. 呈黄色水样
- E. 呈血性白带

**【答案】B**

2949. 判断产程进展的重要标志是

- A. 有规律的子宫收缩
- B. 胎头下降的程度
- C. 胎膜破裂
- D. 子宫颈管消失
- E. 见红

**【答案】B**

2950. 第三产程所需时间应为
- A. 5~10 分钟, 不超过 15 分钟
  - B. 5~10 分钟, 不超过 25 分钟
  - C. 5~15 分钟, 不超过 30 分钟
  - D. 10~20 分钟, 不超过 30 分钟
  - E. 20~30 分钟, 不超过 60 分钟

**【答案】C**

2951. 关于重型胎盘早剥的临床特点, 下列叙述正确的是
- A. 发生于妊娠早期
  - B. 可无腹部疼痛
  - C. 一定伴有阴道出血
  - D. 严重时出现休克征象
  - E. 贫血程度与外出血量成正比

**【答案】D**

2952. 输卵管妊娠最常见的原因是
- A. 内分泌失调
  - B. 受精卵游走
  - C. 输卵管慢性炎症
  - D. 输卵管手术粘连
  - E. 精神神经功能紊乱

**【答案】C**

2953. 新生儿沐浴前, 室温应调节在

- A. 18~20℃
- B. 20~22℃
- C. 22~24℃
- D. 24~26℃
- E. 26~28℃

**【答案】** E

2954. 髌嵴间径的正常值为

- A. 23~26 cm
- B. 25~28 cm
- C. 18~20 cm
- D. 8.5~9.5 cm
- E. 15~18 cm

**【答案】** B

2955. 以下不属于产力的是

- A. 子宫收缩力
- B. 腹肌收缩力
- C. 膈肌收缩力
- D. 坐骨海绵体肌收缩力
- E. 肛提肌收缩力

**【答案】** D

2956. 关于产程分期，下列正确的是

- A. 从规律宫缩至胎儿娩出称总产程

- B. 第一产程初产妇约需 14~16 小时
- C. 第一产程经产妇约需 10~12 小时
- D. 第二产程初产妇约需 1~2 小时
- E. 第三产程约需 30 分钟

【答案】D

2957. 行外阴根治术后的患者应取的体位是

- A. 半坐卧位
- B. 俯卧位
- C. 侧卧位
- D. 平卧位
- E. 膝胸卧位

【答案】D

2958. 以下关于过期妊娠的时间界定, 正确的是

- A. 妊娠 > 42 周
- B. 妊娠  $\geq$  42 周
- C. 妊娠 > 40 周
- D. 妊娠  $\geq$  40 周
- E. 37 周  $\leq$  妊娠  $\leq$  40 周

【答案】B

2959. 下列有关子宫托的使用, 不正确的是

- A. 护理人员应协助选择适应的型号
- B. 指导患者放置子宫托前洗净双手

- C. 子宫托必须由专业人员放置
- D. 每天睡前应取出子宫托清洗消毒后备用
- E. 上托后定期到医院检查

【答案】C

2960. 浆膜下肌瘤最常见的症状是

- A. 下腹包块
- B. 阴道排液量增多
- C. 不孕
- D. 下腹坠痛
- E. 经量增多

【答案】A

2961. 构成胎盘的母体部分是

- A. 底蜕膜
- B. 叶状绒毛膜
- C. 真蜕膜
- D. 包蜕膜
- E. 羊膜

【答案】A

2962. 不协调性子宫收缩乏力的宫缩特点是

- A. 收缩力差，无协调性
- B. 收缩力强，具有协调性
- C. 收缩过强且持续，无节律性放松

- D. 收缩极性倒置，间歇期子宫肌肉不能完全放松
- E. 子宫上下段交界处子宫环形肌不协调性过强收缩

**【答案】D**

2963. 某37岁女士，妊娠36周检查发现妊娠期高血压疾病，2小时前突然发生持续性腹痛伴阴道少量流血，面色苍白。首先考虑为：

- A. 先兆临产
- B. 先兆早产
- C. 先兆子宫破裂
- D. 胎盘早剥
- E. 前置胎盘

**【答案】D**

2964. 某孕妇平素月经周期规律，末次月经是2006年8月6日，其预产期应是

- A. 2007年5月9日
- B. 2007年5月13日
- C. 2007年5月15日
- D. 2007年5月18日
- E. 2007年5月21日

**【答案】B**

2965.

患者女性，55岁，阴道口脱出肿物1年，休息时能还纳。近半个月，经休息不能回纳，大笑、咳嗽时有小便流出，伴尿频，每次尿量不多，腰酸下坠感3年，以往有3次足月产史。妇科检查：会阴Ⅱ度陈旧性裂伤，阴道前壁有球形膨出，宫颈脱出于阴道外，子宫略小，两侧附件未触及。诊断应为

- A. 子宫脱垂Ⅲ度，Ⅲ度膀胱膨出伴尿道膨出
- B. 子宫脱垂Ⅱ度伴阴道前壁膨出
- C. 宫颈延长伴阴道前壁膨出
- D. 阴道前壁膨出伴张力性尿失禁
- E. 子宫脱垂Ⅲ度伴阴道前后壁膨出

【答案】B

2966. 患者女性，55岁，阴道口脱出肿物1年，休息时能还纳。近半个月，经休息不能回纳，大笑、咳嗽时有小便流出，伴尿频，每次尿量不多，腰酸下坠感3年，以往有3次足月产史。妇科检查：会阴Ⅱ度陈旧性裂伤，阴道前壁有球形膨出，宫颈脱出于阴道外，子宫略小，两侧附件未触及。此病最主要的预防措施是

- A. 注意休息，加强营养
- B. 保持大便通畅
- C. 老年人适当补充雌激素
- D. 积极治疗慢性咳嗽
- E. 推行科学接生和做好产褥期保健

【答案】E

2967. 先兆流产为

A. 停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，伴有轻微下腹痛。妇科检查子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出， HCG (+)

B. 停经后阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，见胚胎组织或胎囊堵于宫口， HCG (+)

C. 停经后阴道出血持续不止，下腹痛渐减轻。妇科检查子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，见部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内， HCG (±)

D. 停经后妊娠产物完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛渐消失。妇科检查子宫接近正常大小或略大，宫颈口已关闭， HCG (-)

E. 经后胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔内尚未自然排出。妇科检查子宫小于妊娠周数，宫颈口关闭， HCG (-)

**【答案】** A

2968. 不全流产为

A. 停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，伴有轻微下腹痛。妇科检查子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出， HCG (+)

B. 停经后阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，见胚胎组织或胎囊堵于宫口， HCG (+)

C. 停经后阴道出血持续不止，下腹痛渐减轻。妇科检查子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，见部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，HCG（±）

D. 停经后妊娠产物完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛渐消失。妇科检查子宫接近正常大小或略大，宫颈口已关闭，HCG（-）

E. 经后胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔内尚未自然排出。妇科检查子宫小于妊娠周数，宫颈口关闭，HCG（-）

**【答案】C**

2969. 完全流产为

A. 停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，伴有轻微下腹痛。妇科检查子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出，HCG（+）

B. 停经后阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，见胚胎组织或胎囊堵于宫口，HCG（+）

C. 停经后阴道出血持续不止，下腹痛渐减轻。妇科检查子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，见部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，HCG（±）

D. 停经后妊娠产物完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛渐消失。妇科检查子宫接近正常大小或略大，宫颈口已关闭，HCG（-）

E. 经后胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔内尚未自然排出。妇科检查子宫小于妊娠周数，宫颈口关闭，HCG (-)

**【答案】D**

2970. 稽留流产为

A. 停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，伴有轻微下腹痛。妇科检查子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出，HCG (+)

B. 停经后阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，见胚胎组织或胎囊堵于宫口，HCG (+)

C. 停经后阴道出血持续不止，下腹痛渐减轻。妇科检查子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，见部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，HCG (±)

D. 停经后妊娠产物完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛渐消失。妇科检查子宫接近正常大小或略大，宫颈口已关闭，HCG (-)

E. 经后胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔内尚未自然排出。妇科检查子宫小于妊娠周数，宫颈口关闭，HCG (-)

**【答案】E**

2971. 难免流产为

A. 停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，伴有轻微下腹痛。妇科检查子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出，HCG (+)

B. 停经后阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，见胚胎组织或胎囊堵于宫口，HCG (+)

C. 停经后阴道出血持续不止，下腹痛渐减轻。妇科检查子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，见部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，HCG (±)

D. 停经后妊娠产物完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛渐消失。妇科检查子宫接近正常大小或略大，宫颈口已关闭，HCG (-)

E. 经后胚胎或胎儿已死亡滞留在宫腔内尚未自然排出。妇科检查子宫小于妊娠周数，宫颈口关闭，HCG (-)

**【答案】** B

2972. 宫口开大 4 cm 后，又经过 10 小时宫口尚未开全者称

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

**【答案】** B

2973. 经产妇宫口开全 1 小时，胎儿尚未娩出者称

A. 潜伏期延长

- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

**【答案】D**

2974. 宫口开大 4 cm 后，子宫颈口不再继续扩张达 2 小时或 2 小时以上者称

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

**【答案】C**

2975. 卵巢上皮性肿瘤的标记物

- A. Ca125
- B. Ca199
- C. AEP
- D. HCG
- E. SCC

**【答案】A**

2976. 卵巢生殖细胞肿瘤的标记物

- A. Ca125

B. Ca199

C. AEP

D. HCG

E. SCC

**【答案】** C

2977. 子宫收缩力具有节律性、对称性、极性和\_\_\_\_\_的特点。

**【答案】** 缩复作用

2978. 胎盘早剥的处理原则是纠正休克、\_\_\_\_\_。

**【答案】** 及时终止妊娠

2979. 计划生育的具体内容包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_以及\_\_\_\_\_。

**【答案】** 晚婚,晚育,节育,提高人口素质

2980. \_\_\_\_\_是导致自然流产的主要原因。

**【答案】** 染色体异常

2981. 母亲患有严重疾病如精神病、子痫时, 婴儿可适当添加补充食物。

A. 正确

B. 错误

**【答案】** A

2982. 重度胎盘早剥以外出血为主, 剥离面超过胎盘面积的1/3, 同时有较大的胎盘后血肿, 多见于重度妊高征。

A. 正确

B. 错误

【答案】B

2983. 婴儿睡觉后应待其醒后再哺乳。

A. 正确

B. 错误

【答案】B

2984. 宫颈炎的主要临床表现为接触性出血。

A. 正确

B. 错误

【答案】B

2985. 子宫肌瘤的常见临床症状有哪些？

【答案】答：子宫肌瘤常见的临床症状为月经的改变；腹部肿块；白带增多；腹痛、腰酸、下腹坠胀；压迫症状；不孕、流产。

2986. 简述生殖道脱落细胞的巴氏5级分类。

【答案】答：生殖道脱落细胞的巴氏5级分类：巴氏Ⅰ级：未见不典型或异常细胞。巴氏Ⅱ级：发现不典型细胞，但无恶性特征细胞。巴氏Ⅲ级：发现可疑恶性细胞，或性质不明、细胞可疑，或怀疑恶性。巴氏Ⅳ级：发现不典型癌细胞，待证实。巴氏Ⅴ级：发现癌细胞，形态典型。

2987. 放置宫内节育器术后的健康指导

**【答案】**少量阴道出血和下腹痛等为正常现象，如出血多、腹痛明显、发热、白带异常应及时就诊。术后休息 2d，1 周内避免重体力劳动。2 周内禁止性生活和盆浴。遵医嘱定期随访，宫内节育器失败以 1 年内最多，以后逐渐稳定，因此应于放置后 1、3、6 个月各随访 1 次，以后每年随访 1 次，若发现以下情况应随时就诊：月经延迟；持续多量出血或月经异常；尾丝消失、变长、变短、节育器脱出、同房时不适；白带增多并有异味。术后 3 个月内经期与大便时注意宫内节育器是否脱落。

#### 2988. 压力性尿失禁

**【答案】**国际尿控协会提出的压力性尿失禁定义为：腹压的突然增加导致尿液不自主流出，不是由逼尿肌收缩压或膀胱壁对尿液的张力引起的。其特点为：正常状态下无遗尿，而腹压突然增高时尿液自动流出。

#### 2989. 先兆流产

**【答案】**指妊娠 28 周以前出现阴道流血或下腹痛，子宫颈口未开，妊娠产物尚未排出，有希望继续妊娠者。

#### 2990. 重症肺炎

**【答案】**指肺炎患儿除呼吸系统受累外，其他系统也受累，且全身中毒症状明显者。

#### 2991. 葡萄胎

**【答案】**葡萄胎是一种滋养细胞的良性病变。胎盘的绒毛形成大小不等的水泡，由细蒂相连成串，形如葡萄，故名葡萄胎，又称水泡状胎块。

2992. 雌孕激素的序贯疗法

**【答案】**即人工周期法，为模拟自然月经周期中卵巢内分泌的变化，将雌孕激素序贯使用，使子宫内膜发生相应的变化，引发周期性脱落。

2993. 胎儿生长受限

**【答案】**胎儿生长受限是指孕 37 周后，胎儿出生体重小于 2500 g；或低于同孕龄平均体重的两个标准差；或低于同孕龄正常体重的第 10 百分位数；是围生期的重要并发症。

2994. 潜伏期延长的定义是指潜伏期时间超过

- A. 初产妇大于 20 小时，经产妇大于 8 小时
- B. 初产妇大于 20 小时，经产妇大于 10 小时
- C. 初产妇大于 20 小时，经产妇大于 12 小时
- D. 初产妇大于 20 小时，经产妇大于 14 小时
- E. 初产妇大于 20 小时，经产妇大于 16 小时

**【答案】** D

2995. 关于女用短效口服避孕药的副作用，正确的说法是

- A. 类早孕反应是孕激素刺激胃黏膜所致
- B. 服药期间出现阴道流血，多因漏服药引起
- C. 月经量多者，不宜服用短效口服避孕药

- D. 体重增加是孕激素引起机体水钠储留的结果
- E. 面部皮肤出现色素沉着，是药物变质所致

**【答案】 B**

2996. 初产妇第二产程延长的定义是指第二产程时间超过

- A. 3.0 小时
- B. 2.5 小时
- C. 2.0 小时
- D. 1.5 小时
- E. 1.0 小时

**【答案】 A**

2997. 围绝经期妇女的临床表现应除外

- A. 潮红、潮热
- B. 忧郁、焦虑、多疑症
- C. 阴道黏膜变薄、阴道分泌物增多
- D. 皮肤变薄、瘙痒、多汗
- E. 骨骼压缩使体格变小

**【答案】 C**

2998. 阴道内有大量脓性黄绿色呈泡沫状分泌物的疾病是

- A. 细菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 假线酵母菌性阴道炎

**【答案】 B**

2999. 羊水过多的定义是指妊娠的任何时期羊水量超过

- A. 500 ml
- B. 1200 ml
- C. 1500 ml
- D. 2000 ml
- E. 3000 ml

**【答案】D**

3000. 早期妊娠是指

- A. 妊娠 8 周以前
- B. 妊娠 10 周以前
- C. 妊娠 12 周以前
- D. 妊娠 14 周以前
- E. 妊娠 16 周以前

**【答案】D**

3001. 对子宫脱垂的患者采用子宫托的目的是

- A. 支持子宫和阴道壁并使其维持在阴道内
- B. 使患者局部清洁舒适
- C. 减轻患者肉体上和精神上的痛苦
- D. 防止外阴部继发感染
- E. 手术治疗的术前准备措施

**【答案】A**

3002. 胎产式是指

- A. 胎儿先露部与母体纵轴的关系
- B. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系
- C. 胎儿纵轴与母体骨盆的关系
- D. 胎儿在母体内的姿势
- E. 胎儿先露部与母体骨盆轴的关系

【答案】B

3003. 新生儿 Apgar 评分的五项依据是

- A. 心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色
- B. 心率、呼吸、脐血管充盈度、羊水性状、皮肤颜色
- C. 心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射
- D. 心率、呼吸、喉反射、哭声、脐血管充盈度
- E. 心率、呼吸、喉反射、皮肤颜色、哭声

【答案】C

3004. 有关宫内节育器的避孕原理，正确的是

- A. 抑制卵巢排卵
- B. 阻止精子进入宫腔及输卵管
- C. 影响子宫内膜发育
- D. 干扰下丘脑-垂体-卵巢轴
- E. 干扰受精卵着床

【答案】E

3005. 关于阴道灌洗，错误的描述是

- A. 有清洁、收敛和热疗作用

- B. 冲洗筒宜挂于离床沿 1m 高处
- C. 月经期、产褥期禁用
- D. 未婚女子一般不作阴道灌洗
- E. 有活动性阴道流血者，禁止灌洗

【答案】B

3006. 下列属于临产的标志的是

- A. 见红，规律宫缩，胎头下降
- B. 规律宫缩，破膜，胎头下降
- C. 见红，破膜，宫口扩张
- D. 见红，破膜，规律宫缩
- E. 规律宫缩，胎头下降，宫口扩张

【答案】E

3007. 李女士行负压吸宫流产术，为其提供的术后护理措施中不正确的是

- A. 术后 1 个月内禁止盆浴
- B. 保持外阴清洁
- C. 术后 6 个月内禁止性生活
- D. 术后休息 1~2 小时，无异常者可出院
- E. 若有明显腹痛持续 10 天以上，应随时到医院就诊

【答案】C

3008. 某孕妇妊娠 39 周，自然破膜，医师根据羊水性状判断为 II 度污染，此时羊水是

- A. 浅绿色
- B. 绿色
- C. 黄绿色并浑浊
- D. 黄色并浑浊
- E. 棕黄色并浑浊

【答案】C

3009. 患者女性，65岁，停经15年，现有阴道出血。妇科检查：宫颈表面光滑，子宫丰满、质软，双附件阴性，最有可能的诊断是

- A. 老年性阴道炎
- B. 子宫肌瘤
- C. 子宫内膜癌
- D. 宫颈癌
- E. 卵巢癌

【答案】C

3010. 孕妇24岁，G2P1，孕40周，破水14小时，有规律宫缩10小时，胎儿手脱出阴道口来院。检查：产妇神志清，痛苦面容。腹痛拒按，烦躁不安。脉搏、呼吸快，胎心不清，约160次/分。此时应首先考虑的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 前置胎盘
- C. 先兆子宫破裂

D. 不完全子宫破裂

E. 完全子宫破裂

【答案】C

3011. 孕妇 24 岁，G2P1，，孕 40 周，破水 14 小时，有规律宫缩 10 小时，胎儿手脱出阴道口来院。检查：产妇神志清，痛苦面容。腹痛拒按，烦躁不安。脉搏、呼吸快，胎心不清，约 160 次/分。最有早期诊断意义的症状、体征是

A. 产妇疼痛难忍，呼叫

B. 出现病理缩复环

C. 子宫轮廓不清

D. 导尿见肉眼血尿

E. 清楚触及胎体

【答案】B

3012. 孕妇 24 岁，G2P1，，孕 40 周，破水 14 小时，有规律宫缩 10 小时，胎儿手脱出阴道口来院。检查：产妇神志清，痛苦面容。腹痛拒按，烦躁不安。脉搏、呼吸快，胎心不清，约 160 次/分。对该孕妇的最佳处理措施是

A. 抑制宫缩同时进行急诊剖宫产术前准备

B. 乙醚麻醉下行内倒转术

C. 抗休克治疗

D. 剖宫产术

E. 消毒手后将胎儿送回阴道内

**【答案】 A**

3013. 某 32 岁初孕妇，宫内孕 35 周，疲乏，脸色苍白来院。主诉既往身体健康，月经规律。检查见血压 160/115 mmHg，脉搏 110 次/分，尿蛋白（+），轻度右侧脚踝水肿，无头痛表现。此患者最可能的诊断是

- A. 一过性血压增高
- B. 轻度妊高征
- C. 中度妊高征
- D. 重度妊高征
- E. 子痫

**【答案】 D**

3014. 某 32 岁初孕妇，宫内孕 35 周，疲乏，脸色苍白来院。主诉既往身体健康，月经规律。检查见血压 160/115 mmHg，脉搏 110 次/分，尿蛋白（+），轻度右侧脚踝水肿，无头痛表现。对该妇女进行解痉治疗，首选药物是

- A. 降压药物
- B. 扩充血容量
- C. 利尿治疗
- D. MgSO<sub>4</sub> 深肌内注射
- E. 缩宫素促进宫缩

**【答案】 D**

3015.

某 32 岁初孕妇，宫内孕 35 周，疲乏，脸色苍白来院。主诉既往身体健康，月经规律。检查见血压 160/115 mmHg，脉搏 110 次/分，尿蛋白（+），轻度右侧脚踝水肿，无头痛表现。若对该孕妇积极解痉治疗，应该准备用来解毒的药物是

- A. 10%葡萄糖酸钙
- B. 10%葡萄糖酸钠
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 10%葡萄糖酸锌
- E. 5 %碳酸氢钙

**【答案】** A

3016. 某 32 岁初孕妇，宫内孕 35 周，疲乏，脸色苍白来院。主诉既往身体健康，月经规律。检查见血压 160/115 mmHg，脉搏 110 次/分，尿蛋白（+），轻度右侧脚踝水肿，无头痛表现。该患者发生抽搐时，首要的护理措施是

- A. 立即通知医生
- B. 观察病情并详细记录
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 加床挡防止受伤
- E. 将患者安排在单人暗室

**【答案】** C

3017. 某孕妇孕 36 周，在乘坐的公共汽车急刹车后撞击腹部突感剧烈腹痛难忍。检查：血压 140/100 mmHg，阴道无流血，

子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，

胎位不清，胎心约 90 次/分。该孕妇最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 前置胎盘
- C. 妊娠高血压综合征
- D. 胎盘早期剥离
- E. 不完全性子宫破裂

【答案】D

3018. 某孕妇孕 36 周，在乘坐的公共汽车急刹车后撞击腹部突感剧烈腹痛难忍。检查：血压 140/100 mmHg，阴道无流血，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，胎位不清，胎心约 90 次/分。对该孕妇的正确处理是

- A. 及时终止妊娠
- B. 期待疗法
- C. 积极降压治疗
- D. 及时抑制宫缩
- E. 积极补充血容量

【答案】A

3019. 葡萄胎镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性的或完好的绒毛结构

- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内膜层，间质没有发现水肿

【答案】A

3020. 侵蚀性葡萄胎镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性的或完好的绒毛结构

- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内膜层，间质没有发现水肿

【答案】C

3021. 绒毛膜癌镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性的或完好的绒毛结构

- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内膜层，间质没有发现水肿

【答案】B

3022. 正常妊娠表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失

C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性的或完好的绒毛结构

D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化

E. 滋养细胞侵入子宫内膜层，间质没有发现水肿

**【答案】D**

3023. 不是子宫内膜癌的高危因素是

A. 雌激素刺激

B. 肥胖

C. 多个性伴侣

D. 糖尿病

E. 高血压及其他心血管疾病等

**【答案】C**

3024. 子宫肌瘤的主要病因是

A. 雌激素刺激

B. 肥胖

C. 多个性伴侣

D. 糖尿病

E. 高血压及其他心血管疾病等

**【答案】A**

3025. 足月儿

A. 胎龄 < 37 周

B. 胎龄 37 ~ 42 周

- C. 胎龄>42 周
- D. 胎龄<36 周
- E. 胎龄 38~43 周

【答案】B

3026. 早产儿

- A. 胎龄<37 周
- B. 胎龄 37~42 周
- C. 胎龄>42 周
- D. 胎龄<36 周
- E. 胎龄 38~43 周

【答案】A

3027. 妊娠合并风湿性心脏病、早期心力衰竭表现

- A. 心尖部 2 级收缩期杂音
- B. 踝部凹陷性水肿
- C. 两者均有
- D. 两者均无

【答案】A

3028. 正常妊娠表现

- A. 心尖部 2 级收缩期杂音
- B. 踝部凹陷性水肿
- C. 两者均有
- D. 两者均无

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/497020002135010011>