

中山大学附属第五医院 6 月三基三严练习题

1. 急性呼吸窘迫综合征给氧的浓度为()。 [单选题]*

A.10% ~ 20%

B.21% ~ 28%

C.29% ~ 38%

D.39% ~ 50% (正确答案)

E.>50%

2. 以下预防压疮的措施, 不正确的是()。 [单选题]*

A.避免局部长受压

B.勤换衣服、床单 (正确答案)

C.增进局部血液循环

D.避免潮湿、磨擦及排泄物的刺激

E.增加营养的摄入

3. 应先换药的伤口是()。 [单选题]*

A.破伤风伤口

B.脓肿切开引流的伤口

C.乳腺手术切口拆线 (正确答案)

D.压疮创面

E. 肾盂切口取石术后拔除引流物

4. 颈外静脉穿刺的正确部位是()。 [单选题]*

A.下颌角与锁骨上缘中点连线上 1/3 处 (正确答案)

B.下颌角与锁骨上缘中点连线上 1/2 处

- C.下颌角与锁骨上缘中点连线下 1/3 处
- D.下颌角与锁骨下缘中点连线下 1/2 处
- E.下颌角与胸骨柄连线上 1/3 处

5. 患者长期仰卧时，最容易发生压疮的部位是()。 [单选题]*

- A.枕部
- B.足跟
- C.骶尾部 (正确答案)
- D.髂前上棘
- E.肩胛部

6. 应用乙醚麻醉前赋予阿托品的目的是()。 [单选题]*

- A.协助松弛骨骼肌
- B.防止休克
- C.解除胃肠道痉挛
- D.减少呼吸道腺体分泌 (正确答案)
- E.镇静作用

7. 静脉注射时止血带紧扎在穿刺部位上方的()。 [单选题]*

- A.2cm
- B.4cm
- C.6cm (正确答案)
- D.8cm
- E.10cm

8. 关于病房的医院感染管理措施，不正确的是()。 [单选题]*

- A.感染患者与非感染患者分开

B. 同类感染患者相对集中

C. 特殊感染患者单独安置

D. 地面应常规使用含氯消毒剂消毒 (正确答案)

E. 室内应定时通风换气，必要时进行空

9. 能高亲和抗体 IgE 的细胞是 ()。 [单选题]*

A. 嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞

B. 肥大细胞和嗜碱性粒细胞 (正确答案)

C. 中性粒细胞和嗜碱性粒细胞

D. 单核细胞和淋巴细胞

E. 单核细胞和巨噬细胞

10. 低嘌呤膳食不包括 ()。 [单选题]*

A. 精白米

B. 牛奶

C. 鸡蛋

D. 肉汁 (正确答案)

E. B 族维生素

11. 传染病的基本特征不包括 ()。 [单选题]*

A. 有感染后免疫

B. 有病原体

C. 有流行病学特征 (正确答案)

D. 有传染性

E. 有遗传性

12. 患者的义齿取下后应浸泡的溶液为 ()。 [单选题]*

A.70% 乙醇

B.温开水

C.冷开水

D.0.5% 过氧乙酸溶液 (正确答案)

E.0.1% 苯扎溴铵溶液

13. 以下情况中，患者必须取侧卧位的情况为 ()。 [单选题]*

A.胸腔穿刺

B.腹腔穿刺

C.腰椎穿刺 (正确答案)

D.肝穿刺

E.关节腔穿刺

14. 输液速度过快导致急性肺水肿的特征性症状是 ()。 [单选题]*

A.呼吸艰难、发绀

B.胸闷气促、烦躁不安

C.心悸、恶心、呕吐

D.呼吸艰难、咳嗽、胸闷、咳粉红色泡沫痰 (正确答案)

E.寒颤、高热、呼吸艰难

15. 对女性尿道的叙述不正确的是 ()。 [单选题]*

A 窄 (正确答案)

B.短

C.直

D.后方紧邻肛门

E.易发生逆行性尿路感染

16. 高血压患者的营养治疗原则最重要的是 ()。 [单选题]*

- A.减少热量摄入
- B.减少脂肪摄入
- C.限盐 (正确答案)
- D.多吃鱼和大豆
- E.多摄食钾、镁、碘、锌含量高的食物

17. 大量饮水后尿量增多，主要是由于()。 [单选题]*

- A.肾小球滤过率增高
- B.囊内压降低
- C.血浆胶体渗透压降低
- D.醛固酮分泌减少
- E.抗利尿激素分泌减少 (正确答案)

18. 腹腔穿刺放液，初次放液量应控制在()。 [单选题]*

- A.500ml 以下
- B.800ml 以下
- C.1000ml 以下 (正确答案)
- D.1500ml 以下
- E.1800ml 以下

19. 服用铁剂的最佳时间是()。 [单选题]*

- A.餐前
- B.餐后
- C.晨起时
- D.两餐之间 (正确答案)
- E.临睡前

20. 我国现存医学文献中最早的一部典籍是()。 [单选题]*

- A. 《类经》
- B. 《温病条辨》
- C. 《本草纲目》
- D. 《黄帝内经》 (正确答案)
- E. 《伤寒杂病论》

21. 为昏迷病员做口腔护理时，特殊应注意()。 [单选题]*

- A.操作时动作要轻
- B.观察口腔黏膜
- C.血管钳夹紧棉球，蘸水不可过多 (正确答案)
- D.用压舌板轻轻撑开颊部
- E.从外向里擦净口腔及牙齿的各面

22. 张力性气胸进行急救时首选的治疗方式是()。 [单选题]*

- A.手术治疗
- B.胸带固定
- C.排气减压 (正确答案)
- D.镇静止痛
- E.抗生素治疗

23. 确定一种传染病的隔离期是根据该患者()。 [单选题]*

- A.传染性大小
- B.病情严重程度
- C.病程的长短
- D.潜伏期长短
- E. 以上都不是 (正确答案)

24. 高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是()。 [单选题]*

A.血浆中物理溶解氧量增加 (正确答案)

B.血液中结合氧量增加

C.血液中血红蛋白增加

D.氧和血红蛋白的亲合力增加

E.机体的摄氧能力增强

25. 体温每升高 1C ， 心率平均每分钟约增加 ()。 [单选题]*

A.5 次

B.10 次

C.18 次 (正确答案)

D.20 次

E.25 次

26. 吸气时脉搏明显减弱或者消失称为 ()。 [单选题]*

A.脉搏短绌

B.交替脉

C.水冲脉

D.细脉

E.奇脉 (正确答案)

27. 、我国医院感染最常发生的部位是 ()。 [单选题]*

A.泌尿道

B.外科切口

C.血液

D.呼吸道 (正确答案)

E.胃肠道

28. 输血相关移植物抗宿主病易发生于 ()。 [单选题]*

- A.肺炎患者输血后
- B.再生障碍性贫血患者输血后 (正确答案)
- C.白血病患者输血后
- D.溶血性贫血患者输血后
- E.严重免疫缺陷性疾病输血后

29. 最常见的输液反应是()。 [单选题]*

- A.过敏反应
- B.发热反应 (正确答案)
- C.空气栓塞
- D.静脉炎
- E.急性肺水肿

30. 抗肿瘤药最常见、最严重的不良反应是()。 [单选题]*

- A.大量脱发
- B.肝细胞受损
- C.神经毒性作用
- D.胃肠道反应
- E.抑制骨髓造血 (正确答案)

31. 护理人员在给患者做口腔护理时，宜采取的距离为()。 [单选题]*

- A.亲密的距离 (正确答案)
- B.个人的距离
- C.社交的距离
- D.公众的距离
- E. 以上都对

32. 沙眼的防治为()。 [单选题]*

A.不能行滤泡压榨术 (正确答案)

B.局部短暂滴药

C.滴药使瞳孔缩小，减少疼痛

D.沙眼患者所实用具一律分开使用

E.一人一巾，局部滴 15% 磺胺醋酰钠眼药水

33. 下列不属于外科急腹症临床表现的是()。 [单选题]*

A.腹痛

B.腹泻 (正确答案)

C.腹膜刺激征

D.恶心、呕吐

E.肠鸣音改变

34. 药效发挥最快的给药途径是()。 [单选题]*

A.肌肉注射

B.皮下注射

C.吸入法

D.静脉注射 (正确答案)

E.口服给药

35. 上尿路结石的主要症状是()。 [单选题]*

A.肾绞痛呈放射状

B.尿频、尿痛

C.疼痛、血尿 (正确答案)

D.尿频、血尿

E.血尿并发热

36. 与肝癌发病关系密切的因素是()。 [单选题]*

(正确答案)

- B.紫外线照射
- C.镍和镍的化合物
- D.砷和砷的化合物
- E.双氯甲醚和氯甲基甲醚

37. 手术前患者的饮食应为()。 [单选题]*

- A.低盐
- B.低胆固醇膳食
- C.多饮水
- D.高能、高维生素膳食(正确答案)
- E.粗、细粮搭配食用

38. 调节毛细血管内、外水分正常分布的是()。 [单选题]*

- A.血浆胶体渗透压(正确答案)
- B.血浆晶体渗透压
- C.血浆钠离子浓度
- D.组织液晶体渗透压
- E.组织液胶体渗透压

39. 下列内镜需灭菌，但除外()。 [单选题]*

- A.支气管纤维镜(正确答案)
- B.腹腔镜
- C.脑室镜
- D.关节镜
- E.胸腔镜

40. 下列动脉为最常用的摸脉点是()。 [单选题]*

(正确答案)

- B.肱动脉
- C.足背动脉
- D.股动脉
- E.颞浅动脉

41. 口腔真菌感染选择的漱口液为()。 [单选题]*

- A.1% ~ 2% 甲紫
- B.复方硼砂溶液
- C.0.1% 依沙吡啶溶液
- D.0.02% 呋喃西林溶液
- E.1% ~ 3% 碳酸氢钠溶液(正确答案)

42. 关于灌肠的注意事项, 不正确的是()。 [单选题]*

- A.肝性脑病患者不能用肥皂水灌肠
- B.为患者降温时, 液体的温度宜为 4 (正确答案)
- C.保留灌肠宜保留 1h 以上
- D.大量不保留灌肠时, 灌肠筒距肛门的高度宜为 40 ~ 60cm
- E.为患者解除便秘时, 液体应保留 5 ~ 10min

43. 炎性水肿产生的主要机制是()。 [单选题]*

- A.微血管壁通透性增高(正确答案)
- B.组织间液流体静压增高
- C.组织间液胶体渗透压升高
- D.淋巴管阻塞引起淋巴回流障碍
- E.病灶血管内血浆胶体渗透压降低

44. 关于消毒灭菌方法的选择, 错误的是()。 [单选题]*

B.手术器具与物品首选压力蒸汽灭菌法灭菌

C.消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒

D.化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用，应加以推广 (正确答案)

E.不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法，如环氧乙烷灭菌

45. 安装心脏起搏器后浮现下列哪种症状需即将到医院就诊 ()。 [单选题] *

A.睡眠不佳

B.感觉无力

C.胸痛、呃逆、发热、呼吸艰难 (正确答案)

D.小便次数稍增加

E. 自感记忆减退

46. 核素显像技术的优势是 ()。 [单选题] *

A.影像分辨率高

B.价格便宜

C.可显示脏器功能 (正确答案)

D.无辐射伤害

E.可断层显像

47. 有关医院感染预防与控制的概念，叙述不正确的是 ()。 [单选题] *

A.部份医院感染是可以预防的

B. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致 (正确答案)

C.洗手是预防医院感染的重要措施

D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因

E.滥用抗菌药物可致二重感染

()。 [单选题] *

- A.保持尿液引流通畅
- B.治疗某些膀胱疾病
- C.辅助诊断某些膀胱疾病 (正确答案)
- D.防止膀胱内血块形成
- E.减轻因异物引起的疼痛

49. 溃疡病患者的饮食护理是 ()。 [单选题] *

- A.高蛋白、低盐饮食 (正确答案)
- B.低脂肪、适量蛋白饮食
- C.禁食
- D.暂停蛋白质饮食
- E.高蛋白、适量脂肪饮食

50. 为患者吸痰时导致缺氧加重，每次抽吸的时间应 ()。 [单选题] *

- A.<10s
- B.<15s (正确答案)
- C.<30s
- D.<1min
- E.<3min

51. 下列注射进针的角度错误的是 ()。 [单选题] *

- A.皮内注射针头与皮肤呈 5°
- B.皮下注射针头与皮肤呈 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- C.肌肉注射针头与皮肤呈 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ (正确答案)
- D.静脉注射针头与皮肤呈 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- E.动脉注射针头与动脉走向呈 40°

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497112004160006114>