

2020 年浙江杭州医疗卫生招聘考试护理学模考卷附答案

一、判断题

1、患者在医院内通过空气、水、医疗器械引起的间接感染，属于外源性感染。[判断题] *

对(正确答案)

错

2、6 个月的小儿头围与胸围基本相等。 [判断题] *

对

错(正确答案)

3、导致肛裂患者排便后出现再次持续疼痛的原因主要是肛乳头水肿。 [判断题] *对

错(正确答案)

4、二氧化碳潴留使脑血管扩张引起颅内压增高。 [判断题] *

对(正确答案)

错

5、促进尿潴留病人排尿，属于条件反射的方法是温水冲洗会阴部。 [判断题] *对(正确答案)

错

6、肛管排气时，保留时间一般不超过 30 分钟。 [判断题] *

对

错(正确答案)

7、诊断早期胃癌的最可靠方法是纤维胃镜检查。 [判断题] *

对(正确答案)

错

8、心绞痛发作时要赶紧去医院就医。 [判断题] *

对

错(正确答案)

9、双胍类药物应该大剂量服用。 [判断题] *

对

错(正确答案)

10、斜疝修补术后早期,最适宜的卧位是仰卧位膝下垫软枕。 [判断题] *

对(正确答案)

错

11、尿三杯试验第一杯异常提示病变在尿道。 [判断题] *

对(正确答案)

错

12、破伤风最早出现的症状是角弓反张,最常见的致死原因是窒息。 [判断题] *对

错(正确答案)

13、促卵泡激素和黄体生成素由下丘脑分泌。 [判断题] *

对

14、急性肾衰竭的治疗补液原则是量出为入,宁多勿少。 [判断

题] *

对

错(正确答案)

15、小儿生长发育最迅速的时期是幼儿期和青春期。 [判断题] *

对

错(正确答案)

16、脱下的隔离衣若挂在半污染区，污染面朝外。 [判断题] *

对

错(正确答案)

17、治疗厌氧菌所致的败血症首选头孢类抗生素。 [判断题] *

对

错(正确答案)

18、患者的睡眠、心情可影响其血压变化。 [判断题] *

对(正确答案)

错

19、凡平时月经周期规律，妊娠达到 40 周尚未分娩者称过期妊娠。 [判断题] *对

错(正确答案)

20、护士在采集标本前应认真核对医师填写的检验申请单，如有疑问，可拒不执行。 [判断题] *

对

二、单选题

1、护士张某为患者做青霉素皮试，下列青霉素皮试结果，哪一种情况可以注射青霉素： [单选题]

- A、局部红晕直径 1、5cm，无自觉症状
- B、局部红晕直径 0、5cm，有胸闷、头晕
- C、局部红晕直径 0、7cm，周围有伪足，有痒感
- D、局部红晕直径 0、7cm，无自觉症状(正确答案)
- E、局部红晕直径 1、5cm，局部皮丘隆起，出现红晕硬块

2、胃癌最主要的转移途径是： [单选题]

- A、直接蔓延
- B、淋巴转移(正确答案)
- C、血行转移
- D、腹腔内种植
- E、盆腔内种植

3、急性肺水肿时病人的卧位应采用： [单选题]

- A. 端坐位(正确答案)
- B. 俯卧位
- C. 仰卧位
- D. 侧卧位
- E. 平卧位

4、下列不可以选作皮下注射的部位是： [单选题]

- A. 两侧腹壁
- B. 大腿外侧

C. 前臂掌侧下缘 (正确答案)

D. 上臂三角肌下缘

E. 上臂外侧

5、药物过敏试验一般采用： [单选题]

A. 皮下注射

B. 皮内注射 (正确答案)

C. 肌肉注射

D. 静脉注射

E. 口服

6、个体对所受压力而产生的一系列非特异性反应称： [单选题]

A. 压力源

B. 压力防卫

C. 压力适应 (正确答案)

D. 压力

E. 压力过高

7、黄体酮 20mg im biw, 其中 biw 指： [单选题]

A. 一天 1 次

B. 一天 2 次

C. 每周 2 次 (正确答案)

D. 每周 1 次

E. 隔日 1 次

8、在抢救溶血反应时，为增加血红蛋白在尿中的溶解度，减少

沉淀，避免肾小管阻塞，可选用下列哪种药物： [单选题]

- A. 氯化钠溶液
- B. 碳酸氢钠溶液 (正确答案)
- C. 葡萄糖溶液
- D. 乳酸钠溶液
- E. 5%葡萄糖氯化钠溶液

9、药物止痛是最常用的止痛方式之一，对于慢性疼痛患者，最好在-----给药。 [单选题]

- A. 发作时
- B. 发作前 (正确答案)
- C. 发作后
- D. 进食后半小时
- E. 进食前

10、下列为了预防患者发生输血的过敏反应提前应做好的准备错误的是： [单选题]

- A. 正确管理血制品和血液
- B. 选用无过敏史的供血者
- C. 供血者在采血前 8 小时内不宜吃高蛋白和高脂肪的食物 (正确答案)
- D. 对于有过敏史的患者，输血前遵医嘱给予抗过敏的药物
- E. 供血者在采血前宜用清淡饮食或饮糖水

11、某高血压病人，医生给予口服卡托普利 50mg，一日 3 次，

服药第二天，起床时感到眩晕、恶心，此时护士对病人应采取：

[单选题]

- A. 半卧位休息
- B. 平卧抬高下肢(正确答案)
- C. 坐位并吸氧
- D. 饮温开水少许
- E. 平卧抬高头部

12、肝性脑病患者急性期禁用的饮食是： [单选题]

- A. 低蛋白饮食
- B. 低脂肪饮食
- C. 高蛋白饮食(正确答案)
- D. 高维生素饮食
- E. 高热量饮食

13、大量咳痰是指痰量超过： [单选题]

- A. 10ml
- B. 30ml
- C. 5ml
- D. 100ml(正确答案)
- E. 50ml

14、冠心病伴肝硬化上消化道出血治疗错误的是： [单选题]

- A. 三腔管压迫
- B. 去甲肾上腺素胃管滴注

C. 垂体后叶素静脉滴注(正确答案)

D. 冰盐水洗胃

E. 6-氨基乙酸静点

15、王某，56岁，急性肾衰。病人出现需要紧急处理的电解质紊乱是： [单选题]

A. 低钠血症

B. 低氯血症

C. 高钙血症

D. 高钾血症(正确答案)

E. 高镁血症

16、关于糖尿病的饮食安排，以下哪项正确： [单选题]

A. 土豆为主

B. 面食为主

C. 少量多餐(正确答案)

D. 以高蛋白、高纤维食物为主

E. 高脂饮食

17、甲亢病人的饮食护理不正确的是： [单选题]

A. 高热量

B. 高蛋白

C. 高维生素

D. 高纤维素(正确答案)

E. 低膳食纤维饮食

18、患者男，35岁。因再生障碍性贫血入院治疗。入院当日血常规结果 Hb

59g/L，护士对该患者制定的休息与活动计划为： [单选题]

- A. 绝对卧床休息，协助自理活动
- B. 卧床休息为主，间断床上及床边活动(正确答案)
- C. 床上活动为主，适当增加休息时间
- D. 床边活动为主，增加午睡及夜间睡眠时间
- E. 适当进行室内运动，避免重体力活动

19、患儿男，10个月，今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点，经实验室检查诊断为特发性（急性型）血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患儿的： [单选题]

- A. 骨髓象巨核细胞比例
- B. 血小板计数(正确答案)
- C. 红细胞计数
- D. 白细胞计数
- E. 血红蛋白含量

20、关于尿毒症患者护理说法错误的是： [单选题]

- A. 按肾病常规护理
- B. 要用酒精擦洗身体(正确答案)
- C. 观察患者有无酸中毒深呼吸现象
- D. 勤用温水擦澡、勤换衣

E. 加强生活护理、预防感染

21、某消化性溃疡病人原有疼痛节律消失变为持续腹痛伴随频繁呕吐，呕吐物为发酵性宿食。可能的并发症是： [单选题]

A. 幽门梗阻(正确答案)

B. 急性胰腺炎

C. 穿孔

D. 胃癌

E. 消化道出血

22、与白血病发病无关的因素是： [单选题]

A. 药物化学因素

B. 病毒因素

C. 物理因素

D. 免疫功能亢进(正确答案)

E. 遗传因素

23、肺源性心脏病并发呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是： [单选题]

A. 呼吸困难

B. 发绀(正确答案)

C. 意识障碍

D. 肺功能下降

E. 球结膜水肿

24、骨科手术前几天开始备皮： [单选题]

A. 1

B. 2

C. 3 (正确答案)

D. 4

E. 5

25、下列哪项为类风湿关节炎的表现： [单选题]

A. 梭状指 (正确答案)

B. 杵状指

C. 匙状指

D. 膝内翻

E. 桶状胸

26、应用环磷酰胺治疗肾小球肾炎，应特别注意： [单选题]

A. 胃肠道反应

B. 血压升高

C. 继发感染

D. 出血性膀胱炎 (正确答案)

E. 口腔溃疡

27、下列不符合关节型过敏性紫癜临床表现的是： [单选题]

A. 关节肿胀

B. 多发生于大关节

C. 部位固定、非游走性 (正确答案)

D. 关节症状可反复发作

E. 不遗留关节畸形

28、护士对系统性红斑狼疮患者采取的护理措施中,不妥当的是:

[单选题]

A. 保持皮肤清洁完整

B. 床上应阳光充足(正确答案)

C. 病室内温度 18~20℃

D. 避免劳累

E. 病室内湿度 50%~60%

29、患者大咯血,首选给予的止血药为: [单选题]

A. 垂体后叶素(正确答案)

B. 止血敏

C. 安咯血

D. 维生素 K

E. 凝血酶

30、口服有机磷农药急性中毒,其中毒症状出现的时间为: [单选题]

A. 10 分钟至 2 小时(正确答案)

B. 2 小时后

C. 6 小时后

D. 12 小时后

E. 24 小时后

31、属于休克微循环收缩期的病理生理变化是: [单选题]

A. 少灌多流(正确答案)

B. 少流多灌

C. 静水压升高

D. 微血栓形成

E. 微循环扩张

32、患者，男性，26岁，拟在局部麻醉下行脓性指头炎切开引流术。护士告诉患者术前饮食要求是： [单选题]

A. 禁食3小时

B. 禁食6小时

C. 禁食10小时

D. 禁食24小时

E. 不必禁食(正确答案)

33、成人颅内压的正常值是： [单选题]

A. 50~100mmH₂O

B. 70~200mmH₂O(正确答案)

C. 90~220mmH₂O

D. 110~240mmH₂O

E. 80~210mmH₂O

34、毕Ⅱ式胃大部切除术，与残胃吻合的器官是： [单选题]

A. 上段空肠(正确答案)

B. 下段空肠

C. 下段回肠

D. 上段回肠

E. 盲肠

35、患者女，42岁。因服农药自杀未遂被送往医院急诊科抢救。

护士在抢救患者时执行口头医嘱正确的是： [单选题]

A. 边执行边向医生复述

B. 向医生复述一遍，确认无误后方可执行，且在抢救完成6小时内补写书面医嘱(正确答案)

C. 向医生复述两遍后，立即执行

D. 立即执行，抢救完毕后补医嘱

E. 向医生复述一遍，确认无误后方可执行，且在抢救完成24小时内补写书面医嘱

36、食管癌最好发的部位是： [单选题]

A. 食管与胃交界处

B. 胸部上段

C. 胸部中段(正确答案)

D. 胸部下段

E. 食管中下段

37、男性，70岁，肝癌晚期全身转移，极度衰弱。对其护理应考虑： [单选题]

A. 让病人有尊严地度过余生(正确答案)

B. 提供根治疗法

C. 放弃特殊治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498060005053006135>