2024河南省济源市《执业药师之西药学专业二》资格考试大全及答案（真题汇编）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是()

A：普萘洛尔

B：胺碘酮

C：利多卡因

D：奎尼丁

答案：B

2.可增加肝毒性的药物是

A：β受体阻断剂

B：阿糖胞苷

C：甲氨蝶呤

D：利福平

答案：D

3.（2015年真题）属于凝血因子Xa直接抑制剂的抗凝药是（）。

A：利伐沙班

B：依诺肝素

C：肝素

D：华法林

答案：A

4.（2021 年真题）患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 氯吡格雷

B: 双嘧达莫

C: 利伐沙班

D: 替格瑞洛

答案：C

5.叶酸主要用于治疗

A: 妊娠期巨幼红细胞性贫血

B: 溶血性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 缺铁性贫血

答案：A

6.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A: 柳氮磺吡啶

B: 磺胺米隆

C: 磺胺嘧啶

D: 磺胺甲噁唑

答案：A

7.扎鲁司特属于

A: M 胆碱受体阻断剂

B: 白三烯调节剂

C: β 肾上腺素受体激动剂

D: 黄嘌呤类药物

答案：B

8.以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有7～12min的药物是

A: 促性腺激素

B: 促肾上腺皮质激素

C: 醋酸去氨加压素

D: 催乳素

答案：B

9.可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

A: 雷尼替丁

B: 甘草酸二铵

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 甲氧氯普胺

答案：A

10.可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

A: 胺碘酮

B: 美托洛尔

C: 地尔硫革

D: 维拉帕米

答案：A

11.以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 东莨菪碱

B: 阿托品

C：新福林

D：后马托品

答案：C

12.属于第四代头孢菌素的药物的是()。

A：头孢吡肟

B：头孢氨苄

C：头孢拉定

D：头孢哌酮

答案：A

13.维A酸类药物不能用于下述哪种疾病

A：角化异常性皮肤病

B：鱼鳞病

C：光敏性皮肤病

D：银屑病

答案：C

14.可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A：氨氯地平

B：硝普钠

C：阿托普利

D：阿利克仑（阿利吉仑）

答案：B

15.高血压合并痛风者不宜使用

A：氢氯噻嗪

B：阿替洛尔

C: 依那普利

D: 硝苯地平

答案：A

16.左氧氟沙星用于治疗()

A: 伤寒、副伤寒

B: 布鲁菌病

C: 鼠疫、土拉菌病

D: 钩端螺旋体病

答案：A

17.将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A: 阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

B: 有利于药物进入结核感染病灶

C: 延长链霉素作用时间

D: 延迟肾脏排泄链霉素

答案：A

18.()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：A

19.麻黄碱滴鼻剂的适应证是

A: 过敏性鼻炎

B: 鼻黏膜充血

C: 萎缩性鼻炎

D: 药物性鼻炎

答案：B

20.林可霉素类的主要作用靶点是

A: 核糖体的 50S 亚基

B: 核糖体的 30S 亚基

C: 细胞内膜 PBP

D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：A

21.福莫特罗的平喘作用维持时间是

A: 10~12 小时

B: 3~5 分钟

C: 4~6 小时

D: 10~20 分钟

答案：A

22.患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 大于 90%

B: 30%~90%

C: 1

D: 10%~30%

答案：A

23.（2016 年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 人血白蛋白

C: 维生素 B12

D: 重组人促红素

答案：D

24.与 HIV 一 1 的逆转录酶直接结合并通过破坏该酶的催化位点来阻断 RNA 依赖和 DNA 依赖的 DNA 聚合酶的活性的是

A: 非核苷类反转录酶抑制药

B: 整合酶抑制剂

C: 蛋白酶抑制药

D: 核苷类反转录酶抑制药

答案：A

25.甲亢术前准备的正确给药方法是()

A: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物

B: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类

C: 只给碘化物

D: 只给硫脲类

答案：A

26.作用机制是抗代谢的是

A: 紫杉醇

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 巯嘌呤

D: 吉非替尼

答案：C

27.患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。

A: 给予糖皮质激素

B: 吸氧，给予普萘洛尔

C: 减少药物剂量

D: 给予肾上腺素

答案：D

28.具有留钾作用的利尿药是

A: 甘油果糖

B: 甘露醇

C: 螺内酯

D: 去氨加压素

答案：C

29.β-内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

A: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

B: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

答案：D

30.下列何药对心房颤动无治疗作用

A: 普萘洛尔

B: 胺碘酮

C: 奎尼丁

D: 利多卡因

答案：D

31.快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

A: 蛇毒血凝酶

B: 卡巴克络

C: 甲萘氢醌

D: 氨基己酸

答案：D

32.铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

A: 血钙

B: 肝功能

C: 全血计数

D: 肾功能

答案：C

33.原发性失眠首选的镇静催眠药种类为

A: 非苯二氮?类药物

B: 苯二氮?类药物

C: 地西泮

D: 氟西泮

答案：A

34.关于氨基己酸的描述，错误的是

A: 低剂量抑制纤溶酶原的活化作用

B: 口服或静脉给药起效较快

C: 对慢性渗血效果较差

D: 高剂量直接抑制纤溶酶的蛋白溶解酶活性

答案：C

35.用于降低眼内压的治疗方案是

A：一般采用50%葡萄糖注射液20～40ml，快速静脉注射

B：一般可给予10%～25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C：应用高渗透压的25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与20%甘露醇注射液联合应用

D：可予10%～25%葡萄糖注射液滴注，每日100g葡萄糖即可控制病情

答案：A

36.为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A：三苯双脒

B：甲硝唑

C：吡喹酮

D：乙胺嘧啶

答案：B

37.妊娠糖尿病患者，为控制血糖，主张使用

A：格列苯脲

B：二甲双胍

C：瑞格列奈

D：胰岛素

答案：D

38.属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A：氟他胺

B：己烯雌酚

C：托瑞米芬

D：他莫昔芬

答案：A

39.金刚烷胺与阿托品合用

A：增加肾毒性

B：增加锥体外系不良反应的风险

C：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D：可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：D

40.下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

A：氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性

B：夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染

C：多黏菌素B对铜绿假单胞菌引起的感染有效

D：妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效

答案：B

41.外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A：卤米松>氟轻松>地塞米松

B：地塞米松>氟轻松>卤米松

C：地塞米松>卤米松>氯轻松

D：卤米松>地塞米松>氟轻松

答案：A

42.（2020年真题）餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A：米索前列醇

B：铝碳酸镁

C：兰索拉唑

D：枸橼酸铋钾

答案：B

43.关于帕罗西汀的描述，错误的是

A：停药时应缓慢减量至停药

B：用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等

C：停药时直接停服

D：本品为选择性5-HT再摄取抑制剂

答案：C

44.甲状腺功能亢进症的内科治疗选用

A：丙硫氧嘧啶

B：大剂量碘剂

C：放射性碘

D：格列齐特

答案：A

45.早产系指妊娠在多少周之间结束者

A：25~37周

B：28~38周

C：18~37周

D：28~37周

答案：D

46.患者，男，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟呼吸急促、面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A：地塞米松+多巴胺

B: 地塞米松+肾上腺素

C: 曲安西龙+异丙肾上腺素

D: 地塞米松+去甲肾上腺素

答案：B

47.抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

A: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>ARB>利尿药>β 受体阻断药

B: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB>β 受体阻断药

C: 钙通道阻滞药(CCB)>ACEI>利尿药>β 受体阻断药>ARB

D: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>β 受体阻断药>利尿药>ARB

答案：B

48.属于 α

A: 特拉唑嗪

B: 普适泰

C: 度他雄胺

D: 酚妥拉明

答案：A

49.可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A: 氯喹

B: 乙胺嘧啶

C: 伯氨喹

D: 甲氟喹

答案：B

50.小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 塞来昔布

C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

答案：D

51.长期大量服用维生素K

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：B

52.（2018年真题）属于贝丁酸类的调节血脂药是（）

A: 辛伐他汀

B: 烟酸

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：C

53.可引起眼睛疼痛不适的是

A: 沙丁胺醇

B: 喷托维林

C: 噻托溴铵

D: 氨溴索

答案：C

54.克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A：血浆蛋白

B：p一糖蛋白

C：UGT287

D：CYP3A4

答案：D

55.（2019年真题）与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是（）

A：甘草酸二铵

B：葡醛内酯

C：还原型谷胱甘肽

D：多烯磷脂酸胆碱

答案：C

56.静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

A：干扰素

B：阿昔洛韦

C：阿糖腺苷

D：奥司他韦

答案：C

57.可用于肝性脑病的治疗的是

A：复方氨基酸注射液（18AA）

B：复方氨基酸注射液（3AA）

C：精氨酸

D: 赖氨酸

答案：C

58.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸人、氨茶碱静脉滴注治疗。

A: 腹部B超

B: 血常规

C: 胸部CT

D: 茶碱血药浓度

答案：D

59.用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第1或第2天开始治疗的药物是

A: 膦甲酸钠

B: 奥司他韦

C: 制霉菌素

D: 两性霉素B

答案：B

60.正在使用氯吡格雷的患者如需同时使用质子泵抑制剂，应选择()

A: 兰索拉唑

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 埃索美拉唑

答案：C

61.（2019年真题）伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者，不宜使用的降糖药物是（）

A: 吡格列酮

B: 阿卡波糖

C: 格列美脲

D: 二甲双胍

答案：B

62.可使青光眼患者症状加重的是()

A: 孟鲁司特

B: 沙丁胺醇

C: 噻托溴铵

D: 沙美特罗

答案：C

63.辅助治疗不孕症的维生素是

A: 烟酸

B: 维生素 E

C: 维生素 B2

D: 维生素 B6

答案：B

64.（2016 年真题）患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A: 阿莫西林

B: 青霉素 G

C: 左氧氟沙星

D: 头孢氨苄

答案：C

65.患者,女,55岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

A：特比萘芬

B：氟康唑

C：卡泊芬净

D：氟胞嘧啶

答案：A

66.下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

A：氟轻松是强效外用糖皮质激素

B：糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

C：醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素

D：丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

答案：B

67.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A：恶性淋巴瘤

B：纤维瘤

C：慢性淋巴细胞白血病

D：脑瘤

答案：D

68.属于浓度依赖性抗菌药物的是

A：头孢西丁

B：氨曲南

C：庆大霉素

D：拉氧头孢

答案：C

69.易使牙齿变黑的是

A：琥珀酸亚铁胶囊

B：硫酸亚铁片

C：硫酸亚铁糖浆

D：硫酸亚铁缓释片

答案：C

70.阻断白三烯受体,起效缓慢,作用较弱,仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

A：孟鲁司特

B：氟替卡松

C：沙美特罗

D：茶碱

答案：A

71.利巴韦林最主要的不良反应是

A：溶血性贫血

B：头痛

C：味觉异常

D：听力异常

答案：A

72.散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A：复方托吡卡胺滴眼液

B：碘苷滴眼液

C：左氧氟沙星滴眼液

D：毛果芸香碱滴眼液

答案：A

73.容易发生双硫仑样反应的药物包括()

A: 链霉素

B: 青霉素

C: 头孢唑林

D: 阿莫西林

答案：C

74.少数病人首次用药出现首剂效应的是

A: 卡托普利

B: 地高辛

C: 氨氯地平

D: 哌唑嗪

答案：D

75.用于白色念珠菌、隐球菌和球孢子菌等引起的感染的药物是

A: 制霉菌素

B: 益康唑

C: 咪康唑

D: 两性霉素B

答案：A

76.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 对化疗所致的呕吐有效

B: 无心脏不良反应

C: 对泌乳素的分泌无影响

D: 可作为术后预防呕吐的常规用药

答案：C

77.下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

A: 精神病患者

B: 中、老年人

C: 妊娠期妇女

D: 月经期妇女

答案：C

78.患者，男，67岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是（）

A: 亚胺培南西司他丁

B: 卡泊芬净

C: 头孢曲松

D: 米诺环素

答案：C

79.主要经胆汁排泄的抗生素是

A: 青霉素

B: 头孢哌酮

C: 美洛西林

D: 头孢甲肟

答案：B

80.袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

A：托拉塞米
B：呋塞米
C：布美他尼
D：依他尼酸
答案：D

81.应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()
A：表皮生长因子受体
B：B淋巴细胞表面的CD20抗原
C：人表皮生长因子受体-2
D：血管内皮生长因子
答案：C

82.左炔诺孕酮为
A：短效口服避孕药
B：促性腺激素
C：雌激素类
D：促性腺激素释放激素类似物
答案：A

83.抗菌活性强，并对β-内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。
A：头孢吡肟
B：亚胺培南
C：头孢美唑
D：氨曲南
答案：B

84.（2016年真题）鱼精蛋白可用于救治

A: 异烟肼中毒导致的神经毒性

B: 吗啡过量导致的呼吸抵制

C: 华法林过量导致的出血

D: 肝素过量导致的出血

答案：D

85.下列不属于硝基呋喃类抗菌药物的不良反应是()

A: 发热

B: 头痛

C: 腹泻

D: 呕吐、食欲减退

答案：A

86.可与阿司匹林发生相互作用的是

A: 丙酸睾酮

B: 呋塞米

C: 坎利酮

D: 伐地那非

答案：C

87.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 用于局部晚期或转移性乳腺癌

B：干扰微管蛋白功能，使细胞生长停滞于分裂中期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/498104135042007022