

title

女性常见疾病知晓与预防超星尔雅学习通答案100分最新版

content

1.1

1

女性易发生的内分泌失调性疾病有

- A、异常子宫出血
- B、痛经
- C、多囊卵巢综合征
- D、绝经综合征

我的答案：ABCD

2

女性易发生的肿瘤有

- A、子宫肌瘤
- B、卵巢肿瘤
- C、乳腺癌
- D、宫颈癌

我的答案：ABCD

3

女性易发生的生殖系统炎症有

- A、阴道炎
- B、宫颈炎
- C、盆腔炎
- D、盆腔结核

我的答案：ABC

2.1

1

经期延长是指（ ）

- A、月经周期基本正常,行经时间超过7日以上,甚或淋漓半月才净者。
- B、月经周期基本正常,行经时间超过10日以上,甚或淋漓1月才净者。
- C、月经周期退后,行经时间超过7日以上,甚或淋漓半月才净者。
- D、月经或提前或错后,连续2个月经周期以上,经量或多或少。

我的答案：A

2

崩漏是指（ ）

A、月经周期基本正常,行经时间超过7日以上,甚或淋漓半月才净者。

B、非经期,子宫大量出血或淋漓不断的出血。

C、月经周期、经期正常,经量增多或减少。

D、月经推迟7日以上,甚至40~50日一潮。

我的答案 : B

3

月经后期是指 ()

A、

月经推迟7日以上,甚至40~50日一潮。

B、

月经周期基本正常,行经时间超过7日以上,甚或淋漓半月才净者。

C、

月经或提前或错后,连续2个月经周期以上,经量或多或少。

D、

月经周期、经期正常,经量增多或减少。

我的答案 : A

4

月经不调是指与月经有关的多种疾病,凡是月经的()出现异常的现象,或伴随月经周期前后出现的难以忍受的症状。

A、

周期

B、

经期

C、

经量

D、

经色、经质

我的答案 : ABCD

5

月经不调可分为()

A、

月经先期(经早)

B、

月经后期(经迟)

C、

月经先后

D、

月经无定期(经乱)

我的答案：ABCD

2.2

1

经前症状明显患者的治疗原则是（ ）

A、

月经前水肿、发热、头痛、失眠、乳房胀痛或周期性精神病,经前腹痛或行经第1天腹痛的妇女,应该在经前5~7天服药,以调整月经周期,促使月经来潮,控制经前或行经之初症状的出现。

B、

在行经第28天后开始服药,逐渐调整月经周期。

C、

应该在月经来潮时立即服药。

D、

以全周期服药较好。

我的答案：A

2

经后症状明显患者的治疗原则是（ ）

A、

月经前水肿、发热、头痛、失眠、乳房胀痛或周期性精神病,经前腹痛或行经第1天腹痛的妇女,应该在经前5~7天服药,以调整月经周期,促使月经来潮,控制经前或行经之初症状的出现。

B、

如在行经期间经血量少、腹痛或全身疼痛不适,经后头晕、目眩、失眠,应该在月经来潮时立即服药。

C、

应该在月经来潮时立即服药。

D、

以全周期服药较好。

我的答案：B

3

月经日期不准患者的治疗原则是（ ）

A、

应该在月经来潮时立即服药。

B、

以全周期服药较好。

C、

月经周期短,经血量过多的妇女,月经来潮之前先服药;月经周期长,甚至延后数天难以掌握规律的妇女,在行经第28天后开始服药,逐渐调整月经周期。

D、

经前5~7天服药。

我的答案：C

4

噪声会导致女性内分泌功能紊乱,对月经和生育能力均有不良影响。

采取对策是()

A、

尽量选择清静的地方聚会,减少对噪声的接触。

B、

应该在月经来潮时立即服药。

C、

以全周期服药较好。

我的答案：A

5

滥用药物:滥用或经常大量使用抗生素,对女性而言可致月经失调、不排卵、闭经,这可能是药物抑制和伤害了人自身的抵抗力,导致了机体功能障碍。

采取对策)

A、

良好的自身免疫力可抵抗轻微的小病。

B、

不要随便给抗生素“升级”。

C、

尽量选择清静的地方聚会,减少对噪声的接触。

D、

应该在月经来潮时立即服药。

我的答案：AB

2.3

1

下列哪些药物会引起女性月经失调()

A、

肾上腺皮质激素类药物。

B、

性激素类药物。

C、

中枢神经抑制类药物。

D、

抗精神病类药物。

我的答案：AB

2

下列哪些药物会引起女性月经失调()

A、
解热镇痛类药物。

B、
抗过敏类药物。

C、
胃动力类药物。

D、
作用于心血管系统的药物。

我的答案：BD

3

下列哪些药物会引起女性月经失调()

A、
抗真菌类药物。

B、
抗肿瘤药物。

C、
组胺H2受体拮抗剂。

D、
利尿药。

我的答案：ACD

4

下列哪些药物会引起女性月经失调()

A、
解热镇痛类药物。

B、
抗肿瘤药物。

C、
组胺H2受体拮抗剂。

D、
利尿药。

我的答案：CD

5

下列哪些药物会引起女性月经失调()

A、
作用于心血管系统的药物。

B、
抗肿瘤药物。

C、
组胺H2受体拮抗剂。

D、
利尿药。

我的答案：ACD

2.4

1
原发性痛经的发生与行经时子宫内膜释放_____有关。 ()

A、
胰岛素

B、
缩宫素

C、
雌激素

D、
前列腺素

我的答案：D

2
痛经分为_____、_____两大类。 ()

A、
原发性痛经

B、
继发性痛经

C、
子宫内膜异位症

D、
盆腔炎

我的答案：AB

3
下列哪些原因可以引起痛经。 ()

A、
情志刺激

B、
颈管狭窄

C、
子宫平滑肌过度收缩

D、
子宫位置不正

我的答案：ABCD

4

下列哪些做法是不正确的。（）

A、

经期尽量保持心情舒畅

B、

经期进食冰棒、冷饮

C、

痛经自服止痛药即可，不去医院检查

D、

整个经期都卧床休息。

我的答案：BCD

5

下列哪些说法是正确的。（）

A、

过度劳累对健康不利

B、

通过适度的劳动,以帮助气血运行,增强机体的抗御能力。

C、

对于痛经的女性,应首先到医院进行检查,明确痛经的原因。

D、

痛经是有明确病因的,与病人情绪无关。

我的答案：

3.1

1

正常阴道内以产生过氧化氢的 占优势？

A、

大肠杆菌

B、

幽门螺旋杆菌

C、

乳酸杆菌

D、

葡萄球菌

我的答案：C

2

假丝酵母菌阴道病常见的诱因是 ？

A、

甲状腺功能亢进症

B、

糖尿病

C、

高尿酸血症

D、

高泌乳素血症

我的答案：B

3

滴虫性阴道炎典型阴道分泌物特点是 ?

A、

稀薄，淡黄色或脓血性

B、

白色，均质，腥臭味

C、

白色，豆腐渣样

D、

稀薄，脓性，呈泡沫状

我的答案：D

4

萎缩性阴道炎的最根本病因是 ?

A、

病原体入侵

B、

卵巢功能衰退

C、

阴道内PH值增高

D、

局部抵抗力下降

我的答案：B

5

细菌性阴道病典型阴道分泌物特点是 ?

A、

稀薄，淡黄色或脓血性

B、

白色，均质，腥臭味

C、

白色，豆腐渣样

D、

稀薄，脓性，呈泡沫状

我的答案：B

3.2

1

阴道炎治疗原则不包括

A、

以外用药为主

B、

夫妻同治

C、

注意继发霉菌感染

D、

静脉输液为主

我的答案：D

2

细菌性阴道病可首选 为治疗药物？

A、

青霉素胶囊

B、

头孢西丁胶囊

C、

甲硝唑片

D、

罗红霉素片

我的答案：C

3

滴虫性阴道炎治疗可选用

A、

甲硝唑阴道泡腾片

B、

罗红霉素软膏

C、

莫匹罗星软膏

D、

维生素C泡腾片

我的答案：A

4

萎缩性阴道炎治疗原则不包括

A、

补充雌激素

B、

增强阴道免疫力

C、

抑制细菌生长

D、

控制血糖

我的答案：D

5

治疗阴道炎服用甲硝唑时服药期间及停药后 小时内禁止饮酒。

A、

24

B、

36

C、

48

D、

72

我的答案：A

3.3

1

慢性宫颈炎主要表现有

A、

带下增多

B、

下腹或腰骶部疼痛

C、

尿路刺激征

D、

月经不调、痛经

我的答案：ABCD

2

急性宫颈炎的症状包括

A、

阴道分泌物增多

B、

下腹部包块

C、

外阴瘙痒

D、

性交痛、下腹坠痛

我的答案：ACD

3

慢性宫颈炎宫颈检查可见

A、

宫颈糜烂

B、

宫颈肥大

C、

宫颈息肉

D、

宫颈外翻

我的答案：ABCD

4

引起宫颈炎的原因有

A、

人工流产后感染

B、

房事过度

C、

不注意经期卫生

D、

疲劳

我的答案：ABC

5

宫颈炎的护理内容包括 。

A、

宫颈损伤时预防感染

B、

避免不洁性生活

C、

避免过早、过多、过频的生育和流产

D、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498140046041006050>