

2024 年安徽省泾县《执业药师之西药学专业二》考试题库大全含答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

- A: 表皮生长因子受体
- B: 人表皮生长因子受体-2
- C: B 淋巴细胞表面的 CD20
- D: 血管内皮生长因子

答案：B

2. 下述不属于水溶性维生素的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B6
- D: 维生素

答案：D

3. 鱼精蛋白可用于救治（）。

- A: 异烟肼中毒导致的神经毒性
- B: 华法林过量导致的出血
- C: 吗啡过量导致的呼吸抵制
- D: 肝素过量导致的出血

答案：D

4. (2018 年真题) 可与 PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是 ()

- A: 美罗培南
- B: 大观霉素
- C: 克拉霉素
- D: 替考拉宁

答案: C

5. (2021 年真题) 适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是 ()。

- A: 度他雄胺
- B: 托特罗定
- C: 托拉塞米
- D: 坦洛新

答案: B

6. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

- A: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- B: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- C: 通过激活 CFTR (囊性纤维化跨膜传导调节因子)，细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- D: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案: A

7. 布美他尼的利尿作用部位在 ()

- A: 肾小球
- B: 集合管
- C: 远曲小管初段
- D: 髓袢升支粗段

答案：D

8. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

- A: 骨化三醇
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 利拉鲁肽
- D: 瑞格列奈

答案：A

9. 以下关于比索洛尔说法错误的是

- A: 可阻断部分 β_1 受体
- B: 首关效应高、半衰期短
- C: 为水脂双溶性 β 受体阻断剂
- D: 口服吸收率高，中度透过血-脑屏障

答案：B

10. 扩张脑血管作用较强，能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是 ()

- A: 拉西地平
- B: 尼莫地平
- C: 非洛地平
- D: 氟氯地平

答案：B

11. 用于过敏性休克的是()

- A: 阿托品
- B: 肾上腺素
- C: 甲氧氯普胺
- D: 熊去氧胆酸

答案：B

12. 可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

- A: 卡莫司汀
- B: 丝裂霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 博来霉素

答案：D

13. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 免疫抑制
- C: 抗炎
- D: 抗病毒

答案：D

14. 使用铁制品煎煮酸性食物

- A: 过敏反应
- B: 锥体外系反应
- C: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：C

15. 应用强心苷或停用后 7 日内禁用

- A: 氯化钠
- B: 氯化钾
- C: 氯化钙
- D: 枸橼酸钾

答案：C

16. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染
- B: 可在身体同一部位给药
- C: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日
- D: 两类药不能混入同一容器内

答案：B

17. 可作为全营养支持或部分营养补充的是

- A: 视黄酸
- B: TP
- C: 视黄醇
- D: TPF-D

答案：B

18. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案: B

19. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

A: 米力农

B: 地高辛

C: 多巴酚丁胺

D: 洋地黄毒苷

答案: D

20. 多黏菌素主要作用于

A: 革兰阴性杆菌

B: 支原体

C: 革兰阳性菌

D: 厌氧菌

答案: A

21. 硫脲类抗甲状腺药的主要药理作用是()

A: 干扰甲状腺素的作用

B: 影响碘的摄取

C: 促进甲状腺素的释放

D: 抑制甲状腺素的合成

答案: D

22. 哮喘急性发作首选的药物是

A: 羧甲司坦口服液

B: 孟鲁司特片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案: C

23. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

A: 预防粒细胞缺乏

B: 预防癌症复发

C: 预防出血过多

D: 预防过敏反应

答案: A

24. 可乐定的降压机制是()

A: 激动外周 α

B: 扩张血管

C: 激动中枢突触后膜和外周突触前膜的 α

D: 影响 NA 释放

答案: C

25. 可引起心率加快，瞳孔散大、视物模糊及中枢镇静作用的药物是

A: 山莨菪碱

B: 后马托品

C: 东莨菪碱

D: 阿托品

答案: C

26. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

A: 维生素 C

B: 碳酸氢钠

C: 维生素 B

D: 碳酸钙

答案： B

27. 属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 诺氟沙星

B: 吡哌酸

C: 莫西沙星

D: 萘啶酸

答案： A

28. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

A: 干粉吸入方法

B: 口服制剂

C: 气雾剂

D: 雾化吸入溶液

答案： B

29. 抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 碳酸钙

B: 枸橼酸铋钾

C: 莫沙必利

D: 奥关拉唑

答案： D

30. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

A: 壬二酸

- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：A

31. (2021 年真题) 可待因是前药，需经肝药酶转化为吗啡而发挥镇痛作用，参与转化的肝药酶是 ()

- A: CYP1A2
- B: CYP2C9
- C: CYP2D6
- D: CYP3A4

答案：C

32. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- B: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

答案：B

33. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是 ()

- A: 用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常
- B: 对室性和室上性心律失常都有效
- C: 对一般室性心律失常无效
- D: 主要通过阻断 β 受体对心脏产生作用

答案：C

34. 需慎用司坦唑醇的是()

- A: 代谢性酸中毒患者
- B: 低血压患者
- C: 高血压患者
- D: 肝、肾病患者

答案: D

35. 可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

- A: 泛酸钙
- B: 维生素 B
- C: 烟酸
- D: 叶酸

答案: C

36. 使用氟尿嘧啶 4~6h 前使用哪种药物可以起到协同作用

- A: 甲氨蝶呤
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 西咪替丁

答案: A

37. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 米诺环素
- B: 利奈唑胺
- C: 阿奇霉素
- D: 万古霉素

答案: D

38. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

- A: 氨甲环酸
- B: 噻氯匹定
- C: 双嘧达莫
- D: 氯吡格雷

答案：A

39. 患者，男，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟呼吸急促、面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

- A: 地塞米松+去甲肾上腺素
- B: 曲安西龙+异丙肾上腺素
- C: 地塞米松+多巴胺
- D: 地塞米松+肾上腺素

答案：D

40. (2017年真题) 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是 ()

- A: 青蒿素
- B: 奎宁
- C: 乙胺嘧啶
- D: 伯氨喹

答案：C

41. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 他莫昔芬
- B: 红霉素
- C: 氯丙嗪
- D: 维生素C

答案：D

42. (2016 年真题) 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A: 伏立康唑
- B: 特比萘芬
- C: 两性霉素 B
- D: 氟胞嘧啶

答案: B

43. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是 ()

- A: 肾上腺素
- B: 去甲肾上腺素
- C: 多巴胺
- D: 地塞米松

答案: A

44. 下述药物中不属于助消化药的是

- A: 胰酶
- B: 兰索拉唑
- C: 乳酶生
- D: 乳酸菌素

答案: B

45. 地高辛的 $t_{1/2}=33$ 小时，按每日给予治疗量，血药浓度何时可达到稳态

- A: 6 天

B: 9 天

C: 3 天

D: 12 天

答案：A

46. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A: 卡莫氟

B: 羟喜树碱

C: 甲氨蝶呤

D: 来曲唑

答案：A

47. 下列利尿剂中，属于碳酸酐酶抑制剂的是

A: 阿米洛利

B: 布美他尼

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案：C

48. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应()

A: 中枢神经系统毒性

B: 白细胞减少

C: 眼部水肿

D: 肝脏损害

答案：A

49. (2016 年真题) 属于贝丁酸类调节血脂药的是

A: 依折麦布

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 阿昔莫司
- C: 非诺贝特
- D: 阿托伐他汀

答案：C

50. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

- A: 异甘草酸镁
- B: 门冬氨酸钾镁
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 双环醇

答案：B

51. 抗菌活性强, 并对 β -内酰胺酶高度稳定, 属于碳青霉烯类的抗菌药物是 ()。

- A: 氨曲南
- B: 头孢美唑
- C: 头孢吡肟
- D: 亚胺培南

答案：D

52. 组胺 H

- A: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- B: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁
- C: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- D: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

答案：A

53. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钙
- C: 枸橼酸钾
- D: 氯化钾

答案：B

54. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

- A: 血氨
- B: 血氯
- C: 血钠
- D: 血钾

答案：A

55. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日一次，晨起使用
- B: 一日一次，固定时间使用
- C: 一日二次，早、晚使用
- D: 一日一次，睡前使用

答案：D

56. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

- A: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生
- B: 有明显的肾毒性和耳毒性
- C: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等
- D: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等

答案：B

57. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案：A

58. 患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌II级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证()

- A: 妊娠及哺乳期妇女
- B: 骨髓功能抑制
- C: 腰椎间盘突出
- D: 严重心脏病

答案：C

59. (2017年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是()

- A: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂
- B: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- C: 可用于过敏性皮炎的治疗
- D: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案：A

60. (2015年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是()。

- A: 地塞米松
- B: 氢化可的松

C: 卤米松

D: 曲安奈德

答案：C

61. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

A: 减少麻醉药的用量

B: 减少呼吸道腺体分泌

C: 增强麻醉效果

D: 预防心动过缓

答案：B

62. 可用于防治夜盲症的维生素是()

A: 维生素 K

B: 维生素 B

C: 维生素 A

D: 叶酸

答案：C

63. 甲状腺危象选用()

A: 二甲双胍

B: 丙硫氧嘧啶

C: 格列本脲

D: 胰岛素

答案：B

64. 抑制蛋白质合成的起始阶段，使核蛋白体分解

A: 高三尖杉酯碱

B: 顺铂

C: 紫杉醇

D: 氟尿嘧啶

答案: A

65. 克拉维酸与阿莫西林配伍使用是因前者可()

A: 抑制 β -内酰胺酶

B: 扩大阿莫西林的抗菌谱

C: 减少阿莫西林的不良反应

D: 延缓阿莫西林经肾小管的分泌

答案: A

66. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 抗结核药与糖皮质激素合用

B: 抗菌药物与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素替代疗法

D: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

答案: C

67. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

A: 红霉素

B: 氯曲南

C: 阿奇霉素

D: 克拉霉素

答案: A

68. 患者，男，56岁，有高血压病史4年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 血钾

B: 血氯

C: 血钙

D: 血钠

答案: A

69. 患者，女，63岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 华法林

B: 氯吡格雷

C: 双氯芬酸

D: 奥美拉唑

答案: B

70. 治疗弥散性血管内凝血(DIC)宜选用()

A: 叶酸

B: 达比加群酯

C: 阿司匹林

D: 肝素

答案: D

71. 异烟肼联用氢氧化铝使

A: 月经不规则

B: 吸收减少

C: 肝毒性增加

D: 疗效减弱

答案: B

72. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 四环素
- B: 苯巴比妥
- C: 利福平
- D: 环孢素

答案：D

73. 治疗侵袭性曲霉菌病首选()

- A: 氟康唑
- B: 伏立康唑
- C: 氟胞嘧啶
- D: 灰黄霉素

答案：B

74. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 哌唑嗪
- B: 氨氯地平
- C: 地高辛
- D: 卡托普利

答案：A

75. (2020 年真题) 属于第一代抗精神病药物的是

- A: 奥氮平
- B: 氯丙嗪
- C: 氯氮平
- D: 利培酮

答案：B

76. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿米洛利
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：B

77. 以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

- A: 酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用
- B: 注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗
- C: 用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出
- D: 同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应

答案：C

78. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 阿托品
- B: 毛果芸香碱
- C: 拉坦前列素
- D: 噻吗洛尔

答案：B

79. 用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

- A: 依达肝素
- B: 达比加群酯
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：B

80. 可引起慢性肺间质纤维化的药物是

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 索他洛尔
- D: 普罗帕酮

答案：B

81. 呋布西林()

- A: 对 G
- B: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- C: 特别对铜绿假单胞菌有效
- D: 对 G

答案：C

82. ACEI 与()联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: 人促红素
- B: β 受体阻断剂
- C: 留钾利尿剂
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：A

83. 治疗轻、中型糖尿病的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 磺酰脲类
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

84. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 肺纤维化
- B: 出血性膀胱炎
- C: 骨髓抑制
- D: 药物性肝炎

答案：A

85. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 双嘧达莫
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 替格瑞洛

答案：B

86. 下列不属于胃肠解痉药的是

- A: 多潘立酮
- B: 阿托品
- C: 山莨菪碱
- D: 颠茄

答案：A

87. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

- A: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 病原菌未查明严重感染

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505012342123012033>