

2024 年河北省邯郸县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库有答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

- A: 地高辛
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 氨氯地平

答案：B

2. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 铁剂
- B: 维生素 D
- C: 钙剂
- D: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

答案：D

3. 青霉素治疗何种疾病时可引起吉海反应

- A: 破伤风
- B: 回归热
- C: 梅毒和钩端螺旋体病
- D: 大叶性肺炎

答案：C

4. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

A: $\mu 2$ 受体

B: δ 受体

C: $\mu 1$ 受体

D: K 受体

答案：B

5. 患者女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导，错误的是（）

A: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

B: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

C: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功

D: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响

答案：A

6. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是（）

A: 喹诺酮类

B: 四环素

C: 甲硝唑

D: 苯唑西林

答案：C

7. 患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生的与用药相关的不良反应是

A: 体位性低血压

B: 性欲减退

C: 心悸

D: 脱发

答案：B

8. 选择性舒张脑血管的药物是

- A: 地尔硫革
- B: 硝苯地平
- C: 维拉帕米
- D: 氟桂利嗪

答案：D

9. 对淋病、梅毒可作为首选的是

- A: 青霉素
- B: 土霉素
- C: 红霉素
- D: 氯霉素

答案：A

10. （2020 年真题）可用于治疗绦虫感染的药物是

- A: 哌嗪
- B: 林旦
- C: 氯硝柳胺
- D: 甲硝唑

答案：C

11. 关于 ARB 药物的叙述，错误的是

- A: 所有的 ARB 蛋白结合率大于 96%
- B: 所有的 ARB 起效时间在 2 小时左右
- C: ARB 药物多在体内代谢后排出
- D: 除厄贝沙坦和替米沙坦外，其他药的口服生物利用度都较低

答案：C

12. 多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

- A: 多柔比星
- B: 柔红霉素
- C: 表柔比星
- D: 吡柔比星

答案：C

13. 抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

- A: 钙通道阻滞药(CCB)>ACEI>利尿药> β 受体阻断药>ARB
- B: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>ARB>利尿药> β 受体阻断药
- C: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)> β 受体阻断药>利尿药>ARB
- D: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB> β 受体阻断药

答案：D

14. 关于维生素的使用，正确的是

- A: 维生素 C 以空腹服用为宜
- B: 肌肉注射维生素 B₁ 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要
- C: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验
- D: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低

答案：A

15. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

- A: 阿托品
- B: 哌替啶
- C: 利血平

D: 苯妥英钠

答案: A

16. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 5-HT

B: 奥美拉唑+口服地塞米松

C: 每日化疗前，应用 5-HT

D: 5-HT

答案: D

17. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

A: 阿莫西林

B: 埃索美拉唑

C: 克拉霉素

D: 胶体果胶铋胶囊

答案: D

18. 茶碱类主要用于

A: 气管炎

B: 支气管扩张

C: 肺不张

D: 支气管哮喘

答案: D

19. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 冠状血管

B: 肾血管

C: 皮肤黏膜血管

D: 骨骼肌血管

答案: C

20. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺过氧化物酶

B: 抑制碘泵

C: 抑制甲状腺蛋白水解酶

D: 抑制 Na

答案: A

21. 癫痫持续状态选用

A: 丙戊酸钠

B: 乙琥胺

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

答案: C

22. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺甲噁唑

B: 磺胺米隆

C: 柳氮磺吡啶

D: 磺胺嘧啶

答案: B

23. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 吲哚美辛

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案: C

24. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

A: 炔雌醇

B: 雌二醇

C: 维生素 B6

D: 去氧孕烯

答案: A

25. 喹诺酮类药物作用机制

A: 抑制细菌糖代谢

B: 干扰细菌核酸代谢

C: 抑制细菌蛋白质合成

D: 抑制细菌细胞壁合成

答案: B

26. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 12×10^9 / L，血小板 30×10^9 / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

A: 鱼精蛋白

B: 低分子肝素

C: 维生素 C

D: 维生素 K1

答案: A

27. 急性广泛性肺栓塞宜选用 ()

- A: 尿激酶
- B: 维生素 K
- C: 叶酸
- D: 肝素

答案：A

28. 伊曲康唑与肝药酶的关系是

- A: 伊曲康唑主要经 CYP2C9 酶代谢
- B: CYP3A4 酶的诱导剂
- C: CYP3A4 酶的抑制剂
- D: 伊曲康唑主要经 CYP1A2 酶代谢

答案：C

29. 氯丙嗪常见的不良反应

- A: 过敏反应
- B: 锥体外系反应
- C: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：B

30. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 头孢菌素类
- B: 喹诺酮类
- C: 氨基糖苷类
- D: 四环素

答案：C

31. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 尽量避免静脉注射和长期口服给药
- B: 肾功能下降时可造成蓄积
- C: 不可用于长期痛风的预防
- D: 可致可逆性维生素 B

答案：D

32. 催眠药应()

- A: 定时内服
- B: 空腹内服
- C: 饭前内服
- D: 睡前内服

答案：D

33. 解救由蒽醌类抗肿瘤药物导致的心肌炎，应当选用的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氟马西尼
- C: 纳洛酮
- D: 右雷佐生

答案：D

34. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 甲羟孕酮
- B: 屈螺酮
- C: 地屈孕酮

D: 环丙孕酮

答案: C

35. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 舍曲林

C: 阿米替林

D: 吗氯贝胺

答案: A

36. 关于美罗培南使用的叙述，正确的是

A: 肝功能不全患者应用需调整剂量

B: 所致肾功能损害和恶心、呕吐等胃肠道反应较亚胺培南少

C: 癫痫等中枢神经系统不良反应发生率与亚胺培南相似

D: 一天一次给药

答案: B

37. (2019 年真题) 选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是 ()

A: 四环素类

B: 氟喹诺酮类

C: 大环内酯类

D: 氨基糖苷类

答案: A

38. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是 ()

- A: 香豆素类
- B: 维生素 K
- C: 非格司亭
- D: 氨甲环酸

答案：A

39. 淋巴细胞白血病采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- C: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案：A

40. 因为能增强 β -肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 倍他司汀
- C: 尼麦角林
- D: 丁苯酞

答案：C

41. 属于长效糖皮质激素的药物是

- A: 地塞米松
- B: 曲安西龙
- C: 氢化可的松
- D: 醋酸可的松

答案：A

42. 抑制 DNA 多聚酶

- A: 阿糖胞苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 羟基脲

答案：A

43. 属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

- A: 头孢拉定
- B: 头孢克肟
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢克洛

答案：C

44. (2015 年真题) 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是()。

- A: 莫西沙星
- B: 万古霉素
- C: 夫西地酸
- D: 磷霉素

答案：B

45. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 磺胺甲唑
- B: 呋喃妥因
- C: 利奈唑胺
- D: 甲氧苄啶

答案：D

46. (2016 年真题) 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

- A: 冷水浴
- B: 接触塑料制品
- C: 饮用热饮
- D: 日光浴

答案：A

47. 糖尿病酮症酸中毒患者选用 ()

- A: 二甲双胍
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 格列本脲
- D: 胰岛素

答案：D

48. 分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

- A: 维生素 K1
- B: 氨甲环酸
- C: 酚磺乙胺
- D: 鱼精蛋白

答案：D

49. 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是
()

- A: 奥司他韦
- B: 扎那米韦

C: 金刚乙胺

D: 金刚烷胺

答案: A

50. 属于膨胀性泻药的是()

A: 乳果糖

B: 蓖麻油

C: 聚乙二醇 4000

D: 硫酸镁

答案: C

51. 对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第一代头孢菌素

B: 第二代头孢菌素

C: 第四代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案: A

52. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 托拉塞米

D: 氨苯蝶啶

答案: C

53. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

- A: 辛伐他汀
- B: 普伐他汀
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 阿托伐他汀

答案：A

54. （2017 年真题）治疗青光眼宜选用（）

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：B

55. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于（），从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

- A: G
- B: G
- C: G
- D: M 期

答案：C

56. （2021 年真题）通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物（）

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 依诺肝素
- B: 利伐沙班
- C: 华法林

D: 氯吡格雷

答案: B

57. 细胞内液的主要阳离子是

A: 钙

B: 镁

C: 钠

D: 钾

答案: D

58. 华法林抗血栓形成的最大效应时间为

A: 2min

B: 3 天

C: 6 天

D: 5~7 天

答案: C

59. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高

B: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张

C: 抑制磷酸二酯酶

D: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

答案: A

60. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

A: 曲马多

B: 吗啡

C: 秋水仙碱

D: 布洛芬

答案：A

61. 属于疾病特异型肠内营养药的是

A: TP

B: 视黄酸

C: 视黄醇

D: TPF-D

答案：D

62. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

A: 亚叶酸钙

B: 卡铂

C: 奥沙利铂

D: 顺铂

答案：D

63. (2015 年真题) 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 ()。

A: 格列美脲

B: 普萘洛尔

C: 二甲双胍

D: 瑞格列奈

答案：D

64. 下列维生素中，属于水溶性的是 ()。

A: 维生素

B: 维生素

C: 维生素 A

D: 维生素

答案：D

65. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿药是

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案：D

66. (2018 年真题) 因抑制血管内皮的前列腺素的生成, 使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是 ()

A: 阿司匹林

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 吲哚美辛

答案：B

67. 以下适应证与其他四个药物不同的是

A: 联苯苄唑

B: 制霉菌素

C: 克霉唑

D: 特比萘芬

答案：B

68. 可引起胃内压力增加和便秘的抗酸药是

- A: 奥关拉唑
- B: 碳酸钙
- C: 莫沙必利
- D: 枸橼酸铋钾

答案：B

69. 属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

- A: 奥利司他
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 阿法骨化醇
- D: 鲑降钙素

答案：A

70. 噻嗪类利尿药的利尿作用机制是

- A: 抑制近曲小管碳酸酐酶，减少 H^+-Na^+ 交换
- B: 抑制远曲小管 K^+-Na^+ 交换
- C: 抑制远曲小管近端 Na^+-Cl^- 同向转运系统
- D: 增加肾小球滤过

答案：C

71. (2019 年真题) 患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿(++)，适宜该患者使用的降压药物是 ()

- A: 依那普利
- B: 普萘洛尔
- C: 甲基多巴
- D: 硝苯地平

答案：A

72. 肥胖糖尿病患者选用()

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：C

73. (2016 年真题) 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 毛果芸香碱
- C: 乙酰唑胺
- D: 甘露醇

答案：A

74. 长期大量使用可导致肝功能异常

- A: 更昔洛韦
- B: 氯霉素
- C: 利巴韦林
- D: 四环素可的松

答案：C

75. 同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

答案：B

76. 肥胖型 2 型糖尿病患者首选的降血糖药()

A: 胰岛素皮下注射

B: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

C: 抑制葡萄糖苷酶

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：B

77. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

A: 呋塞米

B: 伐地那非

C: 坎利酮

D: 丙酸睾酮

答案：A

78. 治疗滴虫病宜选用

A: 甲苯咪唑

B: 氯喹

C: 甲硝唑

D: 吡喹酮

答案：C

79. 服用 5 型磷酸二酯酶抑制剂可导致

A: 高血压

B: 肾功能异常

C: 视物模糊、复视

D: 刺激性干咳

答案：C

80. (2016 年真题) 可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是

A: 紫杉醇

B: 柔红霉素

C: 长春新碱

D: 博来霉素

答案：C

81. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 依托泊苷

C: 来曲唑

D: 顺铂

答案：C

82. 关于茶碱给药途径叙述不正确的是

A: 空腹口服吸收快

B: 灌肠吸收慢

C: 肌注有刺激性

D: 进餐时或餐后服药，吸收较慢

答案：B

83. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

A: 多烯磷脂酰胆

B: 双环醇

C: 门冬氨酸钾镁

D: 异甘草酸镁

答案: C

84. 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是()

A: 乙胺丁醇

B: 对氨基水杨酸

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案: A

85. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案: B

86. 正在使用单胺氧化酶抑制剂的患者不宜选择

A: 磷霉素

B: 头孢唑林

C: 利奈唑胺

D: 夫西地酸

答案: C

87. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 ()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1%硫酸阿托品眼膏剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505200123121012033>