

2022-2023 学年山西省阳泉市统招专升本医学综合自考预测试题(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100 题)

1. 鼻泪管末端的开口部位是 ()

A.中鼻道 B.下鼻道 C.上鼻道 D.泪点 E.泪囊

2. 结肠镜检查的禁忌证是 【 】

A.急性腹膜炎 B.排便习惯改变 C.间断性血便 D.结肠肿瘤术后 E.炎症性肠病

3. 产生收缩中、晚期喀喇音可见于()

A.房间隔缺损
B.动脉导管未闭
C.轻中度单纯性肺脉瓣狭窄
D.特发性二尖瓣脱垂
E.以上都不对

4. 一旦确诊为心跳骤停, 必须争取在多长时间内在重建呼吸循环 ()。

A.4~6 分钟 B.6~8 分钟 C.8~10 分钟 D.10~12 分钟 E.12~15 分钟

5. 输卵管的位置与形态

- A.位于子宫系膜内
- B.其内端为输卵管子宫口，外端为输卵管腹腔门
- C.输卵管峡细长而弯曲
- D.输卵管壶腹的边缘有输卵管伞
- E.壶腹部在漏斗部的外侧

6. 气管起始处为

- A.A.第 4 颈椎下缘平面
- B.第 6 颈椎下缘平面
- C.第 1 胸椎下缘平面
- D.第 2 胸椎下缘平面
- E.第 4 胸椎下缘平面

7.胃的容受性舒张是通过下列哪种途径实现的()。

- A.交感神经
- B.迷走神经末梢释放乙酰胆碱
- C.迷走神经末梢释放的血管活性肠肽
- D.壁内神经释放的生长抑素
- E.肠~胃反射

8.支配眼轮匝肌的神经是 ()

- A.A. 动眼神经
- B.滑车神经
- C.展神经
- D.面神经
- E.眼神经

9.输精管 ()。

A. 起于睾丸下端 B. 全程位于精索内 C. 粗细一致的肌性管道 D. 末端膨大为输精管壶腹 E. 开口于前列腺

10. 同一骨骼肌细胞在接受其运动神经元的冲动刺激后产生的 2 次终板电位中, 第 2 个终板电位的振幅发生了变化, 幅度明显降低, 这可能是因为 ()

A. 切断了运动神经元
B. 在浸泡液中加了肾上腺素
C. 在浸泡液中加了去甲肾上腺素
D. 在浸泡液中加了箭毒
E. 在浸泡液中加了钠离子

11. 通过坐骨小孔的神经是 ()。

A. 闭孔神经 B. 臀上神经 C. 臀下神经 D. 阴部神经 E. 坐骨神经

12. 支配咀嚼肌的神经是 ()。

A. 舌下神经 B. 下颌神经 C. 面神经 D. 动眼神经 E. 滑车神经

13. 直接支配小汗腺活动的神经纤维是 ()

A. 肾上腺素能纤维 B. 胆碱能纤维 C. 肽能纤维 D. 副交感神经节后纤维
E. 交感神经节前纤维

14. 长期慢性组织缺氧时可出现()

A.匙状指 B.杵状指 C.梭状指 D.“猿手” E.“爪形手”

15. 在 40%的环境中，机体散热的方式是

A.辐射 B.传导 C.对流 D.蒸发 E.扩散

16. 心电图反映窦房结兴奋传至心室的波段是 【 】

A.P 波 B.PR 间期 C.QRS 波 D.S 段 E.T 波

17. 中性粒细胞核右移可见于()

A.巨幼红细胞性贫血 B.溶血性贫血 C.缺铁性贫血 D.失血性贫血 E.再生障碍性贫血

18. 心脏收缩力增强时，静脉回心血量增加，这是因为 ()

A.动脉血压升高 B.血流速度加快 C.心排出量增加 D.舒张期室内压低
E.静脉压增高

19. 激活胰液中胰蛋白酶原的是()。

A.脂肪酸 B.胆盐 C.蛋白水解产物 D.肠致活酶 E.糜蛋白酶

20. 下列关于胸导联电极的置放部位，不正确的是

A. V_1 ——胸骨右缘第 4 肋间

B. V_2 ——胸骨左缘第 4 肋间

C. V_3 —— V_2 与 V_4 连线中点

D. V_4 ——锁骨中线与第 5 肋间交界处

E. V_5 ——左腋前线第 5 肋间

21. 小儿佝偻病常伴有()

A.尖颅 B.巨颅 C.方颅 D.长颅 E.小颅

22. 关于直肠壶腹的正确叙述是 ()

A.直肠位于盆膈以上的部分 B.直肠盆部下段膨大的部分 C.直肠下端无腹膜覆盖的部分 D.以上都对 E.以上都错

23. 触诊腹水的病人腹腔内有无肿物, 最好用 ()

A.浅部触诊法 B.插入触诊法 C.冲击触诊法 D.双手触诊法 E.滑动触诊法

24.参与肋弓形成的是 【 】

A.第 6~10 对肋软骨 B.第 7~10 对肋软骨 C.第 8~10 对肋软骨 D.第 9~10 对肋软骨 E.第 11~12 对肋软骨

25. 维持躯体姿势的最基本的反射是

A.屈肌反射 B.对侧伸肌反射 C.腱反射 D.肌紧张反射 E.翻正反射

26.二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括 ()

A.左房增大

B.左室增大

C.室壁运动减弱

D.多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E.如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD段呈“吊床样”改变

27.复苏的主要目的是()

A.A.迅速恢复脑的血液循环 B.恢复自主呼吸 C.减轻酸中毒 D.保护肾功能 E.使心脏迅速恢复跳动

28.阑尾动脉发自()

A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动脉

29.对于危重病人，护患关系的基本模式是()。

A.主动—被动型 B.指导—合作型 C.共同参与型 D.以上都不是

30.当心脏处于全心舒张期时()

A.心室达到最大充盈

B.房室瓣关闭

C.心室容积不变

D.动脉瓣关闭

E.心室内压略高于心房内压

31.上肢的浅静脉是()

A.贵要静脉 B.尺静脉 C.桡静脉 D.大隐静脉 E.肱静脉

32.肺气肿患者肺部叩诊为 【 】

A.鼓音 B.清音 C.过清音 D.浊音 E.实音

33.支配三角肌的神经为()

A.腋神经 B.尺神经 C.肌皮神经 D.正中神经 E.桡神经

34. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是()

A.0.48 B.0.58 C.0.64 D.0.84 E.0.94

35.颅内压增高的临床表现，下列不正确的是()。

A.婴幼儿颅内压增高时，头痛都很严重，且多在早期出现

B.头痛呈阵发性加重

C.后期多出现视力障碍

D.某些病人可以始终不出现“三主征”

36.腰麻后一般采用 【 】

A.去枕平卧位 B.去枕侧卧位 C.15°~30°斜坡卧位 D.高坡卧位 E.低坡

卧位

37. 预防休克的关键是

A.消除病因 B.保暖、防暑 C.穿抗休克裤 D.注意休息 E.止痛剂早期应

用

38.下列哪一项不属于临界性肿瘤 ()

A.良性肿瘤位于两个脏器交界处 B.包膜不完整的纤维瘤 C.生物学行为介于良恶性之间 D.切除后易复发 E.唾液腺混合瘤

39. 下列便血患者中，能提示结肠癌的是

A.伴发热 B.伴消瘦 C.伴腹痛 D.伴黑便 E.伴腹部肿块

40.女性，40岁。既往有风湿性心脏病史，近一周出现咳嗽、咯痰，双下肢浮肿，不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征（ ）

A.呼吸过缓

B.深大呼吸

C.潮式呼吸

D.呼吸过速

E.叹息样呼吸

41.癌转移引起淋巴结肿大的以下特征中哪项是错误的 【 】

A.局部红肿 B.无压痛 C.质地坚硬 D.与周围组织粘连 E.不活动

42.心室肌细胞是否具有兴奋性的前提是 Na^+ 通道是否处于 【 】

A.启动状态 B.备用状态 C.激活状态 D.失活状态 E.高能状态

43. 上输尿管点位于()

A.髂前上棘连线与腹直肌外缘交点

B.髂前上棘连线的外 1/3 处

- C.脐水平线与腹直肌外缘交点
- D.脊柱外缘与第 12 肋交点
- E.腰大肌外缘与第 12 肋交点

44.CO 中毒所引起的缺氧比贫血引起的同等程度 Hb 减少所致的缺氧更为严重，这是因为 【 】

- A.动脉血 PO_2 降低
- B.血氧容量降低
- C.血氧含量升高
- D. HbO_2 的 O_2 释放减少
- E.氧离曲线右移

45.胸骨左缘第 2 肋间听到 3 级收缩期杂音伴 P2 亢时，应诊断为

()

- A.A. 动脉导管未闭 B. 房间隔缺损 C. 先天性肺动脉瓣狭窄 D. 功能性杂音 E. 见于健康青少年

46. 下列关于肠鸣音的叙述，正确的是()

- A.机械性肠梗阻时肠鸣音亢进
- B.正常人的肠鸣音 6 ~ 10/min
- C.麻痹性肠梗阻时肠鸣音活跃
- D.电解质紊乱时不影响肠鸣音

E.胃肠道大出血时肠鸣音减弱

47.寄生虫感染多有 【 】

A.嗜酸性粒细胞增多 B.淋巴细胞增多 C.中性粒细胞增多 D.嗜碱性粒细胞增多 E.红细胞增多

48. 右眼视神经损伤，光照左眼，可见两眼的瞳孔变化为（ ）

A.左眼大，右眼小 B.右眼大，左眼小 C.两眼瞳孔均散大 D.两眼瞳孔均缩小 E.左眼瞳孔缩小，右眼瞳孔无变化

49.下面哪种血尿应首先考虑上尿路结石()。

A.无痛性血尿 B.终末血尿 C.活动性血尿 D.初期血尿

50.肾的被膜由内向外依次为（ ）

A. 脂肪囊、肾筋膜、纤维囊
B. 脂肪囊、纤维囊、肾筋膜
C. 肾筋膜、纤维囊、脂肪囊
D. 纤维囊、脂肪囊、肾筋膜
E. 肾筋膜、脂肪囊、纤维囊

51. 既能屈髋又能伸膝的肌是

A.股直肌 B.股薄肌 C.缝匠肌 D.股内侧肌 E.肌中间肌

52. 肝脏扩张性搏动常见于

A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

53. 下列选项中，不属于深反射的是

A.肱二头肌反射 B.肱三头肌反射 C.桡骨骨膜反射 D.膝腱反射 E.跖反射

54.关于干性啰音，下列叙述中不正确的是()。

A.在呼气时较多而明显 B.在吸气时较多而明显 C.啰音的性质易改变
D.啰音的数量和部位也易改变 E.以上都不正确

55.患者头痛伴有下列情况，其中属于症状的是()

A.肌力4级 B.喷射样呕吐 C.视乳头水肿 D.踝阵挛 E.脑膜刺激征

56. 根据以下选项，回答下列各题：

A . 近曲小管

B . 髓袢降支细段

C . 髓袢升支粗段

D . 远曲小管

E . 集合管

肾小球滤液中的氨基酸被重吸收的部位是 ()

57.胃十二指肠穿孔的诱因是()。

A.情绪激动 B.暴食、进食刺激性食物 C.过度疲劳 D.以上都对

58. 血浆晶体渗透压主要来自

A.葡萄糖 B.球蛋白 C.Na⁺ D.K⁺ E.白蛋白

59.牵涉痛是指 () 。

A.内脏痛引起体表特定部位的疼痛或痛觉过敏

B.伤害性刺激作用于皮肤痛觉感受器

C.伤害性刺激作用于内脏痛觉感受器

D.肌肉和肌腱受牵拉时所产生的痛觉

E.内脏及腹膜受牵拉时产生的感觉

60. 代谢性酸中毒时

A.呼吸快而浅 B.呼吸慢而浅 C.尿液呈碱性 D.钾离子进入细胞内 E.呼吸深而快

61.诊断 ARDS 除呼吸困难、口唇发绀外，呼吸频率应为 ()

A.> 20 次 / min

B.> 25 次 / min

C.> 30 次 / min

D.> 35 次 / min

E.> 40 次 / min

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505203312034011104>