

2024 年广西壮族自治区平果县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整版及答案【夺冠系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）二磷酸果糖注射液禁用的人群是（ ）。

- A: 高尿酸血症者
- B: 高磷血症者
- C: 高钾血症者
- D: 高镁血症者

答案：B

2. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗癌药

- A: 青蒿素
- B: 氯喹
- C: 伯氨喹
- D: 奎宁

答案：A

3. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 肾毒性增加
- B: 抗凝作用增强
- C: 白细胞减少风险增加
- D: 半衰期缩短

答案：D

4. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗()

- A: 脑瘤
- B: 纤维瘤
- C: 恶性淋巴瘤
- D: 慢性淋巴细胞性白血病

答案：A

5. (2019 年真题) 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()
()

- A: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- B: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- C: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- D: NSAIDS 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

答案：A

6. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

- A: $20 \mu\text{g} / \text{ml}$
- B: $15 \mu\text{g} / \text{ml}$
- C: $25 \mu\text{g} / \text{ml}$
- D: $10 \mu\text{g} / \text{ml}$

答案：A

7. 下述不属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 硫糖铝
- B: 谷氨酰胺
- C: 前列腺素

D: 枸橼酸铋钾

答案: B

8. 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是()。

A: 睫状肌麻痹患者

B: 青光眼患者

C: 虹膜睫状体炎患者

D: 眼底检查者

答案: B

9. 直接氧化和卤化菌体蛋白的是

A: 桃金娘油

B: 羟甲唑啉

C: 复方薄荷油

D: 西地碘

答案: D

10. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是()

A: 可用于过敏性皮炎的治疗

B: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用

C: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂

答案: D

11. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 坎利酮

B: 丙酸睾酮

C: 去甲肾上腺素

D: 西地那非

答案: D

12. 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

A: 奥美拉唑

B: 复方碳酸钙

C: 胶体果胶铋

D: 替普瑞酮

答案: A

13. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

A: 喷托维林

B: 右美沙芬

C: 吗啡

D: 可待因

答案: B

14. 巨幼红细胞性贫血应首选

A: 亚叶酸钙

B: 维生素 B

C: 叶酸+维生素 B

D: 维生素 B

答案: C

15. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括 ()

A: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

B: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间

C: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

D: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

答案: C

16. 奥美拉唑主要用于治疗

A: 胃溃疡

B: 恶心、呕吐

C: 慢性便秘

D: 消化不良

答案: A

17. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

A: 抑制 Na^+ 内流和 K^+ 外流

B: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用

C: 可用于强心苷中毒

D: 可用于治疗心房扑动和心房颤动

答案: C

18. 通过选择性抑制 5α -还原酶而抑制前列腺增生的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 哌唑嗪

C: 依立雄胺

D: 甲睾酮

答案: C

19. 用于浸润麻醉、神经阻滞的局部麻醉药是

A: 布地奈德

B: 西地碘

C: 普鲁卡因

D: 利多卡因

答案: C

20. (2015 年真题) 属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是 ()。

A: 他莫昔芬

B: 丙酸睾酮

C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: A

21. 下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

A: 金刚烷胺

B: 阿昔洛韦

C: 奥司他韦

D: 干扰素

答案: A

22. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

A: 抑制磷的排泄

B: 抑制钙的排泄

C: 抑制钾的排泄

D: 抑制钠的排泄

答案: D

23. 偶发失眠和暂时失眠可使用

A: 苯巴比妥

B: 唑吡坦

C: 卡马西平

D: 地西泮

答案: B

24. 吗啡的镇痛作用机制主要是

A: 增强镇静作用

B: 增强止痛效果

C: 诱发精神错乱

D: 加重呼吸抑制

答案: A

25. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 喹碘方

B: 氯喹

C: 依米丁

D: 替硝唑

答案: B

26. 抗胆碱 M 受体药的药理作用不包括

A: 扩张支气管

B: 抑制腺体分泌

C: 解除毛细血管痉挛

D: 收缩胃肠平滑肌

答案: D

27. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 ()

A: 1%硫酸阿托品眼膏剂

B: 四环素可的松眼膏剂

C: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

D: 2%后马托品眼膏剂

答案：A

28. 合用伊立替康可减弱作用效果的是

A: 依托泊苷

B: 米库氯铵

C: 顺铂

D: 琥珀胆碱

答案：B

29. 格列本脲的作用特点是

A: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

B: 抑制胰高血糖素的分泌

C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

D: 增强胰岛素的作用

答案：A

30. 抑制骨髓造血功能的是

A: 四环素

B: 红霉素

C: 庆大霉素

D: 氯霉素

答案：D

31. 可与抗凝药发生相互作用的是

A: 伐地那非

B: 丙酸睾酮

C: 坎利酮

D: 呋塞米

答案: B

32. 下列关于药物与抗痛风药的相互作用，错误的是

A: 别嘌醇与双香豆素同用时，抗凝血药的效应可加强

B: 秋水仙碱可降低口服抗凝血药、抗高血压药的作用

C: 丙磺舒可促进肾小管对吡唑美辛的排出，使其血浆药物浓度降低而疗效减弱

D: 别嘌醇与呋塞米同用可降低其控制痛风和高尿酸血症的效力

答案: C

33. (2020 年真题) 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A: 伐昔洛韦

B: 喷昔洛韦

C: 泛昔洛韦

D: 昔多福韦

答案: A

34. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于治疗高血氨症的药物是

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇 4000

C: 开塞露

D: 酚酞

答案: A

35. 渗透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 异维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：B

36. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

- A: 痤疮样皮疹
- B: 心肌损伤
- C: 血压升高
- D: 骨髓抑制

答案：A

37. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 氟替卡松
- C: 泼尼松龙
- D: 可的松

答案：C

38. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 硝酸甘油
- D: 地尔硫

答案：C

39. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 过氧化氢
- B: 酚甘油
- C: 盐酸麻黄碱
- D: 硼酸

答案：C

40. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 巯嘌呤
- B: 长春瑞滨
- C: 吉西他滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

41. 利福平与口服避孕药合用()

- A: 抑制排酸作用
- B: 代谢加快而失效
- C: 子宫内膜突破性出血
- D: 代谢加速而导致意外怀孕

答案：D

42. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

- A: 高钾血症
- B: 高钠血症
- C: 低钾血症
- D: 低钠血症

答案：A

43. 作用机制为直接抑制破骨细胞的活性，从而抑制骨盐溶解，阻止钙由骨释出，而骨骼对钙的摄取仍在进行，因而可降低血钙；可抑制肾小管对钙和磷的重吸收，血钙也随之下降；对肿瘤骨转移、骨质疏松所致骨痛有明显治疗效果，该药物是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 降钙素
- C: 雷洛昔芬
- D: 骨化三醇

答案：B

44. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育
- B: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- C: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%
- D: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

答案：B

45. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

- A: 克罗米通
- B: 羟甲唑啉
- C: 过氧化氢
- D: 硼酸

答案：B

46. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 复方氨基酸(18AA)
- B: 复方氨基酸注射液(3AA)

C: 赖氨酸

D: 精氨酸

答案：D

47. (2015 年真题) 具有心脏毒性的抗肿瘤药是 ()。

A: 长春新碱

B: 博来霉素

C: 紫杉醇

D: 柔红霉素

答案：D

48. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

A: 阿米替林

B: 文拉法辛

C: 氟西汀

D: 吗氯贝胺

答案：C

49. 可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

A: 丙硫氧嘧啶

B: 鲨肝醇

C: 碘及碘化物

D: 左甲状腺素

答案：D

50. (2015 年真题) 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用 ()。

A: 复方托吡卡胺滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：A

51. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

A: 核糖体的 30S 亚基

B: 细胞内膜 PBP

C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

D: 核糖体的 50S 亚基

答案：D

52. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答。

A: 患者, 男, 47 岁, 诊断为高血压, 生活方式干预无效, 随机血压 155/95mmHg

B: 患者, 男, 47 岁, 诊断为难治性高血压, 使用依那普利、氯氯噻嗪、氢氯地平治疗仍未达标

C: 患者, 男, 47 岁, 慢性心力衰竭伴高钾血症 (血 K⁺5

D: 患者, 男, 47 岁, 慢性心力衰竭, LVEF=35%, 血压 120/65mmHg

答案：D

53. 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的是

A: 罗格列酮

B: 沙格列汀

C: 瑞格列奈

D: 格列美脲

答案：B

54. 袂利尿药发挥利尿的作用点是

- A: 磷酸二酯酶
- B: 碳酸酐酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：D

55. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

- A: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子
- B: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用
- C: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害
- D: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应

答案：B

56. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

- A: 隔日一次给药法
- B: 大剂量冲击疗法
- C: 一般剂量长期疗法
- D: 小剂量替代疗法

答案：B

57. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 氨基糖苷类
- B: 酰胺醇类(氯霉素)
- C: 四环素类
- D: 林可霉素类

答案：B

58.（2018 年真题）患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- C: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- D: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：A

59. 治疗青光眼宜选用

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：B

60.（2018 年真题）患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: ①③⑤
- B: ②④⑤
- C: ③④⑤
- D: ①②④⑤

答案：D

61. 具有肾保护作用的降压药是

- A: 缬沙坦
- B: 氢氯噻嗪
- C: 沙拉新
- D: 硝苯地平

答案：A

62. 属于促凝血因子合成的药物是()

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 卡巴克络

答案：A

63. (2020 年真题) 替罗非班的作用机制是

- A: 抑制凝血酶
- B: 拮抗维生素 K
- C: 阻断血小板糖蛋白 II b/IIIa 受体
- D: 抑制凝血因子 X

答案：C

64. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

- A: 糖皮质激素
- B: 阿托品
- C: 右旋糖酐
- D: 酚妥拉明

答案：A

65. (2021 年真题) 舌下给药吸收迅速、起效最快，作为心绞痛急性发作首选的治疗药物是 ()

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 美托洛尔
- D: 硝酸甘油

答案: D

66. 茶碱类主要用于

- A: 肺不张
- B: 支气管扩张
- C: 支气管哮喘
- D: 气管炎

答案: C

67. (2015 年真题) 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是 ()。

- A: 硝苯地平
- B: 雷尼替丁
- C: 双氯芬酸
- D: 格列齐特

答案: C

68. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年，心律失常病史 2 年，长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是 ()

- A: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在
- B: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常
- D: 可致甲状腺功能减退，较为常见，发病隐匿

答案：A

69. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 血尿酸升高
- B: 血糖升高
- C: 定向力障碍
- D: 低镁血症

答案：D

70. 属于选择性 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 昂丹司琼
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

71. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 依那普利
- B: 地尔硫?
- C: 比索洛尔
- D: 氨氯地平

答案：C

72. 碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯巴比妥
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：A

73. 属于抗雌激素类的是()

- A: 甲地孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 睾酮

答案：C

74. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物()

- A: 依诺肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 华法林
- D: 利伐沙班

答案：D

75. 唑类抗真菌药()

- A: 两性霉素
- B: 氟康唑
- C: 特比萘芬

D: 阿莫罗芬

答案：B

76. 利福平联用避孕药导致

A: 肝毒性增加

B: 疗效减弱

C: 吸收减少

D: 月经不规则

答案：B

77. 防止急性血栓的首选药物是

A: 维生素 B

B: 肝素

C: 香豆素类

D: 维生素 K

答案：B

78. 可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

A: 美西律

B: 奎尼丁

C: 氟西汀

D: 苯妥英钠

答案：D

79. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 吸入性糖皮质激素

D: 短效 β_2 受体激动剂

答案：D

80. 作用于血管内皮生长因子的单克隆抗体靶向药物是

A: 贝伐珠单抗

B: 曲妥珠单抗

C: 西妥昔单抗

D: 利妥昔单抗

答案：A

81. 组胺 H

A: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

B: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁

C: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案：B

82. 阿奇霉素()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 肾毒性较大

C: 用于非典型致病原感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

83. (2018 年真题) 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法, 正确的是 ()

A: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠

B: 孟鲁司特钠起效快, 适用于哮喘急性发作

C: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗

D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案: D

84. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

A: 高钾血症

B: 低氯碱血症

C: 低血糖

D: 血小板增多

答案: A

85. 属于 CYP3A4 底物 / 抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

A: 利福平

B: 地高辛

C: 烟酸

D: 红霉素

答案: D

86. 尼尔雌醇属于

A: 雌激素

B: 糖皮质激素

C: 雄激素

D: 孕激素

答案: A

87. 癫痫、帕金森病及精神疾病患者慎用的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 塞来昔布

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505224233122012033>