

## 安徽省泗县历年《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题完整版带答案（基础题）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，68 岁。发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠、气急。近 2 天全身散在出血点及淤斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞  $12 \times 10$

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 C
- C: 低分子量肝素
- D: 维生素 K

答案：A

2. 可产生严重的低血压、皮疹、高钾血症的肾素抑制剂是()

- A: 哌唑嗪
- B: 阿利克仑
- C: 甲基多巴
- D: 利血平

答案：B

3. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 氯喹
- B: 甲硝唑
- C: 吡嗪酮
- D: 甲苯咪唑

答案：A

4. 下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是()

- A: 与四氢叶酸合用时，可降低其毒性，提高其疗效
- B: 应当先给予氟尿嘧啶，再用四氢叶酸
- C: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药物
- D: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

**答案：B**

5. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 氯霉素
- D: 多西环素

**答案：C**

6. 可阻断虫体对多种营养和葡萄糖的摄取，导致虫体糖原耗竭，致使寄生虫无法生存和繁殖的广谱驱虫药是

- A: 哌嗪
- B: 阿苯达唑
- C: 左旋咪唑
- D: 甲苯咪唑

**答案：B**

7. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 抗病毒
- B: 免疫抑制
- C: 抗炎

D: 抗休克

**答案：A**

8. 格列本脲的降糖作用机制是

A: 静脉用胰岛素

B: 胰岛素皮下注射

C: 刺激胰岛  $\beta$  细胞释放胰岛素

D: 二甲双胍

**答案：C**

9. 利血平与布洛芬合用

A: 钠水潴留

B: 降压效应减弱

C: 口干、便秘、发热

D: 首剂量低血压反应

**答案：B**

10. 关于胶体果胶铋用药教育的说法,错误的是()

A: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

B: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味

C: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋

D: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑

**答案：A**

11. 属于促凝血因子合成药的是

A: 鱼精蛋白

B: 甲苯氢醌

C: 酚磺乙胺

D: 氨甲环酸

**答案: B**

12. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

A: 那格列奈

B: 罗格列酮

C: 阿卡波糖

D: 瑞格列奈

**答案: B**

13. 制霉菌素属于

A: 唑类

B: 抗生素类

C: 丙烯胺类

D: 吗啉类

**答案: B**

14. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A: 治疗剂量下不会引起血小板减少

B: 选择性高

C: 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)

D: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

**答案: D**

15. 用药时需关注肺毒性的药物是

A: 博来霉素

B: 紫杉醇

C: 长春新碱

D: 柔红霉素

**答案：A**

16. 某患者新诊断为退行性膝关节炎,既往有磺胺过敏史,不宜选用的非甾体抗炎药是 ( )

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 布洛芬

D: 双氯芬酸

**答案：B**

17. 有关阿莫西林特点的说法正确的是 ( )

A: 广谱青霉素,对革兰阴性菌也有效

B: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

C: 口服吸收差,生物利用度小

D: 耐酸、耐酶

**答案：A**

18. 属于抗雌激素类的是 ( )

A: 睾酮

B: 己烯雌酚

C: 他莫昔芬

D: 甲羟孕酮

**答案：C**

19. 中和胃酸的药物是 ( )

A: 氢氧化铝

B: 雷尼替丁

C: 哌仑西平

D: 奥美拉唑

**答案: A**

20. 可能导致牙龈出血的药物是

A: 普伐他汀

B: 普萘洛尔

C: 拉西地平

D: 依诺肝素

**答案: D**

21. (2018 年真题) 关于氨基糖苷类药物作用特点的说法, 错误的是 ( )

A: 氨基糖苷类药物对多数需氧的革兰阴性杆菌具有很强的杀菌作用

B: 氨基糖苷类药物主要抑制细菌蛋白质合成, 影响细菌细胞壁黏肽的合成

C: 氨基糖苷类药物常见的不良反应为耳毒性和肾毒性

D: 氨基糖苷类药物是浓度依赖型速效杀菌剂

**答案: B**

22. 外耳道红肿局部治疗可选用

A: 2% 酚甘油

B: 伪麻黄碱

C: 赛洛唑啉

D: 3% 硼酸乙醇

**答案: A**

23. 急性广泛性肺栓塞宜选用 ( )

- A: 尿激酶
- B: 叶酸
- C: 维生素 K
- D: 肝素

**答案：A**

24. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

- A: 麻黄碱滴鼻液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 赛洛唑啉滴鼻液

**答案：D**

25. 属于  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 西格列汀

**答案：B**

26. 抑制胰岛素释放和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 螺内酯

**答案：A**

27. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 给予糖皮质激素
- B: 给予肾上腺素
- C: 减少药物剂量
- D: 吸氧，给予普萘洛尔

**答案：B**

28. 氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 50~100  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- B: 一次 500~1000  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- C: 一次 250~500  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- D: 一次 100~250  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次

**答案：D**

29. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数  $15.8 \times 10^9 / \text{L}$ ，体温  $39.5^\circ\text{C}$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 20mg / kg)

- A: 左乙拉西坦
- B: 乙琥胺
- C: 丙戊酸钠
- D: 地西泮

**答案：C**

30. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药

- B: 本品与芬太尼可交叉过敏
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品

**答案：D**

31. 维生素 K

- A: 促进纤溶
- B: 抑制血小板聚集
- C: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- D: 促进凝血因子合成

**答案：D**

32. 铂类化合物

- A: 丝裂霉素
- B: 喜树碱类
- C: 顺铂
- D: 环磷酰胺

**答案：C**

33. 长期大量服用维生素 B6 会出现

- A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

**答案：A**

34. 患者，男，80 岁。因慢性心功能不全、同时伴有双下肢水肿住院。能充分控制心衰患者液体潴留的药物是

- A:  $\beta$  受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: 肾素抑制剂
- D: 血管紧张素转换酶抑制剂

**答案：B**

35.  $\alpha$  肾上腺素受体分布占优势的效应器是

- A: 冠状血管
- B: 肾血管
- C: 皮肤黏膜血管
- D: 骨骼肌血管

**答案：C**

36. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

- A: K 受体
- B:  $\delta$  受体
- C:  $\mu_2$  受体
- D:  $\mu_1$  受体

**答案：B**

37. (2016 年真题) 治疗绦虫病的首选药品是

- A: 伊维菌素
- B: 吡喹酮
- C: 哌嗪
- D: 伯氨喹

**答案：B**

38. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 96 小时内
- B: 出现流感症状 72 小时内
- C: 出现流感症状 100 小时内
- D: 出现流感症状 48 小时内

**答案：D**

39. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 维生素 D
- B: 铁剂
- C: 钙剂
- D: 阿仑膦酸钠

**答案：D**

40. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

- A: 庆大霉素
- B: 加替沙星
- C: 甲砒霉素
- D: 多西环素

**答案：B**

41. 氟胞嘧啶为

- A: 抗滴虫病药
- B: 抗真菌药
- C: 抗病毒药
- D: 抗血吸虫病药

**答案：B**

42. 柳氮磺吡啶的活性形式是

- A: 美沙拉嗪
- B: 亚磺酰胺
- C: 奥沙拉嗪
- D: 巴柳氮

**答案：A**

43. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()

。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 依诺肝素

**答案：D**

44. 用于预防及治疗深静脉血栓及肺栓塞，严重出血时可静脉注射维生素 K1 的是

- A: 肝素
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B12

**答案：B**

45. 利巴韦林最主要的不良反应是

- A: 听力异常
- B: 味觉异常
- C: 头痛

D: 溶血性贫血

**答案：D**

46. 夜盲症患者应选用的维生素是

A: 维生素 A

B: 维生素 D

C: 维生素 B

D: 维生素 B

**答案：A**

47. 关于第一、二、三、四代头孢菌素类抗菌药物药理作用的叙述，错误的是

A: 第二代头孢菌素对铜绿假单胞菌无效，对多种  $\beta$ -内酰胺酶较稳定

B: 第一代头孢菌素对青霉素酶稳定，但可被革兰阴性菌产生的  $\beta$ -内酰胺酶所破坏

C: 第四代头孢菌素对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌显示广谱抗菌活性

D: 第三代头孢菌素对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，但对  $\beta$ -内酰胺酶不稳定

**答案：D**

48. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

A: 格列吡嗪

B: 甲苯磺丁脲

C: 胰岛素

D: 格列本脲

**答案：D**

49. 判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

- A: 5~7 日
- B: 8~10 日
- C: 12~15 日
- D: 2~3 日

**答案：A**

50. 氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

**答案：A**

51. 早产儿、新生儿禁用()

- A: 利福平
- B: 四环素可的松
- C: 夫西地酸
- D: 氯霉素

**答案：D**

52. 对肾功能影响较小的抗高血压药是()

- A: 肼屈嗪
- B: 卡托普利
- C: 胍乙啶
- D: 利血平

**答案：A**

53. 皮肤念珠菌病可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 维 A 酸
- C: 酮康唑
- D: 林旦霜

**答案: C**

54. 治疗重型幼年型糖尿病的是

- A: 二甲双胍
- B: A 和 B 均无效
- C: 磺酰脲类
- D: 胰岛素

**答案: D**

55. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生态制剂是()

- A: 双歧三联活菌
- B: 粪肠球菌
- C: 酪酸菌
- D: 枯草杆菌

**答案: C**

56. 癫痫、帕金森病及精神疾病患者慎用的是

- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 塞来昔布
- D: 对乙酰氨基酚

**答案: B**

57. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ( )

- A: 颅内压升高
- B: 高钙血症
- C: 高胆红素血症
- D: 血栓性静脉炎

**答案: B**

58. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 尿激酶
- B: 噻氯匹啶
- C: 肝素
- D: 华法林

**答案: B**

59. 调血脂药中，升高 HDL-ch 作用最强，且具有降低脂蛋白 a 作用的是

- A: 苯扎贝特
- B: 依折麦布
- C: 烟酸
- D: 阿昔莫司

**答案: C**

60. 属于棘白菌素类的是

- A: 特比萘芬
- B: 卡泊芬净
- C: 制霉菌素
- D: 氟胞嘧啶

**答案：B**

61. 患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

- A: 糖皮质激素
- B: 萘普生
- C: 司来吉兰
- D: 依那西普

**答案：C**

62. 对胰岛素产生耐受者选用

- A: 格列本脲
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

**答案：A**

63. （2021 年真题）通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

- A: 华法林
- B: 地高辛
- C: 丙戊酸钠
- D: 茶碱

**答案：A**

64. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是（）

- A: 苯妥英钠
- B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

**答案: B**

65. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

A: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育

B: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

C: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

D: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

**答案: D**

66. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

A: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

B: 醛固酮受体阻断剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 袢利尿剂

**答案: A**

67. 适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

A: 阿立哌唑

B: 氯氮平

C: 碳酸锂

D: 利培酮

**答案: B**

68. 属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

A: 他莫昔芬

B: 戊酸雌二醇

C: 依普黄酮

D: 地屈孕酮

**答案: B**

69. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

A: 利奈唑胺+苯丙醇胺

B: 利奈唑胺+哌替啶

C: 磷霉素氨丁三醇

D: 磷霉素钠+万古霉素

**答案: C**

70. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

A: 阿米洛利

B: 氨苯蝶啶

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

**答案: D**

71. 广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

A: 三苯双脒

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 乙胺嘧啶

**答案: A**

72. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 白细胞减少

B: 肝脏损害

C: 中枢神经系统毒性

D: 眼部水肿

**答案：C**

73. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

A: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

B: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

C: 可用于呆小病的治疗

D: 成人初始剂量 25~50  $\mu\text{g}$ ，一日 1 次

**答案：B**

74. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ( )

A: 头孢呋辛

B: 头孢唑林

C: 头孢米诺

D: 头孢他啶

**答案：C**

75. 肝素抗凝血治疗引起的自发性出血，宜用的抢救药物是

A: 氨甲苯酸

B: 维生素 K

C: 氨甲环酸

D: 鱼精蛋白

**答案：D**

76. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 度洛西汀

**答案：C**

77. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 阿达帕林
- B: 林旦霜
- C: 苯甲酸苄酯
- D: 克罗米通

**答案：B**

78. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

**答案：D**

79. (2018 年真题) 属于  $\beta_2$  受体激动剂的平喘药是 ()

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 噻托溴铵
- D: 茶碱

**答案：B**

80. (2015 年真题) 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖者首选的降糖药是 ( )。

- A: 二甲双胍
- B: 瑞格列奈
- C: 普萘洛尔
- D: 格列美脲

**答案：A**

81. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证 ( )

- A: 严重心脏病
- B: 骨髓功能抑制
- C: 腰椎间盘突出
- D: 妊娠及哺乳期妇女

**答案：C**

82. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是 ( )

- A: 伊立替康
- B: 多柔比星
- C: 长春碱类
- D: 紫杉醇

**答案：A**

83. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

- A: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- B: 抑制 RNA 多聚酶
- C: 抑制蛋白质合成
- D: 抑制分枝菌酸合成

**答案：D**

84. 抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是

- A: 红霉素
- B: 甲氧苄啶
- C: 利福平
- D: 诺氟沙星

**答案：D**

85. 与奥美拉唑、替硝唑三联治疗胃溃疡的药物是

- A: 氨曲南
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

**答案：D**

86. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是()

- A: 局部外用治疗浅表真菌感染
- B: 作用机制与两性霉素 B 相似
- C: 口服吸收很少
- D: 对念珠菌数抗菌活性较高，但易产生耐药性

**答案：D**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/505300030010012040>