专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广东省澄海区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题王牌题库（网校专用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，76岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

A：加兰他敏

B：美金刚

C：卡巴拉汀

D：多奈哌齐

答案：A

2.患者，女，48岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A：红人综合征

B：呼吸窘迫症状

C：凝血功能障碍

D：心功能抑制

答案：A

3.帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

A：不安腿综合征

B：神经精神障碍

C：体位性低血压

D：姿势反射障碍

答案：D

4.使用非甾体抗炎药治疗类风湿性关节炎时，为预防其胃肠副作用常并用

A: 维生素K

B: 碱性药

C: 钙剂

D: H

答案：D

5.处方的法律性是指

A: 处方由前记、正文与后记三部分组成

B: 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件

C: 处方是药品消耗及药品经济收入结账、患者用药报销的凭证和原始依据

D: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别担负有相应的责任

答案：D

6.经口急性汞中毒出现的典型症状是（）

A: 恶心、呕吐、口内有金属味

B: 肌肉震颤、抽搐

C: 腐蚀性口腔炎

D: 恶心、呕吐、视物模糊

答案：C

7.患者女29岁孕25+6周近日出现乏方、困倦、食欲不振、恶心等症状,化验结果为Hb71g/L,诊断为缺铁性贫血,予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是（）

A: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量

B: 快速静脉注射

C: 先少量缓慢静滴,观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量

D: 口服，每次5ml,一日3次

答案：C

8.患者，男，21岁，患有肝豆状核变性病，可选用的治疗药物是

A: 青霉胺

B: N-乙酰半胱氨酸

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案：A

9.烫伤后药物选择不宜选用

A: 破伤风

B: 京万红软膏

C: 甲紫

D: 润湿烧伤膏

答案：C

10.肾衰竭者

A: 禁止洗胃

B: 不能导泻

C: 不能催吐

D: 不能用强利尿剂

答案：D

11.患者,男，72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200μgbid吸入沙丁胺醇气雾剂100μgprn吸入,氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgprn舌下含服治疗。

A：呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

B：呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

C：摇匀呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约10s-漱口

D：漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s

答案：C

12.（2019年真题）处方中外文缩写mcg代表

A：微克

B：必要时

C：餐后

D：临睡时

答案：A

13.设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

A：三级证据

B：二级证据

C：四级证据

D：一级证据

答案：A

14.按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗，应评判为

A：轻度

B：弱轻度

C：重度

D：中度

答案：A

15.临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A：低血糖症状

B：血压升高

C：血糖不降

D：过敏反应

答案：A

16.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×109/L，中性粒细胞百分比85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A：急性肾小球肾炎

B：慢性肾盂肾炎

C：急性膀胱炎

D：急性肾盂肾炎

答案：D

17.HMG-CoA还原酶抑制剂

A：考来烯胺

B：吉非贝齐

C：辛伐他汀

D：阿昔莫司

答案：C

18.患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A：布洛芬

B：抗菌药物

C：糖皮质激素

D：阿司匹林

答案：C

19.尽可能避免使用小数，是倡导开处方环节的

A：实现个体化治疗

B：医嘱完整不漏项

C：修订医嘱及时沟通

D：医嘱清楚准确

答案：D

20.使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

A：环境舒适

B：配备必备设备

C：位置标志明确

D：适当隐秘

答案：D

21.属于癌痛治疗第二阶梯的止痛药物为

A：二氢可待因

B: 羟考酮

C: 对乙酰氨基酚

D: 哌替啶

答案：A

22.（2017年真题）痛风缓解期宜选用的治疗药物是（）

A: 苯溴马隆

B: 泼尼松

C: 秋水仙碱

D: 阿司匹林

答案：A

23.患者，男，67岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续1个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A: 布洛芬

B: 吗啡

C: 山莨菪碱

D: 加巴喷丁

答案：D

24.（2015年真题）为减少共济失调，幻觉及“宿醉现象”，老年失眠患者宜选用（）。

A: 苯巴比妥

B: 劳拉西泮

C: 水合氯醛

D: 佐匹克隆

答案：D

25.ADR与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药的ADR不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；ADR因果关系可评价为

A：待评价

B：很可能

C：可能无关

D：可能

答案：C

26.药学服务的最基本的要素是

A：与药物有关的服务

B：调配

C：用药指导

D：药学知识

答案：A

27.下列用于治疗咳嗽的药物中，属于祛痰剂的是

A：右美沙芬

B：可待因

C：羧甲司坦

D：氨溴索

答案：D

28.具有多种作用，可用于角膜软化、夜盲症的是

A：维生素C

B：维生素D

C：维生素B1

D：维生素A

答案：D

29.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 埃索美拉唑镁肠溶片

B: 克拉霉素片

C: 甲硝唑片

D: 枸橼酸铋钾胶囊

答案：B

30.（2018年真题）患儿,14岁,体重50kg,体温38.7℃,使用布洛芬退热。单次给药剂量是（）

A: 10~15mg

B: 500~1000mg

C: 300~600mg

D: 200~400mg

答案：D

31.药师与患者进行沟通时的技巧不包括

A: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度

B: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

C: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

D: 尽量使用专业性术语

答案：D

32.药物治疗结核病的原则应用两种以上抗结核药物以增强及确保疗效

A: 联合

B: 早期

C: 规律

D: 适量

答案：A

33.患者，女，85岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近Et频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

A: 胺碘酮

B: 电复律

C: 苯海拉明

D: 阿托品

答案：A

34.皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

A: 10～20min

B: 20～30min

C: 5～10min

D: 15～30min

答案：D

35.患者计划口服避孕药避孕,可能增加避孕失败风险的药物是（）

A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案：A

36.采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

A：冷性荨麻疹

B：人工荨麻疹

C：幼小荨麻疹

D：热性荨麻疹

答案：B

37.导致13万多例横纹肌溶解症患者的是

A：罗非昔布

B：阿托伐他汀

C：己烯雌酚

D：加替沙星

答案：B

38.（2016年真题）患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是（）。

A：联苯苄唑软膏

B：复方苯甲酸软膏

C：氢化可的松软膏

D：酮康唑软膏

答案：C

39.有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

A：乙酰胺

B：维生素K

C：毒扁豆碱

D: 碘解磷定

答案：A

40.患者，女，23岁，正在服用短效复方口服避孕药，但避孕失败，怀疑与服用的其他药物有关，可能造成这种结果的药物是

A: 伊曲康唑

B: 卡马西平

C: 胺碘酮

D: 克拉霉素

答案：B

41.支气管哮喘急性发作期（轻度）可选用的药物是

A: 沙美特罗

B: 地塞米松

C: 异丙托溴铵

D: 沙丁胺醇

答案：D

42.一般情况下，以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

A: 毒物经口进入体内4～6小时以内

B: 中毒后2～4小时以内

C: 中毒后4～6小时以内

D: 中毒后6～8小时以内

答案：A

43.30g/L≤Hb量<60g/L可诊断为

A: 轻度贫血

B: 中度贫血

C：基本正常

D：重度贫血

答案：D

44.患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A：复方短效口服避孕药停药后即可备孕

B：复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕

C：复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕

D：长效避孕药停药后即可备孕

答案：A

45.卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

A：拮抗钙

B：扩张血管

C：抑制血管紧张素转化酶

D：利尿降压

答案：C

46.Ⅴ级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

A：E级

B：D级

C：B级

D：C级

答案：B

47.女性，32岁，3年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×109/L，血小板120×109/L，血清铁300μg/L。

A: 钙剂可促进铁剂吸收

B: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物中摄取铁2～2.5mg

C: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

D: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

答案：C

48.孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

A: 复合维生素

B: 钙剂

C: 中草药制剂

D: 复合营养素

答案：B

49.属于高选择性 α4β2尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 可乐定

B: 尼古丁替代药物

C: 安非他酮

D: 伐尼克兰

答案：D

50.男性，72岁。高血压病3年，血压165/95mmHg，伴2型糖尿病。首选降压药物是

A: 心痛定

B：利尿剂

C：ACEI类

D：β-受体阻滞剂

答案：C

51.患者，女，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见WBC15×109／L，中性粒细胞百分比85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A：首选针对革兰阳性菌的药物

B：选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

C：如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

D：抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：A

52.（2021年真题）患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A：加巴喷丁胶囊

B：吗啡控释片

C：颠茄片

D：双氯芬酸钠缓释片

答案：D

53.医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释O

A：适量

B：是指

C：右眼

D：左眼

答案：B

54.关于尿路感染的说法，不正确的是

A：大肠埃希菌感染最为常见

B：男性发病率稍高

C：由细菌感染引起

D：多见于育龄期和绝经后女性

答案：B

55.下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后一个月内应避免献血的是

A：过氧化苯甲酰

B：异维A酸

C：红霉素

D：克林霉素

答案：B

56.由服用利尿药所引起的尿失禁属于

A：压力性尿失禁

B：急性、可逆性/暂时性尿失禁

C：真性尿失禁

D：急迫性尿失禁

答案：B

57.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充

B: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

C: 首选口服补液，必要时静脉补液

D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

答案：D

58.（2016年真题）医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A: 左眼

B: 右眼

C: 立即

D: 适量

答案：B

59.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至2～4.5h

B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

C: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，其药理效应增强

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

60.(用药与尿液检查异常)甲氨蝶呤可能引起

A: 尿胆红素

B: 尿液pH增高

C: 尿液隐血

D: 尿蛋白

答案：D

61.患者，女，24岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁12μg/L，首选的治疗方案是（）

A: 口服铁剂及维生素C

B: 雄性激素治疗

C: 静脉滴注铁剂

D: 注射维生素B12

答案：C

62.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，HR108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 窦性心动过缓?

B: 室性期前收缩?

C: 阵发性室上性心动过速?

D: 心房颤动?

答案：D

63.与联用药物竞争结合血浆蛋白的是

A: 丙磺舒

B: 西沙必利

C: 丙胺太林

D: 阿司匹林

答案：D

64.服用地西泮等苯二氮

A: 烟

B: 浓茶

C: 酒

D: 咖啡

答案：A

65.以下毒物一旦误服中毒，须用硫酸铜洗胃、导泻的是

A: 杀鼠药磷化锌

B: 香豆素类杀鼠药

C: 可待因中毒

D: 地西泮中毒

答案：A

66.（2018年真题）患者,男,65岁,因腹胀,呕吐就诊,医生处方,甲氧氯普胺片20mgtidpo该处方属于（）

A: 用法、用量不适宜

B: 有禁忌证用药

C: 有配伍禁忌

D: 无适应证用药

答案：A

67.按照药品不良反应程度分级标准评判,症状明显，重要器官或系统功能有中度损害，应评判为

A: 重度

B: 轻度

C: 弱轻度

D: 中度

答案：D

68.（2019年真题）患儿，男，1岁4个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿服用维生素D5000IU，3个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状，化验结果：血钙18mg/dl，25-OH-D3水平632ng/ml。诊断为维生素D中毒，下列处理措施错误的是

A: 停饮牛奶

B: 停用维生素D及强化食品

C: 停用钙剂

D: 增加日晒

答案：D

69.治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A: 苯妥英钠

B: 阿司匹林

C: 麦角胺咖啡因

D: 谷维素

答案：C

70.属于M受体激动剂的是

A: 福莫特罗

B: 乙酰胆碱

C: 美托洛尔

D: 异丙托溴铵

答案：B

71.低致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用止吐治疗方案是

A：化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

B：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松瑞和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

C：化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

D：化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

72.肠外营养1g葡萄糖能提供的热量是

A：4kcal

B：3kcal

C：7kcal

D：9kcal

答案：A

73.钙制剂属于

A：促进骨矿化剂

B：骨吸收抑制剂

C：激素替代剂

D：骨形成刺激剂

答案：A

74.滴虫性阴道炎

A：甲硝唑

B：聚甲酚磺醛

C：咪康唑

D: 庆大霉素

答案：A

75.单个样品量足够的随机对照试验结果属于

A: 一级证据

B: 四级证据

C: 二级证据

D: 三级证据

答案：C

76.药师审核后判定为合理处方，应该

A: 调配处方并发药

B: 拒绝调配处方

C: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预

D: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告

答案：A

77.下列药物中不按兴奋剂管理的是

A: 利尿剂

B: 精神刺激剂

C: 蛋白同化激素

D: 钙通道阻滞剂

答案：D

78.根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

A: 血糖升高

B: 膀胱颈梗阻

C: 严重高血压

D: 牙龈肿胀

答案：C

79.依据CTP评分，肝功能不全B级病人用药剂量为正常患者剂量的

A: 25%维持剂量

B: 30%维持剂量

C: 40%维持剂量

D: 50%维持剂量

答案：A

80.下列药物中，不属于兴奋剂的是

A: 利尿剂

B: 精神刺激剂

C: β 受体阻断剂

D: 钙通道阻断剂

答案：D

81.患者，女，20岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

A: N-乙酰半胱氨酸

B: 纳洛酮

C: 亚甲蓝

D: 青霉胺

答案：A

82.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 比索洛尔
B: 雷米普利
C: 左旋氨氯地平
D: 氟伐他汀
答案：A

83.某患者，女性，57岁，高血压病史20年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是
A: 肾上腺素
B: 利多卡因
C: 阿托品
D: 苯妥英钠
答案：C

84.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。
A: 二甲双胍
B: 阿卡波糖
C: 胰岛素
D: 格列齐特
答案：A

85.阿卡波糖可能导致的不良反应是
A: 腹胀、肠鸣音亢进

B：肌痛、关节痛和高血压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/506205110101011030