编号：_____
姓名：_____
地区：_____
省市：_____
密封线
密封线

全国助理医师考试重点试题精编

注意事项：

1. 全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为 120 分钟。

2. 在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整，笔迹清楚。

4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

1、壶腹部癌

A. 脂肪餐后右上腹绞痛、低热、无黄疸

B. 反复右上腹痛伴寒热、黄疸、间歇性陶土便

C. 肝区胀痛伴低热、畏寒、无黄疸

D. 进行性无痛性黄疸，粪便潜血(一)

E. 无痛性黄疸，转氨酶升高，尿胆原(+++)，尿胆红素(一)

2、患者，女，25 岁。在分娩时突发呼吸困难，其后咯血而死。尸检发现肺小血管内有胎脂及角化上皮。其死因可能是

A. 血栓栓塞

B. 气体栓塞

C. 脂肪栓塞

D. 羊水栓塞

E. 瘤细胞栓塞

3、南沙参的原植物属于

A. 萝摩科

B. 葫芦科

C. 天南星科

D. 莎草科

E. 桔梗科

4、治疗甲状腺功能亢进症肝火旺盛证，应首选的方剂是（　　）。

A. 消瘰丸

B. 泻心汤

C. 六味地黄丸

D. 龙胆泻肝汤

E. 天王补心丹

5、竹茹用于胃热呕吐宜
A.胆汁炙
B.姜汁炙
C.酒炙
D.盐炙
E.醋炙

6、药材茎呈圆柱形，表面淡紫色或紫色，有纵条纹的是
A.益母草
B.淫羊藿
C.茵陈蒿
D.肉苁蓉
E.广金钱草

7、下列关于产后感染邪毒发热主症的叙述，错误的是（　　）。
A.高热寒战
B.小腹疼痛拒按
C.恶露色暗如败酱
D.口干不欲饮
E.舌红，苔黄，脉数

8、用于治疗麻风病药物是
A.利福平
B.氟康唑
C.伯氨喹
D.利巴韦林
E.环孢素 A

9、大青叶的功效的
A.清热解毒，凉血止痢
B.清热解毒，凉血消斑
C.清热解毒，凉血散肿
D.清热解毒，燥湿止带
E.清热解毒，利水消肿

10、根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》批准医疗机构因临床急需进口少量药品的是
A.国务院药品监督管理部门
B.省级药品监督管理部门
C.设区的市级药品监督管理机构
D.省级卫生行政部门
E.国家中医药管理局

11、分布于上肢内侧后缘的经脉是

A.手太阴肺经
B.手阳明大肠经
C.手厥阴心包经
D.手少阴心经
E.手太阳小肠经

12、竹叶石膏汤组成中不合有的药物是
A.半夏
B.麦冬
C.人参
D.甘草
E.知母

13、医师在治疗中确认一名肝癌病人，他妥当的做法应是
A.征求家属意见，尊重病人意愿，向病人家属如实交代病情
B.将假诊断书交给病人，隐瞒病情和预后
C.同时向病人本人及家属宣布病情危重程度
D.对病人绝对保密
E.将诊断书直接交给病人本人

14、患者，女，34岁。吵架后出现头昏胀痛，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，舌红苔黄，脉弦数。针灸治疗除主穴外，应加取（　　）。
A.太阳、列缺、曲池
B.三阴交、肝俞、脾俞
C.太溪、肾俞、悬钟
D.太冲、太溪、侠溪
E.阿是穴、血海、肝俞

15、侵蚀性葡萄胎最常见的转移部位是
A.阴道
B.宫旁
C.肺
D.脑
E.肝

16、遗传性球形细胞增多症
A.细胞着色不一
B.靶形红细胞
C.缗钱状红细胞
D.球形红细胞
E.裂红细胞

17、《中华人民共和国药品管理法》规定
1、国家对药品实行品种保护制度的是

2、经国务院药品监督管理部门审核批准后，方可销售的是

3、不得在市场销售的是

4、药品生产或经营企业可以从不具有药品生产、经营资格的企业购进的是

药品生产或经营企业可以从不具有药品生产、经营资格的企业购进的是

A. 医疗机构配制的制剂

B. 中药

C. 中药饮片

D. 没有实施批准文号管理的中药材

E. 新发现和从国外引种的药材

18、下列哪项是治疗肠风出血的常用方？（　　）

A. 十灰散

B. 咳血方

C. 小蓟饮子

D. 槐花散

E. 黄土汤

19、患者，男，30 岁。便后肛门部疼痛、出血反复发作 10 年。检查：肛门外观截石位 6 点有结缔组织外痔，并有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显。应首先的治疗措施是（　　）。

A. 注射疗法

B. 扩肛疗法

C. 切除疗法

D. 纵切横缝

E. 肛裂切开

20、表情淡漠，呈无欲貌者，属于（　　）。

A. 慢性病容

B. 甲亢面容

C. 二尖瓣面容

D. 伤寒面容

E. 贫血面容

21、大便时干时稀是因

A. 脾气虚

B. 脾阳虚

C. 脾肾阳虚

D. 肝郁脾虚

E. 食滞胃肠

22、患者，男，52 岁。右上腹疼痛 2 个月，右胁胀满，胁下癥块触痛，烦躁易怒，恶心纳呆，面色萎黄不荣，舌暗有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。实验室检查：甲胎球蛋白 510 ng/ml，B 型超声波示右肝叶占位性病变，直径 5cm。其证型是

A. 热毒伤阴

B. 湿热瘀毒
C. 气滞血瘀
D. 水湿内停
E. 肝脾瘀血

23、治疗肺癌肺脾气虚症，应首选
A. 导痰汤
B. 温胆汤
C. 六君子汤
D. 七味白术散
E. 补中益气汤

24、抵抗力最强的痢疾杆菌菌群是（　　）。
A. 福氏志贺菌
B. 痢疾志贺菌
C. 宋内志贺菌
D. 舒氏志贺菌
E. 鲍氏志贺菌

25、葶苈子的功效为
A. 止咳祛痰，活血祛瘀
B. 清肺化痰，止咳平喘
C. 化痰止咳，和胃降逆
D. 泻肺平喘，利水消肿
E. 消痰止呕，降气平喘

26、患者，女，25 岁，未婚。每次行经期间，小腹冷痛拒按，得热则舒，月经量少，色黯有块，畏寒身痛，舌淡黯，苔白腻，脉沉紧。其中医治法是（　　）。
A. 理气活血，化瘀止痛
B. 理气行滞，化瘀止痛
C. 疏肝行气，缓急止痛
D. 温经祛寒，活血止痛
E. 益气补血，活血止痛

27、既能清热凉血，又能养阴生津的药物是
A. 生地黄
B. 知母
C. 天花粉
D. 牡丹皮
E. 芦根

28、属于高效消毒法的是
A. 热力消毒法
B. 季铵盐类消毒法

C.碘伏消毒法
D.通风换气
E.洗必泰消毒

29、心阳暴脱的面容（　　）。
A.面色青灰，口唇青紫
B.面色青黄
C.面色萎黄
D.面色淡白无华
E.面色黑而且暗淡

30、关于慢性支气管炎早期肺部检查的叙述，下列哪项是正确的
A.膈肌下降且变平
B.胸廓扩张，肋间隙增宽
C.无特殊异常征象
D.两肺野透亮度增加
E.两肺纹理增粗紊乱

31、《中华人民共和国药品管理法实施条例》规定，个人设置的门诊部、诊所等医疗机构不得
A.配备常用药品和急救药品以外的其他药品
B.配备常用药品和急救药品
C.配备中成药
D.配备非处方药以外的药品
E.使用中药饮片

32、肺主一身之气的运行体现在下述哪个方面（　　）
A.吸入清气
B.呼出浊气
C.生成宗气
D.调节气机
E.辅心行血

33、患者，女，62岁。冠心病史8年，平素经常活动中心慌气促。现症见动则心悸气促，胸胁满闷，胁下痞块，面色晦黯，唇青甲紫，舌质紫暗，脉细涩。治疗应首选的方剂是（　　）。
A.人参养荣汤合桃红四物汤
B.生脉散合酸枣仁汤
C.三子养亲汤合抵当丸
D.真武汤合血府逐瘀汤
E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合金匮肾气丸

34、7-羟基香豆素的1HNMR谱中H-4信号是
A.δ6.1～6.4

B. δ7.3～7.4
C. δ6.8～6.9
D. δ7.5～8.3
E. δ3.9～4.0

35、《中国药典》2000年版一部规定，大黄检查项要检查
A. 结合性蒽醌类衍生物
B. 游离蒽醌类衍生物
C. 双蒽酮苷
D. 土大黄苷
E. 鞣质

36、排钠效价最高的利尿药是
A. 氢氯噻嗪
B. 呋塞米
C. 螺内酯
D. 氨苯蝶啶
E. 氨氯吡脒

37、具有补火助阳、引火归原功效的药物是（　　）。
A. 附子
B. 干姜
C. 肉桂
D. 吴茱萸
E. 丁香

38、急性胰腺炎的淀粉酶测定哪项是正确的？（　　）
A. 血清淀粉酶起病后6～12小时开始升高
B. 血清淀粉酶起病后24～48小时达到高峰
C. 血清淀粉酶起病后一般持续5～7天后下降
D. 尿淀粉酶升高较快，下降较慢
E. 尿淀粉酶升高较快，下降较慢，持续2～4周

39、质软，呈分叶状，中医学称为"肉瘤"的良性体表肿瘤，西医学称为（）(2000)
A. 皮脂腺瘤
B. 脂肪瘤
C. 纤维瘤
D. 皮样囊肿
E. 神经纤维瘤

40、治疗三叉神经痛可选用
A. 安定
B. 苯巴比妥
C. 苯妥英钠

D. 乙琥胺
E. 丙戊酸钠

41、患者头晕目眩，耳鸣如蝉，胁部隐痛，腰膝痠软，盗汗，舌红少苔，脉细数。其证型是
A. 肝阴虚
B. 肝阳上亢
C. 肾阴虚
D. 肾精不足
E. 肝肾阴虚

42、向病人及医护人员提供用药咨询和保健咨询，指导其安全、有效、经济、合理地使用药品是
A. 执业药师的职责
B. 执业药师的权力
C. 执业药师的权利
D. 执业药师的义务
E. 执业药师的执业行为规范

43、治疗哮喘的选择性 β2 受体激动药是（　　）。
A. 肾上腺素
B. 麻黄碱
C. 氨茶碱
D. 异丙肾上腺素
E. 沙丁胺醇

44、具有清热化痰功效的药组是
A. 前胡，贝母，紫菀
B. 紫菀，瓜蒌，海蛤壳
C. 竹茹，瓜蒌，天竹黄
D. 礞石，桔梗，旋覆花
E. 白前，款冬花，马兜铃

45、关于脑血栓，下列说法不正确的是（　　）。
A. 以中老年人多见
B. 多在剧烈活动后发病
C. 大多数患者意识清楚
D. 发病前可有短暂性脑缺血发作
E. 脑脊液检查多正常

46、四妙勇安汤可用于哪型血栓闭塞性脉管炎？（　　）
A. 寒湿阻络
B. 血脉瘀阻
C. 湿热毒盛
D. 热毒壅盛

E. 气血两虚

47、下列哪项不是小儿体格生长规律( )
A. 由远及近规律
B. 由初级到高级规律
C. 头尾生长规律
D. 由简单到复杂规律
E. 由粗到细规律

48、5，6，7-三甲氧基黄酮的
A. 1H-NMR 中化学位移在 12.50 左右有吸收
B. 1H-NMR 中 H-8 比 H-6 在较低场有吸收
C. 1H-NMR 中 A 环上没有芳香质子
D. 1H-NMR 中 A 环具有一个芳香质子
E. 1H-NMR 中 A 环质子具有 ABX 偶合系统

49、患儿，男，6 岁。发热 2d，颜面、躯干见丘疹及水疱疹。现低热，恶寒，鼻塞流涕，疹色红润，疱浆清亮，疹粒稀疏，舌质红，苔薄白，脉浮数。其病证为
A. 麻疹，初热期
B. 风疹。邪郁肺卫
C. 幼儿急疹，肺卫蕴热
D. 水痘，毒热重证
E. 水痘，风热轻证

50、胸骨角连接的部位是( ) (2006)
A. 第四肋骨
B. 第五肋骨
C. 第一肋骨
D. 第二肋骨
E. 第三肋骨

二、多选题

51、对各类型癫痫都有一定疗效的药物是（　　）。
A. 苯巴比妥
B. 乙琥胺
C. 卡马西平
D. 苯妥英钠
E. 丙戊酸钠

52、急性脑血管病风痰瘀血，阻痹络脉证的治疗方剂为（　　）。
A. 天麻钩藤饮加减
B. 真方白丸子加减
C. 星蒌承气汤加减
D. 补阳还五汤加减

E. 镇肝熄风汤加减

53、患者，女，30 岁。长期发热，体检肝脾大，血常规检查示白细胞减少，骨髓培养有伤寒杆菌。下列选项中正确的是（　　）。
A. 支持临床诊断伤寒
B. 确诊伤寒
C. 伤寒带菌者
D. 骨髓炎
E. 细菌性痢疾

54、法律效力仅次于宪法的卫生法渊源是（　　）。
A. 卫生自治条例
B. 卫生法律
C. 国际卫生条约
D. 卫生部门规章
E. 卫生行政法规

55、辛夷的功效是
A. 发汗解表，和中化湿
B. 发表散寒，行气宽中
C. 祛风散寒，温肺化饮
D. 发表散寒，祛风胜湿
E. 散风寒，通鼻窍

56、下列药物中通常不用来治疗风寒感冒的是
A. 麻黄
B. 桂枝
C. 防风
D. 蔓荆子
E. 羌活

57、作子宫切除时，下列注意事项哪项是错误的
A. 推离膀胱腹膜反折时，避免损伤膀胱
B. 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠
C. 切除子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管
D. 切除阔韧带时，避免损伤膀胱
E. 切断子宫动脉时，注意勿损伤输尿管

58、患者，男，52 岁。现症见胸闷心痛，持续难解，动则加重，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌体胖大，有齿痕，舌质暗淡，苔薄白，脉细弱无力或结代。治疗宜选用（　　）。
A. 补阳还五汤
B. 血府逐瘀汤
C. 生脉散
D. 桃红四物汤

E. 真武汤

59、女，48 岁，胸痛为刺痛发作数秒，含硝酸甘油 1～2 秒钟后疼痛即消失，最可能诊断是
A. 心绞痛
B. 心脏神经症
C. 心肌梗死
D. 胸膜炎
E. 心包炎

60、特发性血小板减少性紫癜血热伤络证的治法是（　　）。
A. 清热解毒，凉血止血
B. 益气健脾，摄血养血
C. 滋阴清热，凉血宁络
D. 活血化瘀，理气止血
E. 清热解毒，凉血宁络

61、因脾阳不振，运化无权所致的水肿证，属于
A. 虚中夹实
B. 实中夹虚
C. 由虚转实
D. 由实转虚
E. 至虚有盛候

62、治疗肝硬化湿热蕴脾证的代表方剂是
A. 柴胡疏肝散合胃苓汤加减
B. 实脾饮加减
C. 中满分消丸合茵陈蒿汤加减
D. 调营饮加减
E. 附子理中丸合五苓散加减

63、小儿的病理特点不包括下列哪项？（　　）
A. 发病容易
B. 传变迅速
C. 脏气清灵
D. 易趋康复
E. 形气未充

64、壮热，大汗不止，突然体温下降，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝者证属
A. 上热下寒
B. 表寒里热
C. 热证转化为寒证
D. 真寒假热
E. 真热假寒

65、代赭石的功效是
A.平肝潜阳，收敛固涩
B.平肝潜阳，明目利尿
C.息风止痉，祛风止痒
D.平肝潜阳，凉血止血
E.息风止痉，清热解毒

66、机体内物质转化和能量转化有赖于气的何种功能
A.推动功能
B.温煦功能
C.防御功能
D.固摄功能
E.气化功能

67、戊型肝炎的主要传播途径是（　　）。
A.母婴
B.呼吸道
C.血液
D.土壤
E.粪-口

68、根据《药品流通监督管理办法》药品经营企业的药品销售凭证应当
A.保存3年或以上
B.保存5年
C.保存至超过药品有效期1年，但不少于2年
D.保存至超过药品有效期1年，但不少于3年
E.保存至超过药品有效期1年，但不少于5年

69、下列各项中，除哪项外，均是冠心病的西医分型
A.隐匿型
B.心绞痛型
C.猝死型
D.继发性心脏骤停型
E.心肌梗死型

70、HBV感染进入后期与传染减低的指标是
A.HBsAg(＋)
B.抗-HBs(＋)
C.HBeAg(＋)
D.抗-HBc(＋)
E.抗-HBe(＋)

71、患者，女，30岁，已婚。月经周期正常，但经量多（5包纸/次），色深红、质稠，心烦口渴，尿黄便结，舌红苔黄，脉滑数。妇科盆腔及B超检查无异常，基础体温呈双相。治疗应首选

A.黄体酮加保阴煎

B.黄体酮加清经散

C.丙酸睾酮加保阴煎

D.丙酸睾酮加清经散

E.丙酸睾酮加丹栀逍遥散

72、近端空肠内疝形成

A.呕吐物为食物，无胆汁

B.呕吐物为胆汁，无食物

C.呕吐物既有胆汁，又有食物

D.呕吐物呈酸臭味，有宿食

E.无呕吐

73、依据《麻醉药品、精神药品处方管理规定》，麻醉药品、精神药品处方格式组成中“前记”不同于普通处方，须载明

A.处方编号

B.患者姓名、性别、年龄

C.患者身份证明编号

D.门诊病历号

E.专科要求的项目

74、腺垂体合成和分泌的促甲状腺激素（TSH）

A.分泌释放到血液中分布至全身

B.直接分泌到甲状腺中，只在甲状腺内发现

C.沿神经轴突纤维移动到甲状腺组织中

D.经特定血管系统输送到甲状腺组织中

E.为甲状腺组织主动摄取而甲状腺内浓度较高

75、治疗银屑病风热血燥证，应首选的方剂是（　　）。

A.凉血地黄汤

B.当归饮子

C.萆薢渗湿汤

D.桃红四物汤

E.清营汤

76、患者，男，65岁。反复水肿、血尿、蛋白尿20年。BP180/110mmHg，BUN30mmol/L，COCP16mmol/L，血钾6.7mmol/L，血钙1.95mmol/L，Hb65g/L，应首先考虑的治疗措施是

A.补钙

B.静脉静注碳酸氢钠

C.血液透析

D. 葡萄糖加胰岛素静脉滴注
E. 输血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/506222202243010210