
卫生职称-康复医学治疗技术试题

专业知识

一、A1/A2 型题 （以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。）

1. 功能障碍评定的内容包括功能障碍的（ ）

- A. 性质、原因
- B. 程度、原因
- C. 原因、预后
- D. 预后、程度、原因
- E. 性质、程度、预后

2. 最确切的疼痛相关的基本因素是（ ）

- A. 躯体因素和神经因素
- B. 躯体因素和精神心理因素
- C. 有躯体因素、神经因素和精神心理因素
- D. 只有神经因素
- E. 只有精神因素

3. 腱鞘囊肿的主要治疗目的是（ ）

- A. 改善血液循环，促进囊肿吸收
- B. 软化瘢痕
- C. 维持肌腱滑动
- D. 镇痛
- E. 消炎

4. 用于运动功能评定的量表是（ ）

A. Barthel 指数

B. Katz 指数

C. SF-36 量表

D. Fugl-Meyer 评定法

E. 生活满意度评定量表

5. 平衡训练的禁忌证是 ()

A. 截瘫

B. 偏瘫

C. 脑瘫

D. 关节脱位

E. 膝关节置换术后

6. 运动再学习技术应用在脑卒中患者, 其内容不包括 ()

A. 上肢训练

B. 行走训练

C. 心理训练

D. 站起和坐下训练

E. 口面部训练

7. 关节松动术不适用于 ()

A. 腰间盘突出

B. 急性软组织损伤

C. 脊柱小关节紊乱

D. 四肢关节挛缩

E. 肌肉紧张和痉挛

8. 关于脑卒中康复治疗原则，正确的是（ ）

- A. 病情稳定后，尽早开始康复治疗
- B. 病情稳定后，尽量卧床休息
- C. 康复治疗开始时，可停用药物治疗
- D. 脑卒中可完全恢复，不需要康复治疗
- E. 药物和康复治疗需交替进行

9. 关于正常步态周期的描述中，错误的是（ ）

- A. 步态周期包括站立相和摆动相（迈步相）
- B. 步长等于跨步长
- C. 步宽指两足平行时足心之间的平行距离
- D. 单位时间内行走的步数为步频
- E. 单位时间内行走的距离称为步行速度

10. 干扰电最常用的电流频率组合是（ ）

- A. 2000Hz 与 (2000 ± 100) Hz
- B. 3000Hz 与 (3000 ± 100) Hz
- C. 4000Hz 与 (4000 ± 100) Hz
- D. 5000Hz 与 (5000 ± 100) Hz
- E. 6000Hz 与 (6000 ± 100) Hz

11. 弯腰不方便患者可使用（ ）

- A. 尼龙搭扣
- B. 穿衣棍
- C. 系扣钩
- D. 穿鞋用具

E. 帆布扶手装置

12. 关于早期脑卒中患者康复治疗的叙述，错误的是（ ）

A. 早期康复标准是神志清醒，病情不再发展

B. 抗痉挛体位可预防异常模式的发展

C. 上楼梯时健腿先上患腿后上

D. 穿上衣时先穿患侧再穿健侧

E. 上楼梯时患腿先上健腿后上

13. 患者身体感觉功能无缺陷，但却无法辨识感受到讯息，称为（ ）

A. 失认症

B. 失用症

C. 失读症

D. 失语症

E. 痴呆

14. 能导致关节被动活动范围增加的疾病是（ ）

A. 瘢痕挛缩

B. 骨折后制动

C. 膝骨关节炎

D. 周围神经麻痹

E. 关节周围软组织粘连

15. 红外线疗法的生理效应中主要为（ ）

A. 电离效应

B. 温热效应

C. 光化学效应

D. 深部穿透效应

E. 光动力效应

16. 用记事本和购物清单帮助记忆, 此方法属于 ()

A. 视觉记忆训练法

B. 提示法

C. 代偿

D. PQRS 法

E. 自身参照法

17. 作用最深的物理因子治疗为 ()

A. 水疗

B. 蜡疗

C. 热敷

D. 红外线

E. 超短波

18. 颅内血肿患者意识障碍中常有中间清醒期的类型是 ()

A. 颅内血肿

B. 脑室内血肿

C. 迟发性颅内血肿

D. 硬膜外血肿

E. 硬膜下血肿

19. 关于脑震荡的说法, 正确的是 ()

A. 昏迷一般超过 20 分钟

B. 伤后遗忘大于 1 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507002101004006035>