

## 一.单选题（共 90 题，每题 1 分）

1. 呼吸衰竭患者，行机械通气，动脉血气分析：PaO<sub>2</sub>75mmHg，PaCO<sub>2</sub>29mmHg，pH7.42，BE-

5.2mEq / L，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>18.3mEq / L，应考虑为：

- A.代谢性碱中毒
- B.呼吸性碱中毒
- C.代谢性酸中毒伴呼吸性碱中毒(代偿)
- D.代谢性酸中毒

2. 脑血栓形成最适宜的检查是：

- A.腰穿脑脊液检查
- B.脑电图检查
- C.脑血管造影
- D.MRI

3. 扩张型心肌病病人，突然发作心动过速，心电图提示为室上性心动过速，首选治疗是 A.颈动脉窦按压

- B.静脉注射去乙酰毛花苷（西地兰）
- C.静脉注射异搏定
- D.静脉注射利多卡因
- E.非同步直流电复律

4. 硝普钠的常用有效剂量为

- A.0.1~0.5μg / (kg·min)

B.  $5.0 \sim 10.0 \mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$

C.  $0.1 \sim 5.05 \mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$

D.  $10 \sim 20 \mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$

E.  $20 \sim 30 \mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$

5. 外伤性血胸简便而又可靠的诊断方法是

A. 测定全身血容量

B. 胸部叩诊和听诊

C. 胸部 X 线检查

D. 周围血血红蛋白和红细胞测定

E. 胸腔穿刺

6. 巴比妥中毒导致休克的原因是

A. 剧烈吐泻导致血容量减少

B. 毒物抑制血管舒缩中枢

C. 血浆渗出致血容量减少

D. 心肌损害

E. 代谢性酸中毒

7. 失血性休克患者经补液后血压正常，中心静脉压高，提示

A. 血容量相对过多

B. 严重酸中毒

C. 容量血管过度收缩

D. 血容量不足

E.血容量严重不足

8. 休克代偿期脉搏血压的变化是

A.血压低，脉细速，脉压显著缩小

B.血压低，脉细速，脉压轻度缩小

C.血压正常，脉细速，脉压无变化

D.血压正常或稍高，脉稍快，脉压缩小

E.血压轻度下降，脉细速，脉压无变化

9. 伴心室率过慢的房颤或Ⅲ度房室传导阻滞心衰，使用洋地黄的必备条件是

A.安置人工心脏起搏器

B.使用糖皮质激素

C.加用奎尼丁

D.使用利尿剂

E.使用阿托品

10. 胸部外伤后，胸壁软化，主要病理生理紊乱为

A.吸气时软化区鼓起，呼气时内陷

B.呼气时软化区鼓起，吸气时内陷

C.二氧化碳潴留，缺氧

D.呼吸循环衰竭

E.胸内压力增高

11. 治疗非酮症高渗性糖尿病昏迷时，降血糖治疗使用：

- A.口服降糖药物
- B.持续静脉点滴胰岛素
- C.皮下注射胰岛素
- D.间断静脉点滴胰岛素，血糖正常后即改为皮下注射

12. 一甲亢病人在手术后 6 小时出现高热、大汗淋漓、心动过速、频繁呕吐及腹泻、极度消耗、谵妄。应诊断为：

- A.甲亢危象
- B.甲状腺功能减退
- C.垂体卒中
- D.Addison 病

13. 治疗与抢救休克首要的中心环节为

- A.应用血管活性药物
- B.应用纠酸药物
- C.消除病因，补充血容量
- D.应用肾上腺皮质激素
- E.应用肝素防止 DIC

14. 急性胸外伤中绝对必须进行紧急开胸探查的手术指征是：

- A.胸内子弹留存
- B.多根多处肋骨骨折合并血气胸
- C.张力性气胸
- D.气胸闭式引流后仍持续大量漏气

15. 中度出血性休克的失血量一般为

A. >2100ml

B. 2100~1700ml

C. 1700~1200ml

D. 1200~800ml

E. <75ml

16. 在创伤急救止血时，常用的止血方法有

A. 指压止血法

B. 加压包扎法

C. 止血带止血法

D. 加垫屈肢止血法

E. 以上都是

17. 患者，男，60岁。咳嗽、气急、肺部湿性啰音，HR110次/分，RR30次/分，WBC $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞82%，胸片示左下肺炎，动脉血气为 PaCO<sub>2</sub>~67mmHg，PaO<sub>2</sub>

256mmHg，拟“ARDS”，在早期使用 PSV 模式机械通气时，常用的潮气量是

A. 10~20ml/kg

B. 3~5ml/kg

C. 6~10ml/kg

D. 4~5ml/kg E. 10~15/kg

18. 支气管哮喘与心源性哮喘的鉴别要点是：

- A.注射氨茶碱后症状好转
- B.阵发性夜间呼吸困难
- C.咳粉红色泡沫样痰
- D.肺部闻及哮鸣音

19. 休克时的重要代谢障碍为

- A.酸中毒，高血钾
- B.碱中毒，低血钾
- C.低渗性脱水，低镁血症
- D.低钙，低血糖
- E.呼吸窘迫综合征

20. 尿钠排泄分数正常为 1，若 $>1$  说明：

- A.为肾前型氮质血症
- B.肾小球肾炎
- C.急性肾小管坏死或尿路梗阻
- D.间质性肾炎

21. 急性下壁心肌梗死常可合并

- A.右室心肌梗
- B.前间壁心肌梗死
- C.高侧壁心肌梗
- D.后壁心肌梗死
- E.前壁心急梗死

22. 休克患者血压低，尿量少，首选的血管活性药为

- A.多巴酚丁胺
- B.去甲肾上腺素
- C.肾上腺素
- D.异丙肾上腺素
- E.多巴胺

23. 肝性脑病的常见诱因有：

- A.上消化道出血
- B.高蛋白饮食
- C.便秘
- D.以上都是

24. 多巴酚丁胺常用的剂量范围为

- A.1~10 $\mu\text{g}$  / (kg·min)
- B.3~15 $\mu\text{g}$  / (kg·min)
- C.5~20 $\mu\text{g}$  / (kg·min)
- D.8~30 $\mu\text{g}$  / (kg·min)
- E.10~40 $\mu\text{g}$  / (kg·min)

25. 重度一氧化碳中毒病人昏迷期间，下列哪项并发症最不常见

- A.肺水肿和肺炎
- B.心肌损害
- C.皮肤出现水泡及肌肉肿胀

D.可出现糖尿、蛋白尿

E.中毒性肝炎

26. 下列哪种肾外伤最常出现血尿

A.肾皮质断裂

B.肾挫裂伤合并输尿管断裂

C.肾皮质挫裂伤合并肾周围血肿

D.肾裂伤

E.肾盂广泛裂伤

27. 关于酒精中毒的实验室检查不正确的是

A.代谢性酸中毒

B.低血钾

C.低血镁

D.低血钙

E.高血糖

28. 不符合婴幼儿心力衰竭的诊断标准的是:

A.心率增快, 婴儿>120次/分, 幼儿>100次/分

B.呼吸困难, 青紫忽然加重, 安静时呼吸达60次/分以上

C.肝大达肋下3cm以上, 或在密切观察下短时间内较前增大

D.心音明显低钝, 或出现奔马律

29. 下列哪种情况不是使用洋地黄的禁忌证

A.低钾引起的室性心律失常



- B. I 度房室传导阻滞伴心力衰竭
- C. II 度 II 型房室传导阻滞伴心力衰竭，无心脏起搏条件
- D. 肥厚性主动脉瓣狭窄
- E. 预激综合征并房颤

30. 急性胰腺炎时，血淀粉酶升高的规律为

- A. 发病后 2h 升高，12~24h 达高峰
- B. 发病后 3~12h 升高，24~48h 达高峰
- C. 发病后 24h 升高，48h 达高峰
- D. 发病 48h 升高，72h 达高峰
- E. 以上都不对

31. 急性肾衰竭必然会出现的症状是：

- A. 血肌酐升高
- B. 低血钾
- C. 高血钠
- D. 少尿

32. 脑出血患者意识清、突发眩晕、频繁呕吐，病侧肢体共济失调，眼球震颤，语音纳吃，出血部位可能在：

- A. 桥脑
- B. 延髓
- C. 丘脑
- D. 小脑

33. 不符合休克失代偿期微循环特点的是

- A. 血管自律运动消失
- B. 毛细血管前括约肌和微动脉收缩减退
- C. 毛细血管流出道阻力增加
- D. 血管床对儿茶酚胺的反应性进行性增加
- E. 组织间液移向血管内

34. 下列哪种疾病可导致纵隔扑动:

- A. 张力性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 多根多处肋骨骨折
- D. 进行性血胸

35. 室性心动过速的临床表现特点, 下列哪项符合

- A. 心率 100 次 / min, 心律绝对规则
- B. 症状渐发渐止
- C. 诱发呕吐后发作突然终止或无变化
- D. 心尖区第一心音强弱不等
- E. 大多数无器质性心脏病

36. 导致急性左心衰竭的原因是:

- A. 左室舒张末压增高
- B. 肺静脉压升高
- C. 肺动脉压升高

D.外周动脉压升高

37. 电击后多少秒心电显示心搏停止或无电活动可视为电除颤成功

A.1 秒

B.2 秒

C.3 秒

D.4 秒

E.5 秒

38. 男，35 岁。反复晕厥、抽搐 2 天，查体：心率 38 次 / min，律齐，心尖区第一心音强弱不等，血压 110 / 70mmHg，晕厥的原因可能为

A.窦性心动过缓，窦性停搏

B.Ⅱ度Ⅱ型房室传导阻滞（3：2 下传）

C.Ⅱ度Ⅰ型房室传导阻滞

D.Ⅲ度房室传导阻滞

E.房颤

39. 急性下壁心肌梗死常可合并

A.前壁心肌梗死

B.前间壁心肌梗死

C.高侧壁心肌梗死

D.后壁心肌梗死

E.右室心肌梗死

40. 急性心肌梗死发生后溶栓治疗的最佳时机

A.2 小时

B.4 小时

C.6 小时

D.8 小时

E.12 小时

41. 抢救人咯血窒息时，最关键的措施是

A.让病人取患侧卧位

B.立即使用中枢呼吸兴奋剂

C.立即使用鼻导管吸氧

D.立即采用解除呼吸道梗阻的措施

E.立即输血或输液

42. 宫颈癌确诊的依据是：

A.宫颈刮片

B.宫颈活组织切片

C.分泌液涂片

D.阴道镜检查

43. 新生儿出生后窒息，心率为 70 次 / 分，呼吸 10 次 / 分，应立即进行下列处理 A.清理呼吸道，皮囊面罩加压通气

B.清理呼吸道，皮囊面罩加压通气，胸外心脏按压

C.清理呼吸道，皮囊面罩加压通气，胸外心脏按压及气管内注射肾上腺素

D.清理呼吸道，皮囊面罩加压通气，气管内注射肾上腺素

E.皮囊面罩加压通气，胸外心脏按压

44. 妊娠高血压的降压药首选：

A.酚妥拉明

B.卡托普利

C.硫酸镁

D.硝普钠

45. 急性阑尾炎最重要的体征是：

A.体温升高，脉搏加快

B.右下腹固定而明显压痛

C.腹部有肌紧张及反跳痛

D.结肠充气试验阳性

46. 蛛网膜下腔出血最常出现

A.交叉性瘫痪

B.截瘫

C.偏瘫

D.单瘫

E.脑膜刺激征

47. 对怀疑有结核患者进行了口对口呼吸的急救人员，检查是否感染结核应在多少周以后进行 A.4 周

B.8 周

C.12 周

D.16 周

E.20 周

48. 下列哪种室性心动过速不宜使用直流电复律治疗

A.持续性室性心动过速

B.特发性室性心动过速

C.冠心病伴发室性心动过速

D.洋地黄中毒引起的室性心动过速

E.心力衰竭伴发的室性心动过速

49. 休克的实质是

A.血压下降

B.CVP 下降

C.脉压下降

D.心排血量下降

E.组织灌注不足合并细胞缺氧

50. 抗休克首要的基本措施为

A.改善周围血管张力

B.改善心功能

C.补充血容量

D.纠正酸中毒

E.防止急性肾功能衰竭

51. 动脉血气 PaO<sub>2</sub>70mmHg, PaCO<sub>2</sub>90mmHg, 以下诊断正确的是:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507041052026006040>