

2024 福建省上杭县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库含答案（能力提升）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 干酵母片
- B: 多潘立酮片
- C: 乳酶生片
- D: 甲氧氯普胺片

答案：A

2. （2016 年真题）患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 美托洛尔缓释片
- B: 阿司匹林肠溶片
- C: 氨氯地平片
- D: 贝那普利片

答案：D

3. 血脂调节药的合理应用主要用于高胆固醇血症，尤其是黄色瘤患者的是（）

- A: 伊曲康唑
- B: 他汀类与贝特类联用
- C: 普罗布考
- D: 依折麦布

答案：C

4. 考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于

- A: IV 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：A

5. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

- A: 卡马西平
- B: 乙琥胺
- C: 加巴喷丁
- D: 扑米酮

答案：A

6. 有关噻托溴铵干粉吸入剂（吸乐装置）正确使用操作：①拉开防尘帽，打开吸嘴，从包装中取出 1 粒胶囊，将胶囊放入中央室内，合上吸嘴直至听到一声“咔嗒”声；②尽量呼气（避开吸嘴），用口唇包裹住吸嘴，保持头部垂直，缓慢深吸气，屏住呼吸，约 10 秒后慢慢呼气；③漱口，去除咽部残留药物；④手持吸入器将吸嘴朝上，将刺针按钮完全按下 1 次；⑤擦拭吸嘴，再次打开吸嘴，取出胶囊壳，关闭吸嘴和防尘帽。正确的操作步骤是

- A: ⑤④②①③
- B: ②④①⑤③
- C: ①④②⑤③
- D: ①②③④⑤

答案：C

7. 有关汞中毒的解救措施，错误的是

- A: 可以用青霉胺驱汞
- B: 可以用二巯丙醇驱汞，并应酸化尿液以促进排泄
- C: 口腔出现炎症时，可以用 2% 碳酸氢钠或氯己定含漱
- D: 可以用二巯丙磺钠驱汞

答案：B

8. 慢性功能性便秘

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 羧甲基纤维素钠
- D: 比沙可啶

答案：A

9. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

- A: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率
- B: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁
- C: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点
- D: 抑郁症的病因明确

答案：D

10. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 美国药典药物信息
- B: 马丁代尔药物大典

C: 医师案头参考

D: 药物事实与比较

答案: B

11. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质

C: 首选口服补液，必要时静脉补液

D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

答案: D

12. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是应有效控制血尿酸浓度、排酸

A: 首次发作期

B: 发作间歇期

C: 急性发作期

D: 痛风性肾病治疗期

答案: B

13. (在乳汁中排泄的药物)青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

A: 呈弱碱性

B: 脂溶性高

C: 呈弱酸性

D: 在脂肪与水中都有一定的溶解度

答案：C

14. 不仅能阻止早期炎症反应，且能稳定肥大细胞等炎症细胞，阻止组胺及其他炎症介质和细胞因子释放，阻止嗜酸性粒细胞的趋化、浸润，从而抑制或减轻晚期的炎症反应

- A: 氯雷他定片
- B: 孟鲁司特钠片
- C: 萘甲唑林滴鼻液
- D: 泼尼松片

答案：A

15. 血栓的发生率增加的指标是

- A: $INR < 1.5$
- B: $INR > 5$
- C: $INR < 3$
- D: $INR > 3$

答案：A

16. (抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

- A: 直立性低血压
- B: 免疫失调
- C: 房室传导阻滞
- D: 多毛症

答案：C

17. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

- A: 药物相互作用
- B: 药品不良反应

C: 合理用药信息

D: 禁忌证

答案: B

18. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

A: 药品的生产厂商和批号

B: 药物制剂的等效性

C: 药品经济学知识

D: 注射剂的配制和滴注速度等

答案: D

19. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中脂肪如提供的能量是()

A: 450kcal

B: 700kcal

C: 200kcal

D: 1150kcal

答案: A

20. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 肌病

B: 血液系统疾病

C: 胃肠道反应

D: 神经系统疾病

答案: D

21. 中成药麻杏止咳片具有镇咳、祛痰、平喘的功效，与其合用可增加对心脏的毒性，引起心律失常的药物是。

- A: 氯苯那敏
- B: 地高辛
- C: 甲氧氯普胺
- D: 复方利血平

答案：B

22. 某患者，男，65 岁，高血压病史 5 年，先后服用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动的情况，到医院就诊。

- A: 可降低心源性死亡的危险
- B: 有明显的肝肾毒性
- C: 建议单独用于不稳定性心绞痛
- D: 为第一代短效钙通道阻滞剂

答案：D

23. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

- A: 抗过敏药
- B: 东莨菪碱
- C: 双嘧达莫
- D: 阿米洛利

答案：B

24. 巩固期隔日用药、初治短程化疗方案是

- A: 1HS/11H2S2
- B: 2S(E)HR2/4H3R3
- C: 2S(E)HR2/4HR

D: 2HSP (E) /10HP (E)

答案：B

25. “室温”所指温度范围是

A: 2℃～10℃

B: -5℃～10℃

C: 10℃～30℃

D: 30℃～40℃

答案：C

26. 老年患者给予静脉滴注治疗药物宜降低输液速度，过快易引起

A: 肺水肿

B: 高血钾

C: 胃肠道刺激

D: 低血压

答案：A

27. 慎用硝酸甘油的原因是

A: 致使定向力障碍

B: 引起嗜睡

C: 致使视力模糊

D: 引起多尿或多汗

答案：C

28. 药学服务的具体内容不包括

A: 药品推销

B: 处方的审核与调配

C: 药学信息收集

D: 静脉药物配置

答案: A

29. 紧急避孕药的服药时间须在性行为之后的

A: 48h 内

B: 72h 内

C: 24h 内

D: 12h 内

答案: B

30. 影响核酸合成的药物

A: 放线菌

B: 培美曲塞

C: 顺铂

D: 依托泊苷

答案: B

31. (2021 年真题) 患者, 男, 58 岁, 有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史, 2 年前接受冠脉支架植入术。近日, 患者先后在心内科、消化科、骨科就诊, 开具药品如下:

A: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性, 应停用

B: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险, 两药不宜合用

C: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗, 需长期规律用药

D: 如大便次数规律 (如每日 1 次), 聚乙二醇 4000 散可按需使用

答案: A

32. 不稳定型心绞痛的药物治疗中, 不属于抗凝治疗的药物为

- A: 肝素
- B: 磺达肝癸钠
- C: 低分子肝素
- D: 替罗非班

答案：D

33. S-一兰索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP1A2
- B: CYP2C9
- C: CYP2C8
- D: CYP2C19

答案：D

34. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ()。

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 氧氟沙星滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：B

35. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: B 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: A 级

答案：B

36. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

- A: 过氧化苯甲酰凝胶
- B: 红霉素乳膏
- C: 异维 A 酸片
- D: 阿达帕林凝胶

答案：C

37. 随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别

- A: 1 级证据
- B: 3 级证据
- C: 2 级证据
- D: 4 级证据

答案：A

38. 属于妊娠 X 级毒性药品的是

- A: 水溶性维生素
- B: 氧氟沙星
- C: 辛伐他汀
- D: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

答案：C

39. 为提高叶酸治疗营养性巨幼细胞贫血的疗效，应同时用

- A: 维生素 K
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B12

答案：D

40. 高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

- A: 美托洛尔
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 维拉帕米

答案：A

41. 关于处方书写要求，错误的是

- A: 一张处方最多可以为 2 名患者开具药品
- B: 处方如果修改，需要在修改处有医师签名和日期
- C: 处方上需要标明临床诊断结果
- D: 化学药、中成药可以开在一张处方纸上，但每种药品必须分行书写，药品总数不得超过 5 种

答案：A

42. 查找药物信息的正确顺序是()。

- A: 二级信息源→三级信息源→一级信息源
- B: 二级信息源→一级信息源→三级信息源
- C: 一级信息源→二级信息源→三级信息源
- D: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

答案：D

43. 关于烫伤患者的用药指导和患者教育，错误的是

- A: 可使用红汞或甲紫药水涂抹患处
- B: 切忌用塑料布密封患处
- C: 有脑外伤的患者可使用地西泮镇静
- D: 烫伤后迅速用冷水或冰水湿敷患处

答案：A

44. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

- A: 阿托品
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 肾上腺素

答案：A

45. 根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

- A: 药品经营企业
- B: 药品生产企业
- C: 药品监督管理部门
- D: 药品研究机构

答案：B

46. 以下对"发热的指标"的叙述中，不正确的是

- A: 口腔温度超过 37.3℃
- B: 腋下温度超过 36.6℃
- C: 直肠温度超过 37.6℃
- D: 腋下温度超过 37.0℃

答案：B

47. 下述“质子泵抑制剂的合理应用与治疗监护点”中，不正确的是（
）

- A: 肝功能障碍患者慎用
- B: 妊娠及哺乳期妇女、儿童禁用
- C: 多数为肠溶制剂，服药时不宜嚼碎
- D: 高龄患者慎用

答案：B

48. 评价肾功能的可靠指标是

- A: 尿素氮
- B: 尿液酸碱度
- C: 血清肌酐
- D: 尿液肌酐

答案：C

49. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.13
- B: 0.38
- C: 0.58
- D: 0.72

答案：A

50. 服用何种药物可以减轻透析患者出现骨和关节的疼痛或头痛

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 乳果糖
- C: 阿法骨化醇
- D: 铁剂

答案：A

51. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 出现尿蛋白
- B: 血压升高
- C: 痛风急性发作
- D: 嗜睡

答案：C

52. 在配制静脉输液时，不宜直接用葡萄糖注射液溶解的药品是()。

- A: 硫酸庆大霉素
- B: 盐酸万古霉素
- C: 盐酸林可霉素
- D: 苯妥英钠

答案：D

53. 对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 普萘洛尔
- C: 阿托品
- D: 普鲁卡因胺

答案：A

54. 按照药品不良反应程度分级标准评判,症状明显,重要器官或系统功能有中度损害,应评判为

- A: 弱轻度
- B: 重度
- C: 中度
- D: 轻度

答案：C

55. 抗高血压药物属于利尿剂的是（）

- A: 缬沙坦
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平
- D: 依那普利

答案：B

56. （2018 年真题）患者，男，80 岁，临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是（）

- A: 睡前服用，注意监测肾功能
- B: 睡前服用，定期监测肝功能
- C: 睡前服用，起床站立时应缓慢，预防体位性低血压
- D: 每日服用一次，定期监测血糖，防止发生低血糖反应

答案：C

57. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 维生素 B1
- B: 硫酸镁
- C: 沙丁醇胺
- D: 噻氯匹定

答案：C

58. 某患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75kg，临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L，糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 胰岛素+二甲双胍
- B: 胰岛素
- C: 格列齐特
- D: 二甲双胍

答案：D

59. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.009
- B: 0.1
- C: 0.01
- D: 0.1

答案：C

60. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

- A: II 期临床试验
- B: 临床预试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：C

61. 属于公众用药咨询的是

- A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- B: 注射剂溶媒的正确选择

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 抗菌药物的合理应用

答案: C

62. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是()

A: 0.4g，每日 5 次

B: 0.4g，每日 4 次

C: 0.4g，每日 2 次

D: 0.8g，每日 3 次

答案: A

63. 反复吸入亚硝酸异戊酯，可解救

A: 丙米嗪中毒

B: 氰化氢中毒

C: 氯丙嗪中毒

D: 苯丙胺中毒

答案: B

64. 药品临床评价具有"公正性和科学性"是基于

A: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

B: 应用医药学理论和实践的前沿知识

C: 在多学科新进展的基础上进行

D: 药品临床评价重在实践

答案: A

65. 关于现代药学的发展,以药品供应为中心阶段的特征是

- A: 以新药研制为中心
- B: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- C: 以药品工业化生产为中心
- D: 以促进合理用药为主

答案: B

66. 各种肠道感染性或非感染性腹泻,或急性胃肠炎可引起

- A: 黏液便
- B: 冻状便
- C: 米泔水样便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案: D

67. (2019 年真题) 患者,男,68 岁,既往体健,因受凉后咳嗽、咳黄脓痰,伴发热 2 天入院。查体:体温 39.1℃,血压 138/80mmHg,心率 102 次/分,呼吸 32 次/分,左肺可闻及湿性啰音。化验结果:白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$,中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断:社区获得性肺炎。

- A: 阿奇霉素
- B: 莫西沙星
- C: 头孢哌酮舒巴坦
- D: 哌拉西林他唑巴坦

答案: B

68. 毒物种类很多,中毒方式各异,虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药,但救治原则基本相同。

- A: 阿米替林

B: 卡马西平

C: 硝西泮

D: 苯巴比妥

答案: C

69. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

A: 头晕

B: 乏力、困倦、活动耐力减退

C: 食欲不振

D: 记忆力减退

答案: B

70. 依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

A: 查找供货方

B: 反向追踪

C: 对可疑药品进行封存

D: 药品召回

答案: B

71. 患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 阿司匹林肠溶片应餐后服用

B: 雷米普利应清晨服用

C: 左旋氨氯地平应清晨服用

D: 氟伐他汀应睡前服用

答案: A

72. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是()。

- A: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高
- B: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常
- C: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加
- D: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高

答案：D

73. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

- A: 双胍类
- B: 促胰岛素分泌剂
- C: 胰岛素增敏剂
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：A

74. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 维持肠道正常菌群的平衡
- B: 减少肠内毒素的生成
- C: 可制约致病菌的生长繁殖
- D: 对促进营养物质的吸收没有帮助

答案：D

75. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6°C 、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 美洛昔康
- C: 尼美舒利
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

76. 患儿，男，2岁，患有尿路感染，适宜的治疗药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿莫西林
- C: 链霉素
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：B

77. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

- A: 胰岛B细胞的分泌规律
- B: 胃酸的分泌规律
- C: 糖皮质激素的分泌规律
- D: 肝脏合成胆固醇的规律

答案：A

78. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 利巴韦林
- B: 依非韦伦
- C: 利托那韦
- D: 齐多夫定

答案：B

79. 服用含有盐酸伪麻黄碱的抗感冒药后，可导致的不良反应是

- A: #NAME?
- B: 蛋白尿
- C: 栓塞
- D: 血压升高

答案：D

80. 引起"老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应"是

- A: 年龄
- B: 基础疾病
- C: 性别
- D: 遗传因素

答案：A

81. 影响核酸转录的药物

- A: 依托泊苷
- B: 培美曲塞
- C: 顺铂
- D: 放线菌

答案：D

82. 应提示患者，该附带的胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，而不能直接吞服胶囊

- A: 噻托溴铵粉吸入剂
- B: 复方甲硝唑栓
- C: 利福平滴眼剂
- D: 胰岛素笔

答案：A

83. 长期使用可引起骨质疏松的是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素

C: 炔雌醇

D: 胰岛素

答案: B

84. 治疗良性前列腺增生症的药物中，可引起性功能减退的药物为

A: 特拉唑嗪

B: 非那雄胺

C: 坦索罗辛

D: 奥昔布宁

答案: B

85. 服用伐地那非后，如果舌下含服硝酸异山梨酯，建议服药间隔时间应为

A: 24 小时

B: 1 周

C: 4 小时

D: 48 小时

答案: A

86. 属于祛痰药的是

A: 羟甲唑啉

B: 沙丁胺醇

C: 羧甲司坦

D: 苯丙哌林

答案: C

87. (2016 年真题) 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是 ()。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/507060005046010024>