

2024 年福建省龙文区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整题库含答案【巩固】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常。

- A: 多潘立酮
- B: 奥美拉唑
- C: 替普瑞酮
- D: 枸橼酸铋钾

答案：B

2. 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 对氨基水杨酸钠

答案：C

3. 阿糖腺苷属于

- A: 抗病毒药
- B: 抗过敏药

C: 抗真菌药

D: 抗肿瘤药

答案: A

4. 老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

A: 数字评分法

B: Bayesian 反馈法

C: Beers 标准

D: CTP 评分标准

答案: C

5. 选择合适药物的首要标准是

A: 药物治疗的有效性

B: 药物治疗的安全性

C: 药物治疗的方便性

D: 药物治疗的规范性

答案: A

6. 发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

A: 2~5 小时

B: 3~6 小时

C: 4~6 小时

D: 3~5 小时

答案: C

7. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1% 硫酸铜

B: 3%过氧化氢

C: 1%硫酸镁

D: 1%氯化钠

答案：C

8. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。卡托普利属于()

A: C 级

B: A 级

C: B 级

D: D 级

答案：D

9. (2018 年真题) 患者突发心前区压榨性疼痛,立即取出硝酸甘油片,正确的使用方法是()

A: 清晨服用

B: 舌下含服

C: 应同时碱化尿液

D: 用温水调服

答案：B

10. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

A: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果

B: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

C: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

D: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

11. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 多索茶碱
- B: 曲尼司特
- C: 氨茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：D

12. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是：

- A: 头孢呋辛
- B: 阿莫西林
- C: 阿奇霉素
- D: 左氧氟沙星

答案：C

13. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 糖皮质激素

答案：D

14. 血小板计数正常值范围是（ /L）

- A: $(50 \sim 100) \times 10^9$
- B: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$
- C: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$

D: $(100 \sim 300) \times 10^9$

答案: D

15. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

A: 利血平

B: 可卡因

C: 阿米替林

D: 异戊巴比妥

答案: B

16. 提高药效、减少人体吸收的是

A: 阿苯达唑

B: 氨基糖苷类

C: 利尿药

D: 抗忧郁药

答案: A

17. 患者女，64 岁，10 天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服右美沙芬时应加用的药品是

A: 氨茶碱

B: 可待因

C: 洛贝林

D: 氨溴索

答案: D

18. 结核病、水痘、麻疹、百日咳、流行性腮腺炎等传染病可呈现

A: 嗜酸性粒细胞增多

- B: 单核细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 淋巴细胞增多

答案：D

19. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，因糖尿病酮症酸中毒入院需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是

- A: 门冬胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 精蛋白锌胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

20. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示 TSH 增高，TT4 降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

- A: 推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片
- B: 左甲状腺素钠片应于早餐前 1 小时，空腹将 1 日剂量一次性用水送服
- C: 若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始
- D: 治疗初期每 4~6 周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量

答案：A

21. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是 ()

- A: C 级
- B: B 级

C: X 级

D: A 级

答案: B

22. 属于胃黏膜保护剂的是 ()

A: 多潘立酮

B: 埃索美拉唑

C: 法莫替丁

D: 铝碳酸镁

答案: D

23. 孟鲁司特平喘的主要机制是

A: 抑制白三烯受体

B: 阻断腺苷受体

C: 激动肾上腺素 β_2 受体

D: 拮抗 M 胆碱受体

答案: A

24. 如“齐二药事件”

A: 发现药品质量问题

B: 发现与规避假、劣药流入市场

C: 药品上市后风险评估

D: 药品上市前风险评估

答案: B

25. 有糖尿病的高血压患者服用降压药，建议控制在

A: $<140 / 80\text{mmHg}$

B: $<120 / 80\text{mmHg}$

C: <130 / 80mmHg

D: <140 / 90mmHg

答案：C

26. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 复合维生素 B

B: 维生素 A

C: 维生素 C

D: 维生素

答案：C

27. 抗肿瘤药物引起骨髓抑制，白细胞下降多开始于用药后

A: 第 5 天

B: 第 14 天

C: 第 3 天

D: 第 7 天

答案：D

28. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

A: 5 日

B: 7 日

C: 10 日

D: 3 日

答案：B

29. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 真菌

B: 吞噬细胞增多

C: 上皮细胞

D: 红细胞

答案: A

30. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可以选用的止吐药是

A: 昂丹司琼

B: 雷尼替丁

C: 奥美拉唑

D: 维生素 B6

答案: A

31. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 尿酮体试验

B: 粪便隐血试验

C: 尿素酶试验

D: 尿素呼气试验

答案: D

32. 应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

- A: 加快排泄，减小肾毒性
- B: 防止形成尿道结石或肾结石
- C: 患者伴血容量较低
- D: 减小用药部位刺激性

答案: B

33. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

- A: 硫普罗宁片
- B: 西地碘片
- C: 乳酶生片
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案: D

34. 由于上市后风险评估，发现其大剂量服用可使患者罹患心肌梗死和心脏猝死的危险增加，从而导致全球撤市的药物是

- A: 阿糖胞苷儿科事件
- B: 仙牛健骨颗粒
- C: 罗非昔布
- D: 西立伐他汀

答案: C

35. 处置蛇类咬伤的重要措施是防止毒液的扩散和吸收，最先实施的应急措施是

- A: 用器械取出残留的毒蛇牙

B: 抽吸伤口内的毒液

C: 用绳索、布带将伤口的近心端的 5cm 处捆住

D: 在伤口上做多个"十"字小切口

答案: C

36. 稚嫩、柔弱，喹诺酮类药物可致关节痛及关节肿胀、软骨损害

A: 内分泌系统

B: 血液系统

C: 运动系统

D: 水盐代谢

答案: C

37. 伴有高血压的患者应慎用的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 含伪麻黄碱的复方制剂

C: 氯苯那敏

D: 阿司匹林

答案: B

38. 阿尔茨海默病患者应该避免使用的药物是

A: 卡巴拉汀

B: 美金刚

C: 多奈哌齐

D: 颠茄

答案: D

39. 有机磷中毒的特效解毒剂是

A: 烯丙吗啡

B: 维生素 K1

C: 乙酰胺

D: 氯磷定

答案：D

40. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

A: 2.5g

B: 4.0g

C: 4.5g

D: 3.0g

答案：B

41. 对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

A: 使用分时药盒和用药记录

B: 简化治疗方案

C: 使患者了解药物的重要性

D: 针对患者生理及心理特点选药

答案：C

42. 同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 预混胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 普通胰岛素

答案：B

43. 为保障用药安全，需要进行血药浓度监测的药物是

- A: 地高辛
- B: 罗红霉素
- C: 青霉素
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

44. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

- A: 肯定
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 可能

答案：C

45. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

- A: 阿托品
- B: 可待因
- C: 氢氧化铝
- D: 苯巴比妥

答案：D

46. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 特殊剂型用法
- B: 特殊装置药品
- C: 药品有效期
- D: 药品贮存

答案：D

47. 儿童病情危重抢救时，多采用

- A: 口服给药
- B: 静脉给药
- C: 皮下注射
- D: 局部给药

答案：B

48. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 恩托卡朋

答案：D

49. 依据 CTP 评分，肝功能不全 B 级病人用药剂量为正常患者剂量的

- A: 50%维持剂量
- B: 30%维持剂量
- C: 40%维持剂量
- D: 25%维持剂量

答案：D

50. （2016 年真题）针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是（）。

- A: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g
- B: 肌肉注射维生素 B1，维生素 B6 和烟酸各 100mg
- C: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

D: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

答案: D

51. 可引起血清尿素氮降低的是

A: 胃溃疡

B: 慢性肾炎

C: 急性胰腺炎

D: 中毒性肝炎

答案: D

52. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

A: 钙剂+维生素 D+雌激素

B: 钙剂+维生素 D+降钙素

C: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐

D: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素

答案: D

53. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

A: 门冬酰胺酶?

B: 胰蛋白酶?

C: 凝血酶?

D: 胃蛋白酶?

答案: B

54. 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 多潘立酮片

C: 乳酶生片

D: 干酵母片

答案: D

55. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

A: 克林霉素

B: 氧氟沙星

C: 阿奇霉素

D: 多西环素

答案: A

56. (引起药源性肾病的药物) 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 直接肾毒性

B: 肾间质纤维化

C: 不可逆性肾小管坏死

D: 肾小管阻塞

答案: C

57. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10^9/L$

A: 利福霉素

B: 左氧氟沙星

C: 红霉素

D: 链霉素

答案: B

58. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()。

A: 氯苯那敏

B: 伪麻黄碱

C: 布洛芬

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

59. 单核细胞正常参考区间是

A: 0.20~0.40

B: 0~0.01

C: 0.03~0.08

D: 0.01~0.05

答案: C

60. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 阿司匹林肠溶片应餐后服用

B: 氟伐他汀应睡前服用

C: 雷米普利应清晨服用

D: 左旋氨氯地平应清晨服用

答案: A

61. 匹维溴铵的作用机制为 ()

A: M 受体阻断剂

B: M 受体激动剂

C: β 受体阻断剂

D: 钙拮抗剂

答案: D

62. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 与氯化钠存在配伍禁忌

B: 在葡萄糖溶液中稳定

C: 遇冷可加重其神经毒性

D: 其神经毒性与剂量大小无关

答案: D

63. 苯二氮类中毒血压下降时可给予 ()

A: 苯妥英钠

B: 阿托品

C: 有机硫类

D: 去甲肾上腺素

答案: D

64. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5α 还原酶抑制剂是

A: 非那雄胺

B: 特拉唑嗪

C: 阿夫唑嗪

D: 氟伏沙明

答案: A

65. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

- A: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素
- B: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷
- C: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁
- D: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶

答案：C

66. （2018 年真题）患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是（）

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 甲状腺次全切除手术
- C: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- D: 选用 ^{131}I 治疗

答案：C

67. 长期服用苯妥英钠，可能导致

- A: 丙氨酸氨基转移酶升高
- B: 血清碱性磷酸酶升高
- C: γ -谷氨酰转移酶升高
- D: A/G 值低于 1

答案：C

68. 对于铁剂的使用，正确的为

- A: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

- B: 待血红蛋白恢复正常后，即可停止服用
- C: 为迅速纠正患者贫血症状，初始治疗用大剂量
- D: 口服铁剂宜选用 3 价铁

答案：A

69. (2016 年真题) 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用
- B: 氨氯地平片可用于早上服用
- C: 阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用
- D: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

答案：A

70. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 碘苷
- B: 色甘酸钠
- C: 磺胺醋酰钠
- D: 维生素 B2

答案：A

71. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 硫酸钠
- B: 间羟胺
- C: 氟马西尼
- D: 亚甲蓝

答案：C

72. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

- A: 120~160g / L

B: 60~90g / L

C: 30~60g / L

D: 90~120g / L

答案：B

73. 可导致体重增加的抗焦虑药物为（）

A: 氟西汀

B: 舍曲林

C: 米氮平

D: 文拉法辛

答案：C

74. 由于药物的利尿作用，服用后需要大量饮水以防止脱水的是

A: 莫西沙星

B: 依替磷酸二钠

C: 氨茶碱

D: 苯溴马隆

答案：C

75. 患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物而致昏迷，送入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制。可选用的解救药物是

A: 维生素K

B: 纳洛酮

C: 亚甲蓝

D: 二巯丙醇

答案：B

76. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 血糖升高
- B: 低血糖反应
- C: 血压升高
- D: 过敏反应

答案：B

77. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 11~50U/L
- B: 成人 <40U/L
- C: 男性 <40U/L
- D: 成人 <50U/L

答案：B

78. 老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 哌替啶
- C: 苯二氮革类药
- D: 双嘧达莫

答案：C

79. (2017 年真题) 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是 ()

- A: $BMI \geq 28.0$
- B: $BMI < 21.5$
- C: $BMI \leq 18.5$

D: $BMI \geq 24.0$

答案：A

80. 口服或静脉滴注 β 受体拮抗剂用于解救

A: 克仑特罗中毒

B: 异烟肼中毒

C: 麦角胺中毒

D: 亚硝酸盐中毒

答案：A

81. 某男孩，12 岁，近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。

A: 丙戊酸

B: 苯妥英钠

C: 氯丙嗪

D: 地西泮

答案：A

82. 对目标适应证患者(多中心试验)治疗作用的初步评价试验阶段，属于

A: II 期临床试验

B: III 期临床试验

C: I 期临床试验

D: IV 期临床试验

答案：A

83. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。体检：身高 160cm，体重 78kg。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0-10.0 \times 10^9/L$ ），红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ （参考值 $3.55-5.0 \times 10^{12}/L$ ），总胆固醇 6.0mmol/L（参考值 $<5.2 \text{ mmol/L}$ ）。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 阿卡波糖
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列齐特

答案：C

84. （2017 年真题）容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是（）

- A: 蛋白结合率高，具有手性、分布容积大
- B: 分子量大、弱碱性
- C: 脂溶性高，分子量小
- D: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

答案：C

85. 容易氧化的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 阿扑吗啡
- C: 青霉素类
- D: 胃蛋白酶

答案：B

86. 苯丙胺中毒的临床表现是（）

- A: 谵妄、躁狂、幻觉
- B: 肌肉震颤、抽搐

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 心血管毒性

D: 明显的锥体外系症状

答案: A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/507102120050010024>