

2022 年度口腔执业医师执业医师资格考试调研测试卷（附答案）

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、甲状腺高功能腺瘤指

- A、Grave 瘤
- B、Plummer 瘤
- C、甲状腺腺瘤伴甲亢
- D、甲状腺腺癌伴甲亢
- E、桥本甲状腺肿

【参考答案】：C

2、有关正常淋巴结正确的是

- A、浅表淋巴结正常时较小，直径多为 0.3~0.6cm
- B、质地较韧，表面光滑
- C、与毗邻组织粘连
- D、不易触及
- E、无压痛

【参考答案】：D

3、腮腺浅叶上缘，神经血管排列由后向前依次为

- A、颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、面神经颞支、颞支
- B、颞浅动脉、耳颞神经、颞浅静脉、面神经颞支、颞支
- C、耳颞神经、颞浅静脉、颞浅动脉、面神经颞支、颞支
- D、面神经颞支、颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、颞支
- E、面神经颞支、颞浅动脉、耳颞神经、颞浅静脉、颞支

【参考答案】：A

4、可导致戴上颌义齿后恶心、唾液增多的是

- A、义齿基托后缘欠密合
- B、颊侧系带处基托缓冲不够
- C、磨光面形态不佳
- D、后牙排列偏颊侧
- E、义齿基托后缘过短

【参考答案】：A

5、下列哪项不是河豚毒素的毒性特点

- A、是极强的神经毒素
- B、耐热、耐酸
- C、盐腌可破坏其毒素
- D、卵巢、肝脏毒性最高
- E、肾、眼、血液、腮、皮肤次之

【参考答案】：C

6、梅毒下疳可于什么时候自行愈合

- A、感染后第3~8周
- B、感染后第4~9周
- C、感染后第5~10周
- D、感染后第6~10周
- E、感染后第7~10周

【参考答案】：A

7、外周血管痉挛性疾病可选用

- A、山莨菪碱
- B、异丙肾上腺素
- C、酚妥拉明
- D、普萘洛尔
- E、间羟胺

【参考答案】：C

8、腮腺咬肌区的前界是

- A、咬肌
- B、咬肌前缘
- C、咬肌后缘
- D、翼突下颌缝
- E、颊肌

【参考答案】：B

9、糖尿病患者血糖控制在多少时可考虑拔牙

- A、120mg/ dl
- B、150mg/dl
- C、180mg/ dl
- D、8.88mmol/ L
- E、6.1mmol/ L

【参考答案】：D

10、固定义齿与牙体缺损修复对基牙要求的主要差别在于

- A、牙冠有足够的固位形
- B、牙根粗长稳固

- C、要求活髓
- D、牙周组织健康
- E、基牙的轴向位置基本正常，有共同就位道

【参考答案】： E

11、通过自分泌形式刺激 T 细胞本身生长的细胞因子是

- A、IL-2
- B、IL-1
- C、IL-4
- D、IL-5
- E、IL-10

【参考答案】： A

12、WHO 牙周状况评价标准中牙结石平均检出区段数等级为中等的范围是

- A、1.0~2.0
- B、1.6~2.0
- C、2.0~3.0
- D、2.6~3.5
- E、3.0~4.0

【参考答案】： D

13、咀嚼周期的定义为

A、上下颌牙齿由咬合接触到分离，经再闭合到咬合接触，重复运动，直至将食物嚼碎，为一咀嚼周期

B、上下颌牙齿由咬合接触至分离，经再闭合至咬合接触为一咀嚼周期

C、上下颌牙齿由咬合接触至分离，经再闭合至咬合接触所用的时间为咀嚼周期

D、上下颌牙齿由咬合接触至分离，经再闭合至咬合接触为一周期，这一周期的运动途径称为咀嚼周期

E、上下颌牙齿切割。捣碎的和研磨食物的全过程为一咀嚼周期

【参考答案】：D

14、关于牙髓牙本质复合体，正确的叙述

A、牙髓与牙本质对外界刺激的反应完全是分离的

B、接近釉牙本质交界的外周牙本质，牙本质小管直径大，密度小

C、在接近牙髓端的内层牙本质，牙本质小管直径小，密度大

D、外层牙本质的通透性比内层高

E、从洞底到髓腔的牙本质越厚，牙髓所受的刺激越小

【参考答案】：E

15、以下关于根管冲洗液的叙述不正确的是

A、5. 25%次氯酸钠及3%过氧化氢交替使用可产生新生态氧，有发泡作用

B、次氯酸钠是坏死组织的良好溶解剂

C、EDTA对扩大硬化或弯曲根管有效

D、液体都能提供润滑作用

E、对牙根发育不全的根管选择次氯酸钠液冲洗

【参考答案】：E

16、国家鼓励下列人员率先献血

A、工人

B、农民

- C、知识分子
- D、高等学校在校学生
- E、中等学校在校学生

【参考答案】：D

17、男性，30岁，十二指肠溃疡穿孔后弥漫性腹膜炎12小时，入院后病人处于中毒性休克状态，处理不正确的是

- A、补充血容量
- B、应用抗生素
- C、纠正酸中毒
- D、立即行胃大部切除术
- E、纠正休克同时及早手术

【参考答案】：D

18、气水枪是极易被污染的，特别是气水枪的尖端，我们选择不同的措施来减少交叉感染，你认为合理的是

- A、每位病人用完后更换气水枪
- B、包裹手柄
- C、增设防回流装置
- D、A+B+C
- E、A+B

【参考答案】：D

19、抗体与抗原结合的部位是

- A、重链的C区
- B、轻链的V区
- C、重链的V区

D、重链和轻链的 V 区

E、Fc 片段

【参考答案】：D

20、成釉细胞瘤的穿刺液常为

A、淡黄色

B、不凝的血性液体

C、清亮的黏液

D、褐色液体

E、草黄色液体

【参考答案】：D

21、造成对颌牙损伤的主要原因是

A、牙钳选择不当

B、牙钳夹持位置不当

C、拔牙时用力方向不当

D、拔牙时用力无控制

E、对颌牙健康状况不良

【参考答案】：D

22、免疫增强疗法可用于除下列哪项之外的情况

A、移植排斥

B、恶性肿瘤

C、免疫缺陷病

D、病毒感染

E、真菌感染

【参考答案】：A

23、下列对原核细胞型微生物结构的描述中，准确的一项是

- A、有细胞壁但不含肽聚糖
- B、细胞壁化学成分为肽聚糖和几丁质
- C、含有线粒体、内质网、溶酶体等细胞器
- D、革兰阴性菌细胞壁主要成分是磷壁酸
- E、无核膜，核质为裸露环状 DNA

【参考答案】：E

24、牙周探诊的最佳力量是

- A、1~5g
- B、10g
- C、20~25g
- D、40g
- E、100~200g

【参考答案】：C

25、急性化脓性牙髓炎疼痛特点之一是

- A、持续性轻微钝痛
- B、冷刺激疼痛缓解
- C、疼痛发作短间歇长
- D、热刺激不引起剧烈疼痛
- E、可有重度的叩痛

【参考答案】：B

26、B淋巴细胞

- A、与 MΦ 不同之处在于其表面存在着 FcγR
- B、与 T 淋巴细胞不同之处是它可以进行吞噬
- C、与 T 淋巴细胞不同之处是它缺乏一种抗原受体
- D、可以对许多对 T 细胞有刺激作用的淋巴因子产生应答
- E、仅仅对 TD 抗原产生应答

【参考答案】：D

27、男性患者 2 岁，高热，呼吸困难，双肺散在小水泡音，诊断为支气管肺炎，青霉素试敏(+)，宜用

- A、氯霉素
- B、四环素
- C、头孢唑啉
- D、磺胺嘧啶
- E、红霉素

【参考答案】：E

28、外源性抗原在 APC 内消化降解的部位是

- A、蛋白酶体
- B、内体
- C、内质网
- D、高尔基体
- E、线粒体

【参考答案】：B

29、舌尖部淋巴管大部分引流至

- A、颌下淋巴结

- 、颌下淋巴结
- C、咽淋巴结
- D、颈深下淋巴结
- E、颈深上淋巴结

30、男，40岁，黄疸，肝脾大半年，进食时突然呕吐暗红色液体300ml，其病因可能为

- A、食管静脉曲张破裂
- B、食管贲门黏膜撕裂综合征
- C、食管癌
- D、急性胃黏膜损伤
- E、胃体上部溃疡

【参考答案】：A

31、II类HLA抗原在以下哪种细胞膜上不能检出

- A、静止T细胞
- B、B细胞
- C、单核细胞
- D、激活T细胞
- E、树突状细胞

【参考答案】：A

32、常用的牙种植体种类为

- A、骨内种植体
- B、骨膜下种植体

- 、黏膜下种植体
- D. 牙内种植体
- E. 牙内骨内种植体

33、斯展综合征的临床特征为

- A. 口腔大面积充血、水肿、渗出、糜烂，伴鼻腔、生殖器、肛门、眼损害
- B. 双侧口角湿白、糜烂、皲裂，伴皮肤、生殖器及眼病变
- C. 口腔、生殖器溃疡，针刺反应阳性，眼反复发生结膜炎、角膜炎等
- D. 口腔反复溃疡，伴结肠溃疡
- E. 口腔粘膜特别是下唇出现雀斑样色素沉着，伴胃肠道息肉

【参考答案】：A

34、以下关于三叉神经痛的叙述哪项是错误的

- A. 疼痛可自发，也可由刺激扳机点引起
- B. 角膜反射的改变常提示为症状性或器质性三叉神经痛
- C. 三叉神经痛分原发性和继发性两种
- D. 目前治疗三叉神经痛的首选药物是苯妥英钠
- E. 原发性三叉神经痛病员无论病程长短，神经系统检查极少有阳性体征

【参考答案】：D

35、与全口义齿后缘有关的解剖标志，除了_____，以下都是

- A. 腭小凹
- B. 颤动线

- 、翼上颌切迹
- D、磨牙后垫
- E、P切迹

36、IgG的生物学作用之一是

- A、与Ag结合后激活补体
- B、不能透过胎盘
- C、与Ag作用后，体内最先出现
- D、是分泌液中主要的保护性抗体
- E、其Fc段可以与肥大细胞结合

【参考答案】：A

37、改良Widman翻瓣术的适应证为

- A、牙周袋深度超过膜龈联合
- B、需截根术者
- C、需植骨术者
- D、牙龈增生
- E、需要牙槽骨成形术者

【参考答案】：A

38、在下颌根尖片上所能看到的颌骨正常解剖结构有

- A、颊棘、营养管、颊孔、外斜线、下颌管、下颌角区
- B、翼钩、营养管、颊孔、外斜线、下颌管、下颌角区
- C、颊棘、切牙孔、颊孔、外斜线、下颌管、下颌角区
- D、颊棘、营养管、喙突、外斜线、下颌管、下颌角区

、颞棘、营养管、颧骨、外斜线、下颌管、下颌角区

39、全口义齿试戴时，判断颌位关系是否正确的方法中错误的是

- A、用后牙咬合时，双侧颞部肌肉收缩明显
- B、上下咬合时，义齿基托是否有移动或扭转
- C、前伸或侧方运动时，义齿是否翘动
- D、卷舌后舔时，下颌是否还能后退
- E、后牙咬合时，是否偏向一侧

【参考答案】：C

40、牙髓炎的应急性处理包括以下各项，仅一项除外

- A、局部麻醉
- B、开髓开放
- C、置镇痛棉球
- D、针灸或药物止痛
- E、消炎药

【参考答案】：E

41、口腔粘膜创伤性损害的原因可以是

- A、机械、理化刺激
- B、机械、微生物感染
- C、理化刺激
- D、机械因素及过敏反应
- E、精神因素及局部刺激

【参考答案】：A

、贫血的临床表现不取决于

- A、贫血的程度
- B、贫血的速度
- C、性别
- D、患者的体力活动程度
- E、机体的代偿能力

43、RNA聚合酶II(TFII)与TATA盒直接结合的是

- A、TFIIA
- B、TFIIB
- C、TFIID
- D、TFIIE
- E、TFIIF

【参考答案】：C

44、当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服的，可自收到首次鉴定结论之日起几日内再次提出鉴定申请

- A、7日
- B、10日
- C、15日
- D、20日
- E、30日

【参考答案】：C

45、硝酸甘油口服，经门静脉入肝。在进入体循环的药量约10%左右，这说明该药

- 、活性低
- B、效能低
- C、首过消除显著
- D、排泄快
- E、首过消除不显著，排泄慢

46、以正中关系位髁状突中心为原点，工作侧髁突运动范围为

- A、从原点向外侧运动约 5mm 的 60° 圆锥体
- B、从原点向外侧运动约 3mm 的 60° 圆锥体
- C、从原点向内侧运动约 5mm 的 60° 圆锥体
- D、从原点向内侧运动约 3mm 的 60° 圆锥体
- E、以原点为圆心的直径 3mm 的球体

【参考答案】： B

47、龋均(DMFT)指的是受检人群中平均每人

- A、患龋牙数
- B、患龋牙面数
- C、患龋失补牙数
- D、患龋失补牙面数
- E、患龋拔补牙面数

【参考答案】： C

48、再植牙成功的标准中错误的是

- A、疼痛消失
- B、无松动

- C、牙功能正常
- D、X线片示根无异常透射影
- E、行使功能达3年以上

【参考答案】：E

49、颌骨骨折愈合过程中，骨痂形成的时间是在骨折后

- A、1周
- B、2周
- C、4周
- D、1个月
- E、2个月

【参考答案】：B

50、可用做吸入麻醉的药不包括

- A、异丙酚
- B、乙醚
- C、异氟醚
- D、氧化亚氮
- E、安氟醚

【参考答案】：A

51、某蓄电池厂磨粉工，工龄14年，近半年来出现头痛、头昏、肌肉关节酸痛、手指麻木等症状，化验室检查有轻度贫血，该患可考虑诊断为

- A、急性铅中毒
- B、慢性铅中毒
- C、急性苯中毒

D、慢性苯中毒

E、慢性汞中毒

【参考答案】：B

52、哪项不是慢性支气管炎肺气肿的体征

A、桶状胸

B、叩诊过清音

C、触诊语颤减弱

D、听诊呼吸音增强

E、肺下界减低

【参考答案】：D

53、人的行为不是由本能决定，也不简单是外部刺激的结果，而是人的理性评价的结果，这种观点符合

A、精神分析理论

B、行为主义理论

C、人本主义理论

D、认知理论

E、心理生理学理论

【参考答案】：D

54、颞颥部软组织出血，若采用压迫止血，应该压迫的动脉是

A、颌外动脉

B、颞浅动脉

C、颌内动脉

D、耳后动脉

E、颞深动脉

【参考答案】：B

55、病人甲输液中发生反应。经对症处置，症状消失，当天夜里出现心悸、呼吸困难，晨5时死亡。家属认为是医院的责任，拒不从病房移走尸体。第2天上午上班，院方决定作尸检请法医魏某作。下午魏某告知院方因紧急会务不能去作，家属也不同意尸检，第3天又请到法医李某，经与家属协商，第4天进行了尸检，李某未能对死因作出解释。使纠纷无法结论，对这一结果

- A、只能以死因不明定论
- B、魏某承担因拖延而迟延尸检，无法结论的结果
- C、李某承担因未作出解释而无法结论的结果
- D、院方承担因请人不当而无法结论的结果
- E、家属承担因不同意尸检迟延尸检而无法结论的结果

【参考答案】：E

56、一患者骑车时不慎摔伤，颞部着地，出现张口时关节区疼痛，张口受限，以下哪种X线片最适合诊断需要

- A、下颌骨曲面断层
- B、华氏位片
- C、下颌开口后、前位片
- D、下颌侧位片
- E、颞弓位片

【参考答案】：A

57、女性，35岁，因甲状腺肿块在当地行甲状腺肿块切除术后5天，病理学诊断为甲状腺乳头状腺癌Ⅱ级，对该患者进一步的处理是

- A、终生服用甲状腺素片

- B、行放射性外照射
- C、行放射性碘治疗
- D、再次手术，行患侧全切及对侧全切
- E、再次手术，行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除

【参考答案】： E

58、不属于牙源性肿瘤的是

- A、牙瘤
- B、牙骨质瘤
- C、成釉细胞瘤
- D、牙源性黏液瘤
- E、骨化性纤维瘤

【参考答案】： E

59、后堤区的作用

- A、基托后缘定位
- B、边缘封闭作用
- C、支持作用
- D、排牙标志
- E、缓冲作用

【参考答案】： B

60、牙周袋深度的测量，要探测

- A、颊舌侧近中、中央、远中六个位点
- B、颊舌侧近中、远中四个位点
- C、颊侧近中、中央、远中、舌侧中央四个位点

- D、舌侧近中、中央、远中、颊侧中央四个位点
- E、颊舌侧中央二个位点

【参考答案】：A

61、关于拔牙窝的处理，哪项是错误的

- A、撕裂的牙龈组织应予缝合
- B、扩大的牙槽窝需要复位
- C、与骨膜牙龈相连的骨折片应复位保留
- D、拔除乳牙残根后应彻底搔刮
- E、拔牙创内的肉芽应彻底刮净

【参考答案】：D

62、下列微生物中，属于真核细胞型微生物的是

- A、真菌
- B、细菌
- C、支原体
- D、立克次体
- E、病毒

【参考答案】：A

63、可以引起舌后坠。发生窒息的是

- A、颞部粉碎性骨折
- B、LeFort II型骨折
- C、颞部正中单线骨折
- D、下颌孔区骨折
- E、双侧髁状突颈部骨折

【参考答案】： A

64、在清洁牙面上，获得性薄膜形成所需的时间

- A、数分钟
- B、1~2 小时
- C、2~10 小时
- D、10~24 小时
- E、24~48 小时

【参考答案】： A

65、用四环素族类药物可致恒牙发生四环素牙的时期是

- A、胚胎 4 个月
- B、胚胎 6 个月
- C、出生以前
- D、7 岁以前
- E、8 岁以后

【参考答案】： D

66、关于固定桥连接体的说法哪项是错误的

- A、是固定桥结构中的应力集中区
- B、为增加强度连接体应向龈端延伸至龈缘处
- C、分为固定连接体和活动连接体
- D、连接体的外形应圆钝
- E、增加连接体的殆龈厚度可增加强度

【参考答案】： B

67、乳牙拔除后是否制作功能保持器应考虑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508050123102006031>