

2022-2023 学年河南省商丘市成考专升本医学综合自考测试卷(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100 题)

- 1.关于水肿，下列说法不正确的是（ ）
A.心源性水肿常从身体的低位开始
B.肾源性水肿常发展迅速
C.肾源性水肿常伴高血压
D.肝源性水肿常以腹水为主要表现
E.甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿
2. 下列选项中，不属于小脑中央核的是
A.齿状核 B.球状核 C.栓状核 D.顶核 E.基底核
3. 鼻泪管末端的开口部位是（ ）
A.中鼻道 B.下鼻道 C.上鼻道 D.泪点 E.泪囊
4. 白细胞分类中，淋巴细胞百分比为（ ）
A.10% ~ 30% B.20% ~ 40% C.30% ~ 50% D.0.1 E.0.25
- 5.听到开瓣音常提示（ ）。
A. 二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全

- B. 二尖瓣严重狭窄，瓣膜钙化
- C. 二尖瓣狭窄分离术的禁忌证
- D. 二尖瓣狭窄伴左心衰竭
- E. 二尖瓣轻、中度狭窄，瓣膜弹性和活动性较好

6. 大量腹水时，腹包块的触诊，下列哪种方法最适宜（ ）

- A. 滑行触诊法
- B. 深压触诊法
- C. 双手触诊法
- D. 冲击触诊法
- E. 浅部触诊法

7. 50 kg 体重的正常人的体液与血量分别为（ ）。

- A. 50 L 与 3 . 5 L
- B. 30 L 与 3 . 5 ~ 4 L
- C. 20 L 与 4 L
- D. 30 L 与 2 . 5 L
- E. 20 L 与 2 . 5 L

8. 剑突下收缩期搏动提示()

- A. 右心室增大
- B. 左心室增大
- C. 右心房增大
- D. 左心房增大
- E. 心包积液

9. 视区位于()。

- A. 颞横回
- B. 角回
- C. 海马旁回钩
- D. 距状沟两岸
- E. 缘上回

10. 胆盐吸收的主要部位是（ ）

- A. 十二指肠
- B. 空肠
- C. 回肠
- D. 升结肠
- E. 大肠

11. 下列骨中，参与组成踝关节的是()

- A. 内侧楔骨
- B. 外侧楔骨
- C. 足舟骨
- D. 距骨
- E. 股骨

12. 女性正常排卵的黄体 ()

- A.分泌孕酮 B.分泌雌激素 C.分泌黄体生成素 D.分泌孕酮及雌激素 E.
分泌孕酮、雌激素和黄体生成素

13.高血压病 ()。

- A. A_2 增强
B. A_2 减弱
C. P_2 增强
D. P_2 减弱
E. S_1 减弱

14.寄生虫感染多有 ()。

- A.嗜酸性粒细胞增多 B.淋巴细胞增多 C.中性粒细胞增多 D.嗜碱性粒
细胞增多 E.红细胞增多

15. 病人诉述的最主要的症状称为

- A.现病史 B.个人史 C.既往史 D.系统回顾 E.主诉

16. 最常引起完全无尿的是 ()

- A.肾前性肾衰 B.肾性肾衰 C.肾后性肾衰 D.大出血、休克 E.广泛烧伤

17.二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括 ()

- A.左房增大

B.左室增大

C.室壁运动减弱

D.多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E.如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD段呈“吊床样”改变

18.诊断 ARDS 除呼吸困难、口唇发绀外，呼吸频率应为（ ）

A.> 20 次 / min

B.> 25 次 / min

C.> 30 次 / min

D.> 35 次 / min

E.> 40 次 / min

19.迷走神经背核属于()。

A.一般躯体运动核 B.特殊内脏运动核 C.一般内脏运动核 D.一般内脏感觉核 E.特殊躯体感觉核

20.输尿管结石（ ）。

A.腹痛伴发热、寒战者 B.急性腹痛伴休克者 C.慢性腹痛伴腹泻 D.急性腹痛同时伴贫血 E.腹痛伴血尿者

21. 中性粒细胞增多最常见的原因是

A.急性感染或炎症 B.大面积烧伤 C.急性溶血 D.急性中毒 E.恶性肿瘤

22. 触觉语颤增强见于()

A.肺气肿 B.肺不张 C.胸腔积液 D.大叶性肺炎 E.气胸

23.心迷走神经末梢释放的递质是 ()

A.A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 5-羟色胺

24.支配三角肌的神经为()

A.A.腋神经 B.尺神经 C.肌皮神经 D.正中神经 E.桡神经

25.激活胰液中胰蛋白酶原的是()。

A.脂肪酸 B.胆盐 C.蛋白水解产物 D.肠致活酶 E.糜蛋白酶

26.最轻的意识障碍为 【 】

A.嗜睡 B.谵妄 C.浅昏迷 D.昏 E.意识模糊

27. 下列关于胰岛素作用的叙述, 错误的是()

A.促进组织对糖的摄取和利用 B.促进糖原合成 C.促进糖异生 D.促进脂肪合成 E.促进蛋白质合成

28.胃十二指肠穿孔的诱因是()。

A.情绪激动 B.暴食、进食刺激性食物 C.过度疲劳 D.以上都对

29. 前庭蜗器包括

A.外耳、中耳和内耳 B.外耳道、中耳和内耳道 C.鼓室、乳突小房和咽鼓管 D.骨迷路和膜迷路 E.半规管、前庭和耳蜗

30.复苏的主要目的是()

A.A.迅速恢复脑的血液循环 B.恢复自主呼吸 C.减轻酸中毒 D.保护肾功能 E.使心脏迅速恢复跳动

31. 输卵管的位置与形态

A.位于子宫系膜内
B.其内端为输卵管子宫口，外端为输卵管腹腔门
C.输卵管峡细长而弯曲
D.输卵管壶腹的边缘有输卵管伞
E.壶腹部在漏斗部的外侧

32.受伤达 12h 的严重沾染伤口，应采取()

A.清创及一期缝合 B.清创及延期缝合 C.清创后不予缝合 D.清创及植皮 E.无须清创

33.阻塞性或肝细胞性黄疸 ()。

A.尿镜检红细胞满视野
B.尿镜检白细胞满视野
C.尿外观正常，镜检可见各种管型

D.尿外观酱油色，隐血试验(+)

E.尿外观深黄色，含大量胆红素

34. 男性，34岁，晚餐后出现剧烈腹痛，6小时后来医院就诊。经检查诊断为消化道穿孔、急性腹膜炎。该患者最不可能出现的体征是（ ）

A.板状腹 B.肝浊音界缩小 C.腹部反跳痛阳性 D.移动性浊音阳性 E.肠鸣音亢进

35.支配汗腺的交感神经节后纤维末梢释放的递质是()。

A.肾上腺素 B.去甲肾上腺素 C.乙酰胆碱 D.多巴胺 E.5—羟色胺

36. 根据以下选项，回答下列各题：

A . 近曲小管

B . 髓袢降支细段

C . 髓袢升支粗段

D . 远曲小管

E . 集合管

肾小球滤液中的氨基酸被重吸收的部位是（ ）

37.当心脏处于全心舒张期时()

A.心室达到最大充盈

B.房室瓣关闭

C.心室容积不变

D.动脉瓣关闭

E.心室内压略高于心房内压

38. 血浆晶体渗透压主要来自

A.葡萄糖 B.球蛋白 C.Na⁺ D.K⁺ E.白蛋白

39.患者头痛伴有下列情况，其中属于症状的是()

A.肌力4级 B.喷射样呕吐 C.视乳头水肿 D.踝阵挛 E.脑膜刺激征

40.通过坐骨小孔的神经是 ()。

A.闭孔神经 B.臀上神经 C.臀下神经 D.阴部神经 E.坐骨神经

41.支配眼轮匝肌的神经是 ()

A.A. 动眼神经 B. 滑车神经 C. 展神经 D. 面神经 E. 眼神经

42. 触诊肾脏是否肿大最佳的方法是 ()

A.滑动触诊法 B.冲击触诊法 C.插入触诊法 D.双手触诊法 E.以上都不是

43.心电图反映窦房结兴奋传至心室的波段是 【 】

A.P波 B.PR间期 C.QRS波 D.S段 E.T波

44. 输血的禁忌症应除哪项外

A.心力衰竭 B.肺水肿 C.红细胞增多症 D.严重感染 E.恶性高血压

45. 关于直肠壶腹的正确叙述是 ()

A.直肠位于盆膈以上的部分 B.直肠盆部下段膨大的部分 C.直肠下端无腹膜覆盖的部分 D.以上都对 E.以上都错

46. 维持躯体姿势的最基本的反射是

A.屈肌反射 B.对侧伸肌反射 C.腱反射 D.肌紧张反射 E.翻正反射

47.维持子宫前倾的主要韧带是 ()

A.子宫圆韧带 B.子宫阔韧带 C.子宫骶韧带 D.子宫主韧带 E.骨盆漏斗韧带

48.烧伤创面适宜包扎疗法的部位是 ()

A.头部 B.面部 C.躯干 D.会阴 E.肢体

49.一旦确诊为心跳骤停,必须争取在多长时间內重建呼吸循环()。

A.4~6分钟 B.6~8分钟 C.8~10分钟 D.10~12分钟 E.12~15分钟

50.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

51. 关于抑制性突触后电位的产生, 正确的叙述是

A.突触前轴突末梢超极化

B.突触后膜对 Ca^{2+} 、 K^{+} 通透性增大

C.突触后膜去极化

D.突触后膜出现超极化

E.突触后膜出现复极化

52. 高调金属音的肠鸣音亢进最常见于 ()

A.消化道出血 B.腹泻 C.急性胃肠炎 D.机械性肠梗阻 E.服泻药后

53. 间脑特异性中继核团中, 与躯体运动的调节有关的是 ()

A.腹前核 B.腹后核 C.内侧膝状体 D.外侧膝状体 E.以上都不是

54.有机磷中毒“中间型综合征”的发病机制是()。

A.中枢神经系统受损 B.神经-肌肉接头处受损 C.胆碱酯酶受到抑制

D.周围神经病变

55.第一心音到第二心音期间代表 ()

A.A. 心室舒张期 B. 心室收缩期 C. 心房收缩期 D. 心房舒张期 E.

等容收缩期

56. 在心室等容收缩期时 ()

A.房内压>室内压>主动脉压

B.房内压<室内压>主动脉压

C.房内压=室内压>主动脉压

D.房内压<室内压<主动脉压

E.房内压>室内压<主动脉压

57.女性，40岁。既往有风湿性心脏病史，近一周出现咳嗽、咯痰，双下肢浮肿，不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征（ ）

A.呼吸过缓

B.深大呼吸

C.潮式呼吸

D.呼吸过速

E.叹息样呼吸

58.肝素抗凝血的主要作用机理是（ ）

A.抑制 X 因子激活 B.增强抗凝血酶Ⅲ的活性 C.促进纤维蛋白溶解 D.去除 Ca^{2+} E.抑制血小板的作用

59.检查腹肌紧张度，应采用的手法是（ ）

A.浅部触诊法 B.深部触诊法 C.冲击触诊法 D.深压触诊法 E.勾指触诊法

60.说明疾病本质的诊断是

A.病理形态诊断 B.病因诊断 C.病理生理诊断 D.专家诊断 E.排除诊断

61. 既能屈髋又能伸膝的肌是

A.股直肌 B.股薄肌 C.缝匠肌 D.股内侧肌 E.肌中间肌

62. 破伤风属于

A.菌血症 B.毒血症 C.败血症 D.脓血症 E.脓毒败血症

63.结肠镜检查的禁忌证是 【 】

A.急性腹膜炎 B.排便习惯改变 C.间断性血便 D.结肠肿瘤术后 E.炎症性肠病

64.动眼神经损伤会引起()。

A.眼内斜视 B.眼内斜视和瞳孔缩小 C.眼外斜视和瞳孔缩小 D.眼外斜视和瞳孔散大 E.眼内斜视和瞳孔散大

65. 下列便血患者中，能提示结肠癌的是

A.伴发热 B.伴消瘦 C.伴腹痛 D.伴黑便 E.伴腹部肿块

66.大隐静脉行走于()

A.内踝前方

B.内踝后方

C.外踝前方

D.外踝后方

E.小腿后面

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508061037054006033>