

2024 湖北省洪湖市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库附参考答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 吡嗪酮
- B: 甲硝唑
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯喹

答案：D

2. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

- A: 阿昔洛韦
- B: 咪康唑
- C: 红霉素
- D: 庆大霉素

答案：B

3. 卡泊芬净属于()

- A: 多烯类抗真菌药
- B: 棘白菌素类抗真菌药
- C: 唑类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：B

4. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

- A: 环磷酰胺
- B: 氟尿嘧啶
- C: 巯嘌呤
- D: 纳武利尤单抗

答案：D

5. 容积性泻药()

- A: 乳果糖
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁
- D: 甘油

答案：C

6. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 急性前壁心肌梗死
- B: 已使用西地那非者
- C: 严重低血压者
- D: 青光眼患者

答案：A

7. 患者,男,64 岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院,血压 203/110mmHg,该患者宜首选(如果疗程超过 72 小时需密切监测血中硫酸盐水平)的降压药物是

- A: 贝那普利
- B: 氨氯地平
- C: 硝普钠
- D: 美托洛尔

答案：C

8. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()

。

A: 依诺肝素

B: 维生素 B

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案：A

9. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 埃索美拉唑钠

C: 美托洛尔

D: 替米沙坦

答案：A

10. 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 阿德福韦酯

D: 拉米夫定

答案: B

11. 与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括()

A: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱

B: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

C: 不易致出血

D: 半衰期长，皮下注射吸收较好

答案: B

12. 患者，男，56 岁。有糖尿病病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl。

A: 皮下注射

B: 口服

C: 静脉注射

D: 舌下含服

答案: C

13. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 青霉素

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 氯霉素

答案: B

14. 阿哌沙班属于()

- A: 凝血因子 X 抑制剂
- B: 环氧酶抑制剂
- C: 维生素 K 拮抗剂
- D: 直接凝血酶抑制剂

答案：A

15. 以下避孕药不受月经周期限制的是

- A: 去氧孕烯
- B: 孕二烯酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 双炔失碳酯

答案：D

16. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

- A: 依他尼酸
- B: 呋塞米
- C: 布美他尼
- D: 磺胺类药

答案：A

17. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 细胞内膜 PBP

答案：D

18. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 吗氯贝胺
- C: 氯硝西泮
- D: 丙戊酸钠

答案：B

19. 以下关于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂使用的描述，错误的是

- A: 存在发生胰腺炎的风险
- B: 建议与 DPP-4 抑制剂联用
- C: 口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少 1 小时服用
- D: 不良反应主要发生于胃肠道

答案：B

20. 对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

- A: 阿托品
- B: 利尿剂
- C: 苯妥英钠
- D: 氯化钾、葡萄糖注射液

答案：C

21. 抑制 HIV 的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

- A: 核苷类反转录酶抑制药
- B: 非核苷类反转录酶抑制药
- C: 整合酶抑制剂
- D: 蛋白酶抑制药

答案：A

22. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

- A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- C: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- D: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

答案：C

23. 出现流感样综合征，寒战、发热的药物是 ()

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 对氨基水杨酸

答案：A

24. 连续应用易产生耐受性的是

- A: 普萘洛尔
- B: 地尔硫
- C: 硝苯地平
- D: 硝酸甘油

答案：D

25. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是 ()

- A: 苯妥英钠
- B: 利多卡因
- C: 奎尼丁
- D: 普萘洛尔

答案：D

26. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

- A: 维生素 K
- B: 垂体后叶素
- C: 维生素
- D: 鱼精蛋白

答案：A

27. β_1 受体激动后的影响是

- A: 脂肪分解
- B: 肌肉震颤
- C: 支气管扩张
- D: 增加心率

答案：D

28. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 长春碱
- B: 紫杉醇
- C: 羟喜树碱
- D: 他莫昔芬

答案：A

29. 异烟肼联用氢氧化铝使

- A: 肝毒性增加
- B: 疗效减弱
- C: 吸收减少
- D: 月经不规则

答案：C

30. 甲状腺危象宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硫脲类+大剂量碘
- C: 硫脲类
- D: 甲状腺片

答案：B

31. 患者男性，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟，呼吸急促，面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 地塞米松+去甲肾上腺素
- B: 地塞米松+肾上腺素
- C: 曲安西龙+异丙肾上腺素
- D: 地塞米松+多巴胺

答案：B

32. 阿托品禁用于

- A: 遗尿症
- B: 胆绞痛
- C: 全身麻醉前给药
- D: 青光眼

答案：D

33. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 吉非替尼
- B: 紫杉醇
- C: 巯嘌呤

D: 枸橼酸他莫昔芬

答案: B

34. 属于广谱抗心律失常药物的是()

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 地高辛

答案: A

35. 可促进白细胞增生的药物是

A: 维生素 B

B: 红细胞生成素

C: 叶酸

D: 粒细胞集落刺激因子

答案: D

36. 硫脲类的严重不良反应是

A: 药疹、瘙痒

B: 粒细胞缺乏症

C: 甲状腺肿大

D: 关节痛

答案: B

37. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A: 柳氮磺吡啶

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺甲

D: 磺胺米隆

答案: A

38. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()。

A: 毛果芸香碱

B: 乙酰唑胺

C: 甘露醇

D: 噻吗洛尔

答案: A

39. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

B: 具有吸附、收敛的作用

C: 属于抗动力药

D: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

答案: C

40. 长期或大剂量使用质子泵抑制剂可导致的不良反应是

A: 髌骨、腕骨骨折

B: 血浆泌乳素升高

C: 呃逆、腹胀

D: 腹泻

答案: A

41. 属于雌激素类退乳药的是()

A: 睾酮

B: 己烯雌酚

C: 甲羟孕酮

D: 他莫昔芬

答案: B

42. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A: 急性前壁心肌梗死

B: 收缩压<90mmHg 的严重低血压

C: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案: A

43. (2018 年真题) 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时, 适宜的服药时间是()

A: 清晨或睡前

B: 餐后 2h

C: 餐前即刻

D: 餐中

答案: D

44. 对偶发性失眠者可选择()。

A: 氟西洋

B: 唑吡坦

C: 艾司唑仑

D: 夸西洋

答案: B

45. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 坎利酮

B: 丙酸睾酮

C: 去甲肾上腺素

D: 西地那非

答案: D

46. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

A: 与麻黄碱合用

B: 与他汀类药物合用

C: 与西地那非合用

D: 与硝普钠合用

答案: B

47. 治疗肥胖的 2 型糖尿病的是

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: A 和 B 均无效

D: 磺酰脲类

答案: B

48. 多库酯钠作为泻药的作用机制是

A: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

B: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

C: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：A

49. 配制静脉输液时；应先用灭菌注射用水溶解，然后用 5%葡萄糖注射液稀释，不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是()

A: 两性霉素 B

B: 伏立康唑

C: 氟康唑

D: 卡泊芬净

答案：A

50. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 拉米夫定

B: 干扰素- α

C: 恩替卡韦

D: 泛昔洛韦

答案：D

51. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

A: 普伐他汀

B: 藻酸双酯钠

C: 氟伐他汀

D: 阿伐他汀

答案：A

52. 阿司匹林的作用机制是

A: 促进纤溶

- B: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进凝血因子合成

答案：C

53. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

- A: 维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 阿达帕林

答案：B

54. 患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

- A: 司来吉兰
- B: 萘普生
- C: 糖皮质激素
- D: 依那西普

答案：A

55. 维生素 B12 的适应证为

- A: 拮抗华法林过量导致的出血
- B: 拮抗肝素过量导致的出血
- C: 恶性贫血和巨幼细胞贫血
- D: 纤溶亢进所致的出血

答案：C

56. 下列雌激素中，可用作复方口服避孕药的成分之一的是()

- A: 雌二醇
- B: 尼尔雌醇
- C: 炔诺酮
- D: 炔雌醇

答案：D

57. 碳酸氢钠可用于

- A: 代谢性碱中毒
- B: 代谢性酸中毒
- C: 呼吸性酸中毒
- D: 呼吸性碱中毒

答案：B

58. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 多黏菌素
- B: 呋喃妥因
- C: 甲硝唑
- D: 克林霉素

答案：C

59. 通过抑制 HMG-CoA 还原酶调脂的药物是()

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 烟酸
- D: 洛伐他汀

答案：D

60. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是 ()

- A: 左炔诺孕酮 (1
- B: 十一酸睾酮 (40mg)
- C: 炔雌醇去氧孕烯 (30 μ g/150 μ g)
- D: 复方醋酸环内孕酮 (35 μ g/2mg)

答案: A

61. 同时具有短效和长效双时相) 作用的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 预混胰岛素注射液

答案: D

62. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 氯丙嗪
- B: 劳拉西泮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 帕洛诺司琼

答案: B

63. (2016 年真题) 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

- A: 维生素 B1
- B: 依诺肝素

C: 维生素 B2

D: 维生素 B12

答案：B

64. 治疗绦虫病的首选药品是()。

A: 伯氨喹

B: 哌嗪

C: 吡喹酮

D: 伊维菌素

答案：C

65. 可拮抗阿托品所致的心动过速的是

A: 地尔硫卓

B: 地高辛

C: 普萘洛尔

D: 美西律

答案：A

66. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

A: 促进 Ca^{2+} 内流

B: 抑制 Ca^{2+} 外流

C: 促进 K^{+} 外流

D: 抑制 Na^{+} 内流

答案：D

67. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A: 沙美特罗

B: 布地奈德

C: 多索茶碱

D: 孟鲁司特

答案: D

68. (2015 年真题) 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 ()。

A: 氟西汀

B: 阿米替林

C: 文拉法辛

D: 吗氯贝胺

答案: D

69. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是 ()。

A: 维生素 B

B: 甲氧氯普胺

C: 阿瑞吡坦

D: 托烷司琼

答案: B

70. 关于双胍类药物的作用特点描述，错误的是

A: 促进组织摄取葡萄糖

B: 不与蛋白结合，不被代谢，尿中排出

C: 不会降低正常的血糖

D: 抑制胰高血糖素的分泌

答案: D

71. 对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是

A: 头孢噻肟

B: 头孢他啶

C: 头孢曲松

D: 头孢克洛

答案：D

72. 可单独用于轻度、早期高血压的是

A: 乙酰唑胺

B: 阿米洛利

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：D

73. 属于黏痰溶解剂，适用于大量痰液堵塞气管导致呼吸困难的祛痰药物是

A: 溴己新

B: 乙酰半胱氨酸

C: 氨溴索

D: 糜蛋白酶

答案：B

74. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是()

A: 格列美脲属于本类药物

B: 此类药物可降低 2 型糖尿病患者的餐前血糖

C: 此类药物需在餐前即刻服用

D: 此类药物不能单独服用

答案：C

75. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

A: 非诺贝特

B: 辛伐他汀

C: 烟酸

D: 依折麦布

答案: A

76. 下列不属于一线抗结核药的是

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 链霉素

D: 乙硫异烟胺

答案: D

77. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 克林霉素

D: 红霉素

答案: D

78. 抗心绞痛药物的主要目的是()

A: 减慢心率

B: 缩小心室容积

C: 降低心肌耗氧量

D: 扩张冠状动脉

答案: C

79. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 普适泰
- B: 度他雄胺
- C: 依立雄胺
- D: 非那雄胺

答案：A

80. 多黏菌素 B 的抗菌机制是

- A: 抑制蛋白质合成的全过程
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 影响胞浆膜的通透性
- D: 影响叶酸代谢

答案：C

81. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

- A: 男子乳房女性化
- B: 室性心律失常
- C: 锥体外系反应
- D: 女性月经不调

答案：C

82. （2021 年真题）影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物（）

- A: 利那洛肽
- B: 双歧杆菌三联活菌
- C: 氢氧化铝
- D: 昂丹司琼

答案：C

83. 利巴韦林最主要的不良反应是

- A: 溶血性贫血
- B: 听力异常
- C: 味觉异常
- D: 头痛

答案：A

84. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 惊厥
- B: 支气管痉挛
- C: 心律失常
- D: 血压下降

答案：C

85. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 阿昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 恩替卡韦

答案：D

86. 利奈唑胺的不良反应不包括

- A: 骨髓抑制
- B: 癫痫
- C: 头痛

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 血小板减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/508073036042007022>