

2024 年河南省博爱县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整版

【巩固】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物中，适用于急性尿失禁的药物为

- A: 非那雄胺
- B: 奥昔布宁
- C: 米多君
- D: 哌唑嗪

答案：B

2. 同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 普通胰岛素
- B: 预混胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

3. (2016 年真题) 贫血患者常出现 ()。

- A: 中性粒细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血小板计数增多
- D: 血红蛋白减少

答案：D

4. 生理盐水系将 0.9g 氯化钠加入水中配制成 100ml 而得。依百分浓度表示法该溶液属于

- A: 重量体积比百分浓度
- B: 体积比体积百分浓度
- C: 比例浓度
- D: 摩尔浓度

答案：A

5. 不可逆地抑制环氧化酶，可以用于降低心肌梗死、脑卒中和心血管死亡的发生风险的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 氨氯地平
- C: 阿司匹林
- D: 美托洛尔

答案：C

6. (2017 年真题) 可使高血压患者血压升高的药物是 ()

- A: 银翘解毒片
- B: 抗感宁胶囊
- C: 复方酚咖伪麻胶囊
- D: 速感宁胶囊

答案：C

7. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 厄贝沙坦
- B: 比索洛尔
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：A

8. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 低血糖
- B: 心律失常
- C: 腹胀
- D: ALT 升高

答案：C

9. 患者，女，58 岁，有 2 型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查: 餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿 >1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

- A: 特拉唑嗪
- B: 二甲双胍
- C: 赖诺普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

10. 饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是 ()

- A: 15ml
- B: 20ml

C: 10ml

D: 25ml

答案：D

11. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

A: 胃黏膜屏障的完整性

B: 胃黏膜血流减少

C: 胃酸

D: H. pylori 感染

答案：C

12. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。

体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 肺心病还是冠心病

B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

C: 支气管哮喘还是心源性哮喘

D: 肺炎还是肺间质纤维化

答案：C

13. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 伐尼克兰

B: 可乐定

C: 安非他酮

D: 尼古丁替代药物

答案：A

14. 患者,男,64 岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸 581 μ mol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 贝诺酯片
- B: 双氯芬酸钠片
- C: 别嘌醇片
- D: 阿司匹林片 (300mg)

答案: B

15. 患者,男,55 岁,血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常,医师建议首先改变生活方式(控制饮食等)。一个月后复查血脂水平仍未达标,医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

- A: 40mg
- B: 20mg
- C: 80mg
- D: 60mg

答案: C

16. 摄入过多可导致甲状腺功能亢进症的药物是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 胺碘酮
- C: 碳酸锂
- D: 甲巯咪唑

答案: B

17. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 单纯性甲状腺肿
- B: 亚急性甲状腺炎
- C: 甲状腺功能减退
- D: 甲状腺功能亢进

答案：D

18. 在药物经济学研究方法中，可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

- A: 最大效果分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效用分析

答案：C

19. 属于苯二氮革类药物的的是

- A: 艾司唑仑
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 丁螺环酮

答案：A

20. （2015 年真题）静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是（ ）。

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 0.9 氯化钠注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：C

21. 急诊处方药品用量一般不宜超过

- A: 1 日用量
- B: 3 日用量
- C: 7 日用量
- D: 15 日用量

答案：B

22. 重量比重量百分浓度系指 100g 溶液中所含溶质的克数，以符号

- A: %(g/ml) 表示
- B: %(ml/ml) 表示
- C: %(ml/g) 表示
- D: %(g/g) 表示

答案：D

23. （2019 年真题）患者，男，21 岁，因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用教育的说法，错误的是

- A: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原
- B: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，应注意鉴别
- C: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素，首选地塞米松
- D: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

答案：C

24. 服药饮酒可增加发生胃溃疡出血危险的是

- A: 吲哚美辛
- B: 格列本脲
- C: 甲氨蝶呤

D: 普萘洛尔

答案: A

25. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的药物是

A: 甲基多巴

B: 辛伐他汀

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: B

26. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

A: 乳酶生片

B: 西地碘片

C: 硫普罗宁片

D: 双歧三联活菌胶囊

答案: D

27. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的叙述错误的是

A: 抗抑郁药起效较快，因此使用 2 周后即可判定疗效

B: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SS-RIs)可引起戒断反应

C: 难治性抑郁症可尝试合用抗抑郁药和情感稳定剂或与非典型抗精神病药合用

D: 抗抑郁药尽量单一用药，不主张联用两种以上的抗抑郁药

答案: A

28. (2019 年真题) 配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

A: 依托泊苷

- B: 博来霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 奥沙利铂

答案：D

29. 适宜餐后服用的是

- A: 阿司匹林
- B: 格列美脲
- C: 呋塞米
- D: 普伐他汀

答案：A

30. 容易引湿的药物是

- A: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- B: 青霉素类、头孢菌素类
- C: 胃蛋白酶
- D: 牛痘菌苗

答案：C

31. 治疗中度痤疮宜选用的药物是

- A: 维 A 酸乳膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿昔洛韦软膏

答案：A

32. 药源性疾病一旦确诊，首要的治疗措施是

- A: 调整治疗方案

B: 停用致病药物

C: 拮抗致病药物

D: 对症治疗

答案：B

33. 患者，女，45 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 是

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 布洛芬

D: 双氯芬酸

答案：B

34. （2021 年真题）患者，女，58 岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是（）

A: 美洛昔康

B: 曲马多

C: 双氯芬酸

D: 阿司匹林

答案：B

35. 属于雄激素受体阻断剂的是（）

A: 氟他胺

B: 雌三醇

C: 度他雄胺

D: 普适泰

答案：A

36. 属于雄激素受体阻断剂的是

- A: 依立雄胺
- B: 氟他胺
- C: 雌三醇
- D: 黄酮哌酯

答案：B

37. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

- A: 玻璃酸钠滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 聚乙烯醇滴眼液
- D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

答案：D

38. 甲亢患者服用丙硫氧嘧啶治疗期间，应定期监测的是

- A: WBC
- B: TC
- C: CK
- D: BUN

答案：A

39. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

- A: 利尿药
- B: AR
- C: β 受体拮抗剂
- D: ACEI

答案：D

40. 痛风急性发作期应选用

- A: 丙磺舒
- B: 阿司匹林
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：D

41. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 肝毒性小、经肾代谢的药物
- B: 经肝肾双途径消除的药物
- C: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- D: 经肝肠循环消除的药物

答案：C

42. 阿托品

- A: 可使驾驶员出现定向力障碍
- B: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- C: 可导致驾驶员多尿或多汗
- D: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

答案：B

43. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：C

44. 某患者到药店购买降糖灵，药师应交付的药物是

- A: 苯乙双胍
- B: 格列本脲
- C: 吡拉西坦
- D: 胃得灵

答案：A

45. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 普通胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：D

46. 患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多 3 天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

- A: 甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- B: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日
- C: 克霉唑制剂，1 粒（500mg），单次用药
- D: 2%克林霉素软膏 5g，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

答案：C

47. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应，用药期间不宜饮酒的药物是（）

- A: 阿司匹林

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿奇霉素

D: 甲硝唑

答案：D

48. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

A: 恩夫韦替

B: 奈韦拉平

C: 沙奎那韦

D: 扎西他滨

答案：C

49. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 痛风

B: 风湿性关节炎

C: 类风湿关节炎

D: 假性痛风

答案：A

50. 可使高血压患者血压升高的药物是()

A: 速感宁胶囊

B: 抗感宁胶囊

C: 复方酚咖伪麻胶囊

D: 银翘解毒片

答案：C

51. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

- A: $<125 / 75\text{mmHg}$
- B: $<140 / 90\text{mmHg}$
- C: $<150 / 90\text{mmHg}$
- D: $<130 / 80\text{mmHg}$

答案：B

52. 患者治疗 3 天后，感染控制不佳，痰培养及药敏报告提示病原菌为对青霉素高水平耐药的肺炎链球菌，可将抗菌药物调整为（）

- A: 哌拉西林他唑巴坦
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢哌酮舒巴坦
- D: 莫西沙星

答案：D

53. 应在餐前服用的药物是

- A: 呋塞米片
- B: 吡罗昔康片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 氨茶碱片

答案：C

54. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为（）

- A: 酒精
- B: 前列腺素
- C: 吸烟
- D: *H. pylori* 感染

答案：B

55. 主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是（单纯疱疹病毒的分型）

A: HSV-III 型

B: HSV-IV 型

C: HSV- I 型

D: HSV- II 型

答案：D

56. 肾衰竭者

A: 不能催吐

B: 不能导泻

C: 禁止洗胃

D: 不能用强利尿剂

答案：D

57. 《中国药学文摘》属于

A: 一级信息源

B: 三级信息源

C: 二级信息源

D: 原始信息源

答案：C

58. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

A: 氨苄西林

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 青霉素

D: 头孢噻肟

答案: C

59. 由医师和药师加强指导来减少

A: 患者执行医嘱差错

B: 医师处方差错

C: 药师调配处方差错

D: 护士执行医嘱差错

答案: A

60. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

A: 呋塞米

B: 维生素 E

C: 阿司匹林

D: 硝酸甘油

答案: C

61. 焦虑症最常见的表现形式为 ()

A: 社交焦虑障碍

B: 广泛性焦虑

C: 急性焦虑

D: 惊恐发作

答案: B

62. 需密闭，控制温度，保存中不能受潮的药品

A: 利福平片

B: 低精蛋白胰岛素注射剂

C: 胰酶片

D: 脂肪乳

答案: C

63. 饮食对粪外观的影响, 肉食

A: 暗绿色

B: 黑褐色

C: 酱色

D: 红色

答案: B

64. 采用华法林进行抗凝治疗时, 国际标准化比值 (INR) 的有效安全范围是

A: 0.8~1.5

B: 3.0~4.0

C: 2.0~3.0

D: 1.5~2.0

答案: C

65. 口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药, 较为有效的用药时间是症状出现的

A: 108 小时内

B: 96 小时内

C: 72 小时内

D: 48 小时内

答案: D

66. 可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

- A: 人生长激素
- B: B 受体阻断剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 精神刺激剂

答案：B

67. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 餐后 2 小时血糖
- B: 糖化血红蛋白
- C: 尿胆红素
- D: 空腹血糖

答案：B

68. 适用于各型癫痫的药物

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 拉莫三嗪

答案：C

69. 用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖隐患的是

- A: 培高利特
- B: 头孢菌素
- C: 加替沙星
- D: 氟西汀

答案：C

70. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 胃食管反流病
- B: 胃溃疡
- C: 心绞痛
- D: 支气管哮喘

答案：A

71. （2018 年真题）患者，男，40 岁，因感冒所致鼻塞到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 酚麻美敏片
- D: 氯苯那敏片

答案：A

72. 受精后 3 周至 3 个月（12 周末之前）

- A: 女性生殖系统发育迟缓
- B: 几乎见不到药物的致畸作用
- C: 中枢神经系统发育迟缓
- D: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

答案：D

73. 长期应用苯二氮类药物不能突然停止使用，是因为（）

- A: 后遗效应
- B: 毒性反应
- C: 药物依赖
- D: 首剂效应

答案：C

74. 对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

- A: 叶酸+维生素 B12
- B: 维生素 B12
- C: 富马酸亚铁
- D: 烟酸

答案：A

75. （2017 年真题）患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 尼美舒利
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 美洛昔康
- D: 双氯芬酸钠

答案：B

76. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括（）

- A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平或 CCB 降压药
- C: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- D: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

答案：B

77. 长期的高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析患者必须在进食的同时服用的药物是

- A: 磷化物
- B: 磷结合剂
- C: 铁剂
- D: 钙结合剂

答案：B

78. 抗高血压药物中，保钾利尿药的主要不良反应为（）。

- A: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高
- B: 直立性低血压
- C: 血钾增高
- D: 房室传导阻滞，心功能抑制

答案：C

79. 眼膏剂每次用量一般是

- A: 1mm
- B: 1mg
- C: 10mg

D: 1cm

答案：D

80. 低致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用止吐治疗方案是

- A: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松
- C: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药
- D: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

答案：A

81. 2 型儿童糖尿病者宜首选 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 瑞格美脲
- D: 胰岛素

答案：A

82. 关于冰毒的中毒解救措施，错误的是

- A: 洗胃
- B: 碱化尿液
- C: 催吐
- D: 利尿

答案：B

83. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 吲哚美辛

答案：B

84. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

- A: 15～30min
- B: 20～30min
- C: 5～10min
- D: 10～20min

答案：A

85. 儿科处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡红色
- B: 淡蓝色
- C: 淡黄色
- D: 淡绿色

答案：D

86. 各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A: 米泔水样便
- B: 冻状便
- C: 黏液便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/515121031121012033>